



11b 22
A. GOFUROV
S. FAYZULLAYEV
J. SAIDOV

GENETIKA



GENETIKA

ISBN 978-9943-372-29-0

9 789943 372290



A/T

MAY. 28.57.

6 - 69.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

A.T.G'OFUROV, S.S.FAYZULLAEV, J.SAIDOV


GENETIKA

PEDAGOGIKA OLIY O'QUV YURLARI 5140400 BIOLOGIYA IXTISOSLIGI
TALABALARI UCHUN DARSLIK

Kursda nomani
463
8833P7

BKKH 28.05.84
№ 4058

Jilti, ra3, 1984, 23 Maq, c. 8.
O'rn. 110 re'tchimma cephaua : [O'z jecetibchicirin] Toshkent, hectar,
«TAFAKKUR» nashriyoti
Toshkent 2010



ББК 28.04я73
УДК 575 (075)

Taqrizchilar:
I.Abduraxmonov

O'zRFA genetika va eksperimental biologiya instituti gen markazi va biotexnologiya laboratoriyasining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari doktori.

P.Xoliqov

Toshkent Tibbiyat Akademiyasi "Gistologiya va tibbiyat biologiyasi" kafedrasining professori, biologiya fanlari doktori.

R.Toshmuxamedov

Nizomiy nomidagi TDPU "Botanika va hujayra biologiyasi" kafedrasining dotsenti, biologiya fanlari nomzodi.

ISBN: 978-9943-372-29-0

Kirish

Nima sababdan har tirik mayjudot urchish jarayonida o'ziga o'xshash formalarni hosil etadi degan masala qadimdan kishilarni qiziqtirgan bo'lsada, ming yillar davomida u jumboq bo'lib qoldi. Faqat keyingi asrda bu masalaga tabiyotshunos olimlar birmuncha oydinlik kirtildilar, natijada biologiyaning yangi shaxobchasi bo'lmish genetika fan sifatida shakllandi. Bu esa barcha tirik organizmlarga xos irsiyat va o'zgaruvchanlik haqidagi bilimlarni kengayishiga olib keldi.

XX asrning ikkinchi yarmida o'z tadqiqotlariga fizika, ximiya, matematika fan metodlarini joriy etish tufayli genetika biologiyaning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan sertarmoq sohasiga aylanadi. U o'simlik hayvonlarni belgi xossalaringiniga emas, balki odamlardagi belgi xossalarning ham irsiyanishi o'rgandi. Odamlarda 4000 yaqin kasallik ota-onadan kelgusi nasllarga berilishi qonuniyatlar kashf etildi. Farzandlarimizni sog'lom tug'ilishi ko'p jihatdan keng aholi, ayniqsa yoshlar orasida genetik bilimlarni tarqatish, genetik savodxonlikni oshirishi bilan uzviy aloqador. Bu masalani ijobjiy hal etishda matab biologiya o'qituvchilarning roli beqiyos. Bo'lajak o'qituvchilarga bu sohada ko'mak berish maqsadida qo'lingizdagi darslik yaratildi. Uni yozishda mualliflar o'zlarining ko'p yillik pedagogik tajribalariga hamda chet ellarda nashr etilgan adabiyotlarga asoslandilar.

Darslik tasdiqlangan genetika dasturi asosida yozilgan bo'lib, unda genetikaning mazmuni, rivojlanish tarixi, tadqiqot metodlari, organizmlar ko'payishining tsitologik, biokimyoiy asoslari, jinssiz va jinsiy ko'payish, urug'lanish, irsiyat qonunlari, jins genetikasi va jinsga bog'liq holda irsiyanishi, belgilarning birikkan holda irsiyanishi, irsiyatning xromosomasi nazariyasi, allel bo'lmagan genlarning o'zarota'sirida belgilarning rivojlanishi, tsitoplazmatik irsiyanish, o'zgaruvchanlik, uning tiplari, ontogenetikasi, populyatsiya, xulq-atvor genetikasi, odam genetikasi, genetik ijeneriya, biotexnologiya hamda genetikaning nazariya va amaliy ahamiyati yoritilgan. Ularda klassik genetika, hozirgi zamон molekulyar genetikaga oid bilimlar o'z ifodasini topgan. Darslikka kiritilgan jadvallar, rasmlar talabalar tomonidan fan mazmunini puxta o'zlashtirishida ko'maklashadi. Darslik so'ngida atamalar lug'ati va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati berilgan.

1§.Genetika fanining mazmuni, vazifalari, metodlari, nazariy va amaliy ahamiyati

Tayanch tushunchalar: Genetika, irlsiyat, o'zgaruvchanlik, irlsiyanish, mutatsiya, ontogenetik o'zgaruvchanlik, modifikatsion o'zgaruvchanlik, genotipi, xromosoma, umumi genetika, mikroorganizmlar genetikasi, odam genetikasi, hayvonlar genetikasi, o'simliklar genetikasi, molekular genetika, immunogenetika, sitogenetika, tibbiyot genetikasi, populyatsion genetika, genetikani rivojlanish bosqichlari, duragaylashi metodi, sitogenetik metod, egizaklar metodi, molekular genetik metod, populyatsion statistik metod, genetikani boshqa fanlar bilan aloqasi, genetikani nazariy va amaliy ahamiyati.

1.Genetikaning mazmuni

Genetika yunoncha «geneticos» so'zidan olingan bo'lib, tug'ilish, kelib chiqish degan ma'noni ifodalaydi. Genetika tirik organizmlarning irlsiyati va o'zgaruvchanligi to'g'risidagi fan bo'lib, biologyaning alohida shaxobchasi sanaaldi. Irlsiyat barcha hayotiy hodisalarning asosini tashkil etib, tirik organizmlarning o'xshash belgi-xossalarini avloddan-avlodga o'tishi va rivojlanishini ma'lum tashqi muhit sharoitida ta'minlab beruvchi xossadir. **O'zgaruvchanlik** esa tirik organizmlarning ota-onal belgilardan farq qiluvchi yangi belgilarni namoyon qilish xossasidir.

Irlsiyat va o'zgaruvchanlik ikki qarama-qarshi jarayon bo'lishiga qaramay bir vaqtida namoyon bo'ladi. Irlsiyatsiz o'zgaruvchanlik, o'zgaruvchaniksiz irlsiyat kuzatilmaydi. Irlsiyat va o'zgaruvchanliksiz yer yuzida hayotning evolutsiyasini tasavvur etish qiyin. Irlsiyat o'simlik va hayvonlarning har bir turini o'ziga xos belgi va xossalarni bir qancha avlodlarda turg'un saqlanib qolishini ta'minlaydi. Irlsiyat tufayli turga tegishli organizmlar o'zgaruvchan tashqi muhit sharoitlariga moslashib, yashab qoladi. O'zgaruvchanlik natijasida paydo bo'lgan belgi-xossalar irlsiyat tufayli keyingi avlodlarda saqlanib qolgandagina ya'ni irlsiylangandagina evolutsiyada ahamiyatga ega.

O'zgaruvchanlikning turlicha ko'rinishlari mavjud. Organizm belgi va xususiyatlarini o'zgarishi bir yoki bir necha genlarning o'zgarishi oqibatida strukturaviy o'zgarishi ro'y berishi mumkin. Bunday o'zgaruvchanliklar **mutatsiyalar** deyiladi. Shu bilan bir vaqtida individual rivojlanish jarayonida organizmlarning morfologik, fiziologik, biokimyoiy va boshqa xususiyatlarining qonuniyalii o'zgarishi ham kuzatiladi. Bu **ontogenetik o'zgaruvchanlik** deb ataladi.

Modifikatsion o'zgaruvchanlik – tashqi muhit omillari ta'sirida genotipi o'zgarishsiz kechadigan organizmlar fenotipining o'zgarishidir.

Irlsiyat va irlsiyanish tushunchalarini farqlay bilish lozim. Ma'lum bir

oqsil molekulasini tuzilishi, belgining rivojlanishi va organizmning tuzilishi rejasini genlar orqali belgilanish xususiyatiga **irlsiyat** deyiladi. Organizmdagi irlsiy belgi va xususiyatlarning avloddan avlodga o'tish jarayoni **irlsiyanish** deyiladi. Organizm irlsiy omillar yig'indisi – genotipi tuxum hujayra urug'lanishi davrida ota-onasidan oladi. Genoti pdagi hamma o'zgarishlar ham nuqsonga sabab bo'lmaydi. Organizmning genotipi uning moslanish imkoniyatlarini va tashqi omillarga javoban reaksiya normasini belgilab beradi.

Organizm barcha belgilarinining yig'indisi genotipi da kodlashtirilgan irlsiy axborot tuzilishiga va uning ifodalananish (ekspresiya) darajasiga bog'liq bo'ladi. Genotipi mutatsiyalar yoki o'zgarishlar neytral bo'lib, aksariyat hollarda, organizmlar fenotipik o'zgarishiga olib kelmaydi. Biroq, genotipi «ma'noga ega» (ya'ni oqsil strukturasi o'zgarishi bilan aloqador) o'zgarishlar genotipi buzilishiga olib kelib, turli nuqsonlar keltirib chiqaradi. Genotipi «ma'noga ega» bo'lgan mutatsiyalar sonini neytral mutatsiyalar soniga nisbati organizm genotipi o'zgaruvchanlik darajasini ko'rsatadi.

Irlsiyatning moddiy asosi bo'lib bo'linish jarayonida qiz hujayralarga taqsimlanish xususiyatiga ega bo'lgan hujayra yadrosining maxsus tuzilmasi – **xromosomalar** hisoblanadi.

Xromosomalar asosiy genetik tuzilmalar bo'lib, avloddan-avlodga o'tish jarayonlarini ta'minlash uchun barcha zarur irlsiy axborotga ega. Hujayra bo'linish davrida xromosomalar aynan o'ziga o'xshash xromosomalarni hosil qiladi. Xromosoma chiziqli taribda joylashgan genlarning tuzilishi bo'lib, irlsiy axborotni saqlash va o'tkazish funksiyasini bajaradi.

Organizmning umumi holati, uning anatomik, morfologik tuzilishi, fiziologik, biokimyoiy xususiyatlari genlarning bir-biri bilan hamda genotipining tashqi muhit omillari bilan o'zaro aloqasining natijasi hisoblanadi.

2.Genetikaning rivojlanish bosqichlari

Genetikaning fan sifatida shakllanishida sitologiya, embriologiya, bioximiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Irlsiyat va o'zgaruvchanlik haqidagi fanning rivojlanishiga **Ch.Darwinning** turlarning kelib chiqishi haqidagi ta'limoti katta hissa qo'shdidi. Genetikaning fan sifatida vujudga kelishiga somatik va jinsiy hujayralarning xususiyatlarini o'rganishdagi yutuqlar yordam berdi.

Genetikani mustaqil fan sifatida rasmiy tan olinishida 1900-yil gollandiyalik **Gugo de Friz**, germaniyalik **Karl Korrens** va avstriyalik **Erix Chermak**larning duragaylash bo'yicha olib borgan ishlari katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu uch botanik olimlar bir-biridan bexabar holda turli obyektlar

(G.de Friz enotera va lolaqizg'aldoq, K.Korrens makkajo'xori, Ə.Chermak no'xat duragaylari) ustida tadqiqot o'tkazib, ota-onas irlisy belgilarining nasldan-nasliga berilishi va kelgusi avlodlarda ajralishi haqidagi maqolalarini e'lon qildilar. Ammo bu olimlar chex ruhoniysi **Gregor Mendel** ochgan irlisyat qonunlarini qaytadan kashf etdilar xolos. Chunki, Mendelning irlisyat haqidagi qonunlari 1865 yilda nashr etilgan "O'simlik duragaylari ustida tajribalar" nomli asarida bayon etilgan edi. Shuning uchun G.Mendel o'rinni ravishda genetikaning asoschisi bo'lib hisoblanadi.

Genetikaning fan sifatida rivojlanishi uch bosqichdan iborat. Genetika rivojlanishining **birinchi bosqichida** irlisyat va o'zgaruvchanlik haqidagi fanga 1906-yilda angliyalik olim V.Betson genetika deb nom berdi.

Genetikaning keyingi taraqqiyotida gollandiyalik olim **Gugo de Friz** taklif etgan mutatsiya nazariyasi (1901-1903 y), daniyalik genetik olim V.Iogannsen tomonidan loviya o'simligida belgilarning irlisanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1909-yilda V.Iogannsen tomonidan genetika faniga **gen**, **genotip**, **fenotip** kabi tushunchalar kiritildi.

Genetika fani rivojlanishining birinchi o'n yilligida T.Boveri, U.Setton va Ə.Vilson tomonidan irlisyatning xromosoma nazariyasi asoslab berildi. Hujayra bo'linishi (mitoz) va jinsiy hujayralarning hosil bo'lishi (meyoz) jarayonidagi xromosomalar tarqalishi bilan irlisy belgi-xossalar tarqalishi o'rtaida ma'lum bog'liqlik borligi aniqlandi.

Genetika fani rivojlanishining **ikkinci bosqichi** irlisyatning moddiy asoslarini o'rganish bilan bog'liqidir. Bu vaqtida irlisyat hodisalarini o'rganishda sitologik metod qo'llanila boshlandi, shuning natijasida sitogenetik yo'nalish tarkib topdi.

1910-yilda amerikalik genetik olim **T.Morgan** tomonidan drozofila meva pashshasida olib borilgan tadqiqotlar irlisyatning **xromosoma nazariyasini** asoslashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Bu nazariyaga ko'ra, genlar xromosomada chiziqli tartibda joylashgan. Hujayradagi genlarning birikish guruhi gomologik xromosomalarining gaploid to'plamiga teng ekanligi, bir guruhgaga birikkan genlar ikkinchi guruhdan mustaqil ravishda nasldan-nasliga berilishi aniqlandi.

1925-yilda **G.A.Nadson va G.S.Filippovlar** achitqi zamburug'ida radiy nurlari ta'sirida mutatsiyalar olishga muvaffaq bo'ldilar. 1927-yilda esa amerikalik genetik olim **G.Meller** drozofila meva pashshasiga rentgen nurlarini ta'sir ettirib, ularning irlisyatini o'zgartirish ya'ni mutatsiyani sun'iy yo'l bilan vujudga keltirish mumkinligini isbot etdilar.

XX asrning 20-30 yillarda S.Rayt, R.Fisherlar populyatsiyalardagi jarayonlarni matematik metodlar yordamida o'rganish mumkinligini asoslab berdilar.

Genetika fani rivojlanishining **uchinchi bosqichi** genetik tadqiqotlarga

kimyo, fizika, matematika va kibernetika fanlari metodlarini tafbiq etish bilan tavsiflanadi. Xususan, elektron mikroskopiya, rentgenostrukturaviy analiz, sentrofuga, radioaktiv izotop metodlaridan foydalish orqali mikroorganizmlardan zamburug'lar, bakteriyalar va viruslarning tuzilishi, ayrim organoidlarning funksiyasi, oqsillar, fermentlar, vitaminlarning strukturaviy tuzilishi, funksiyasi o'rganila boshlandi.

XX asrning 40-yillariga kelib amerikalik bioximik olimlar **D.U.Bidl** va Ə.Tatumlar xaltali zamburug'larning neyrosporalari ustidagi tadqiqotlarida genlarning moddalar almashtinuviga, tirik organizmlarning morfologik belgilarning va fiziologik xususiyatlarining shakllanishiga ko'rsatgan ta'sirini o'rgandilar.

1944-yilda genetik olim **O.T.Eyveri** shogirdlari bilan birkalikda nuklein kislotalar irlisyatning moddiy asosi ekanligini isbotladi. DNKning genetik ahamiyati aniqlangandan so'ng, 1953-yilda **Dj.Uotson, F.Krikler M.Uilkins, R.Franklin**ning nuklein kislotalarning rentgen strukturalari to'g'risidagi ma'lumotlari tahlilini xulosalab DNK molekulasing tuzilishi to'g'risidagi modelni e'lon qildilar.

1961-62-yillarda **M.Nirenberg, G.Mattey va F.Krikler** 20 ta aminokislota uchun nukleotidlar tripletining tarkibini aniqladilar va oqibatda genetik kod tilsimi ma'lum bo'ldi. 1969 yilda hind olimi **X.Korana** achitqi zamburug'i hujayrasining gen sintezini laboratoriyada amalga oshirdi. Molekular biologiya va biokimyoning rivojlanishi bilan molekular genetika, gen injeneriyasi, biotexnologiya kabi genetikaning yangi shoxobchalari tarkib topdi. Asrimizning boshlariga kelib, bir necha o'nlab mikroorganizmlar, ko'plab hayvonlar, inson va o'simliklar genomlari ya'ni xromosomalarini gaploid to'plamlaridagi genlar yig'indisining DNK ketma-ketliklarini to'la echilishi (sekvens) genomika fanining shakllanishiga olib keldi.

3.Genetikaning shoxobchalari

Hozirgi zamondagi genetikasi tadqiqot obyekti ko'ra kompleks fan bo'lib, uning bir qancha shoxobchalari bor. Umumi genetika, mikroorganizmlar genetikasi, odam genetikasi, hayvonlar genetikasi, o'simliklar genetikasi, molekular genetika, immunogenetika, sitogenetika, tibbiyot genetikasi, populyatsion genetika, pedagogik genetika ana shunday shahobchalardir.

Umumi genetika — irlisy axborot tuzilishini, irlisyat va o'zgaruvchanlikni tiriklikning barcha darajalariga xos bo'lgan umumi qonuniyatlarini o'rganadi.

Mikroorganizmlar genetikasining tadqiqot obyekti bo'lib, bakteriyalar, viruslar tuban eukariot organizmlar hisoblanadi.

Odam genetikasi — odam populyatsiyalarida irlisyat va o'zgaruvchanlik hodisalarini, tashqi muhit sharoitlarining ta'sirida belgilarning irlisanishi, ularning o'zgarishi xususiyatlarini tadqiq qiladi.

Hayvonlar genetikasi — umurtqasiz va umurtqali hayvonlardagi belgi-xossalarning irsiylanishini o'rganadi.

O'simliklar genetikasi — asosan yopiq urug'li o'simliklarda belgi, xossalarning avloddan-avlodga berilish qonuniyatlarini ochish bilan shug'ullanadi.

Molekular genetika — genotipdagi genlar tuzilishi va ularni ifodaalanishi (ekspressiyalanish), mutatsiyalar chastotasi va ularni populyatsiyada tarqalish va molekular darajadagi evolyutsion jarayonlarni ro'y berish qonuniyatlarini o'rganadi.

Immunologik genetika esa antigen omilning irsiylanishi va immun reaksiyalarining genetik sabablari, qonuniyatlarini tadqiq qiladi.

Sitogenetika — odam, hayvon va o'simlik xromosomalarining tashqi va ichki tuzilishini o'rganish bilan shug'ullanadi.

Tibbiyot genetikasining vazifalari odam irsiy kasalliklarini tashxis qilish, davolash va profilaktika usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Radiatsion genetika rentgen, gamma nurlanishning tirik organizmlarga ko'rsatgan ta'sirini o'rganish bilan mashg'ul bo'ldi.

Filogenetika — organizmlar va ular populyatsiyalari o'rtaidagi genetik qarindoshlik darajasini, evolyutsion divergensiya va tur paydo bo'lish genetikasini tadqiq qiladi.

Populyatsion genetikaning predmeti bo'lib hayvon va o'simlik populyatsiyalarida genlar va genotiplar, ularning evolyutsion boshlang'ich omillari: mutatsiyalar, genlar dreyf'i, migratsiyalar, tanlanish ta'sirida o'zgarishini o'rganish hisoblanadi.

Pedagogik genetikaning mavzusi oliy nerv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan aql-idrok, qobiliyat iste'dod, nutq kabi xususiyatlarning genetik asoslarini tadqiq etishdan iborat. Pedagogik genetika irsiy imkoniyatlari turlicha bo'lgan bolalarda ta'lif-tarbiyani qanday olib borish to'g'risida tavsiyalar ishlab chiqadi.

4. Genetikaning asosiy metodlari

Boshqa tabiiy fanlar singari genetika ham o'z tadqiqot metodlariga ega. Bularga quyidagi metodlar kiradi:

1. Duragaylash metodi orqali ayrim belgi-xossali ota-onal organizmlarni chatishirish natijasida olingan duragaylarning bir qancha avlodlarida rivojlanishi o'rganiladi. Olingan natijalarning muqarrarligi matematik statistika metodi orqali aniqlanadi.

2. Sitogenetik metod yordamida xromosomalar o'zgarishi bilan aloqador bo'lgan organizmnning irsiyatni va o'zgaruvchanligi o'rganiladi. Binobarin sitogenetika irsiyatni va o'zgaruvchanlikning sitologik asoslarini tadqiq etadi.

3. Egizaklar metodi bilan organizmdagi belgi xossalarning

rivojlanishida genlar va tashqi muhit omillarining qay darajada ko'rsatgan ta'siri o'rganiladi.

4. Molekular genetik metod bilan irsiyatni va o'zgaruvchanlikning moddiy asoslari bo'lgan nuklein kislotalarining, xususan, dezoksiribonuklein — DNK va ribonuklein — RNK kislotalarining tuzilishi va funksiyasi aniqlanadi.

5. Populyatsion statistik metod populyatsiyalardagi irsiyatni o'rganishda qo'llaniladi. U populyatsiyalardagi dominant va retsessiv allellarni takrorlanish darajasini, populyatsiyalardagi tabaqalanish va qarindoshlik darajasini aniqlash bilan shug'ullanadi.

6. Filogenetik metod genlar allellari chastotalari uchrashiga asosan organizmlar yoki ularning populyatsiyalari o'rtaidagi genetik qarindoshlik darajasini, ularning kelib chiqish shajarasini o'rganadi.

5. Tabiiy fanlar tizimida genetikaning o'rni

Irsiyat va o'zgaruvchanlik organizmlarning ko'payishi bilan aloqador. Ko'pa, ish, irsiyat va o'zgaruvchanlik asosida murakkab biokimyo, fiziologik jarayonlar yotadi. Bu bilan genetikani **biokimyo** va **fiziologiyaga** bog'liqligi izohlanadi.

Organizmlarning individual rivojlanishi irsiy omil — genlar faoliyati bilan belgilanadi. Genlar ta'sirini ontogenezning umumiyligi qonuniyatlaridan ajratilgan holda tushuntirish mumkin emas. Bu esa genetikaning **embriologiya** bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Hezirgi zamon biokimyo, fiziologiya, embriologiya va boshqa biologik fanlar genetika bilan o'zaro aloqada bo'lmay, o'z maqsadlariga erishadilar deyish noto'g'ridir. Chunki irsiy o'zgarishlar — mutatsiyalar organizmdagi barcha fiziologik, biokimyo, jarayonlarni qamrab oladi.

Genetika o'simliklar va hayvonlar sistemasiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Faqat irsiyatning moddiy asoslarini tadqiq qilish orqali o'simlik va hayvonlarning turli sistematik guruhlari orasida filogenetik yaqinlikni aniqlash mumkin.

Genetikaning **tibbiyot** fani bilan aloqasi nihoyatda dolzarb sanaladi. Odamlarda olib borilgan genetik tadqiqotlar tufayli 5000 ga yaqin irsiy kasalliklar aniqlandi. Ularning xromosomalar, genlarning o'zgarishi bilan aloqador ekanligi ma'lum bo'ldi. Tibbiy genetik bilimlar asosida irsiy kasalliklarga tashxis qo'yish, bu kasalliklarning oldini olish tadbirleri belgilanmoqda.

Genetikaning **ekologiya** fani bilan bog'liqligi nihoyatda xilma-xil. Avvalo atrof muhitning iflosanishi o'simliklar, hayvonlar, odamlar irsiyatiga zararli ta'sir etishi va shunday ta'sirlar natijasida paydo bo'ladigan irsiy kasalliklarning oldini olish uchun ekologik tadbirlar belgilanmoqda.

Gencinka **evolyutsion ta'lifot** bilan ham uzviy aloqador. Ch. Darvinniing

ta'bireha o'zgaruvchanlik tusayli organizmda yangi belgi va sifatlar vujudga kelsa, irlsiyat ularni bo'g'lnlarda mustahkamlaydi, tabiiy tanlanish esa ma'lum sharoitga moslanishni vujudga keltiradi. Natijada soydali o'zgaruvchanlikka ega organizmlar yashab, zararli o'zgaruvchanlikka ega organizmlar esa yashash uchun kurashda nobud bo'ladilar.

6. Genetikaning nazariy va amaliy ahamiyati

Genetikaning asosiy vazifalariga genning o'zgarishi, gen kelib chiqishi, genlarning ta'sir mexanizmlari, ularning nazoratidagi jarayonlar va butun organizmda murakkab belgi va xususiyatlarning boshqarilishini o'rghanish kiradi. Hozirgi zamonda genetikasining vazifasi nazariy muammolar bilan birga muhim amaliy vazifalarni hal etishdir. Genetika hayvonlar, o'simliklar, mikroorganizmlarning irlsiyatini tushuntirish va ularni inson manfaatlariga mos ravishda o'zgartirish metodlari va yo'llarini ishlab chiqishga mas'uldir.

Seleksiya yangi nav va zotlarni yaratish bilan shug'ullanishiga qaramay, u irlsiyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlarini o'rganmasdan rivojiana olmaydi. Genetika irlsiyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlarini o'rganib seleksiyaning ilmiy jihatdan asoslangan metodlarini yaratish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtida makkajo'xori va boshqa o'simliklarda duragay yetishtirish yo'liga qo'yilgan bo'lib, bu o'simliklar toza navlarga qaraganda hosildordir.

Genetik qonunlarga asoslanib respublikamiz olimlari g'o'zaning bir qancha tezpishar, hosildor, ko'sagi yirik navlarini yaratdilar va ishlab chiqarishga joriy etdilar.

Gen injenerligi rivojlanishi bilan transgen o'simliklar va hayvonlar hosil qilindi.

Genetikaning tibbiy muammolarni hal etishdagi o'rni ham ahamiyatlidir. Butun yer yuzidagi tug'ilgan bolalarning 4-5 foizida turli irlsiy kasalliklar namoyon bo'ladi. Irsiy kasalliklarga masalan, asab (epilepsiya), endokrin (kreatinizm), qon (gemofiliya), moddalar almashinuvi bilan bog'liq boshqa qator kasalliklar kiradi.

Odam va hayvonlar irlsiy kasalliklari alohida genlarning va xromosomalarning o'zgarishi bilan aloqador. Xromosomaning yetishmasligi yoki ortiqchaligi, hamda genlar tuzilishi va funksiyasini o'zgarishi turli nomaqbul hodisalarga olib kelishi mumkin. Irsiy kasalliklarning sababini bilish yoshlik davrda kasallik rivojlanishini oldini olish va davolash metodlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Radiatsion genetikaning rivojlanishi koinotda olib borilayotgan taddiqotlar tusayli muhim o'rini egallaydi. Koinotga uchishda inson irlsiyatiga turli nurlar ta'sir etishi mumkin. Binobarin koinot genetikasining yana bir muammosi koinot nurlanishi xavflitigini genetik tomonidan baholash va uning oldini olish tadbirlarini yaratishdan iboratdir. Muntazam radiatsion (γ va β) nurlanish ta'sirida bo'lgan odamlar avlodida nuqsonli bo'lalar tug'ilish ehtimoli birmuncha yuqori bo'ladi.

Antibiotiklar yaratilishi va mikroorganizmlar genetikasi paydo bo'lgandan so'ng genetika farmatsevika sanoatida muhim o'rinni tuta boshladi.

Oxirgi yillarda genetika oldida hayvonlar va insonlarni oziqlantirish uchun aminokislotalarni ishlab chiqarish muammosi turibdi. Bu muammoni aminokislotalarni yuqori darajada ishlab chiqaruvchi yangi organizmlarni hosil qilish yo'li bilan hal etish mumkin.

OITS (orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi), saraton kasalligi juda xavfli kasallik bo'lib, mutaxasislarning fikricha bu kasalliklar hujayralarning irlsiy apparati o'zgarganda yuzaga keladi. Bu kasalliklarga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish niroyatda dolzarb sanaladi.

Savollar va topshiriqlar

1. Genetika atamasining lug'aviy ma'nosini tushuntiring.
2. Genetika fanini tekshirish obyekti nima?
3. Irsiyat va o'zgaruvchanlikning ahamiyati nimadan iborat?
4. O'zgaruvchanlikning qanday xillari mavjud?
5. Irsiyat va irlsiyanishni bir biridan nima farqi bor?
6. Fanga genetika atamasi qachon va kim tomonidan kiritilgan?
7. Mendel qonunlari kimlar tomonidan va qanday obyektlarda qayta kashf qilingan?
8. Genetika fanining rivojlanishi necha bosqichdan tashkil topgan?
9. Genetikaning birinchi rivojlanish bosqichini izohlab bering?
10. Genetikaning ikkinchi rivojlanish bosqichida qanday kashfiyotlar qilindi?
11. Genetikaning uchinchi rivojlanish bosqichida nimalar aniqlangan?
12. Genetikaning bo'limlari va ularning tekshirish obyektlarini yoriting.
13. Genetikaning asosiy metodlarini qayd qiling va ularning har birini izohlang.
14. Genetikaning boshqa fanlar bilan aloqasini tushuntiring.
15. Genetika fanining nazariy va amaliy ahamiyatini siz qanday tushunasiz?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Irsiyat bu:*
 - A. Organizmlarning o'ziga xos tuzilishini kelgusi avlodga berish xossasi
 - B. Irsiy axborot uzatishning muayyan usuli
 - C. Irsiy axborotni yoki genotipdagi genlarni o'zlashtirish
 - D. Ota yoki ona organizmning o'z xossasini kelgusi naslga berish usuli
2. *O'zgaruvchanlik bu:*
 - A. Organizmlarning o'ziga xos tuzilishini kelgusi avlodga berish xossasi

- B. Irsiy axborot uzatishni muayyan usuli
 S. Nasllar orasidagi farq
 D. Irsiy axborot yoki genotipdagi genlarni o'zgarishi
3. *Genetika fanining bo'limlari:*
 A. Mikroorganizmlar genetikasi, odam genetikasi
 B. Hayvonlar genetikasi, o'simliklar genetikasi
 C. Molekular genetika, sitogenetika
 D. A,B va S
4. *Genetika fanining rivojlanish bosqichlari nechta?*
 A. 3
 B. 4
 C. 5
 D. 6
5. *Genetika fanining asosiy metodlari*
 A. Sitologik, morfologik
 B. Duragaylash, sitogenetik
 C. Molekular genetik, immunologik
 D. B va S
6. *Populyatsiyadagi irsiyatni o'rghanishda qaysi genetik usul qo'llaniladi?*
 A. Sitogenetik
 B. Molekular genetik
 C. Egizaklar
 D. Populyatsion statistik va filogenetik
7. *Irsiy kasallikkarga tashxis qo'yish, ularni oldini olish bilan qaysi fan shug'ullanadi?*
 A. Tibbiyot genetikasi
 B. Molekular genetika
 C. Ekologiya
 D. Odam genetikasi
8. *Transgen o'simliklar va hayvonlar olish bilan genetikaning qaysi shoxobchasi shug'ullanadi?*
 A. Hayvonlar genetikasi
 B. O'simliklar genetikasi
 C. Sitogenetika
 D. Gen injeneriyasi

I BOB. ORGANIZMLAR KO'PAYISHINING SITOLOGIK

VA BIOKIMYOVIY ASOSLARI

2§. Jinssiz ko'payishning sitologik va biokimyoviy asoslari.

Tayanch tushunchalar: mitotik sikl, mitoz, kariokinez, sitokinez interfaza, profaza, metaphaza, anafaza, telofaza, xromosoma, sentromera, metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik, proksimal, distal, juft xromatida, xromonema, xromomeralar, geteroxromatin, euxromatin, DNK, RNK, nukleotid, dezoksiribonukleotid, adenin, guanin, sitozin, timin, uratsil, komplementarlik, DNK replikatsiyasi, konservativ, yarimkonservativ, dispersion, kariotip, diploid, gaploid, gomologik xromosomalar, amitoz, endomitoz, politeniya.

1. Hujayraning mitoz bo'linishi

Hujayra bo'linishida bir hujayradan ikki hujayra hosil bo'ladi. Hujayra bo'linishi organizmlar ko'payishining markaziy qismini tashkil etadi. Hujayra bir necha usullar orqali bo'linadi. Ularning eng ko'p uchraydigani **mitoz** bo'linishdir. Mitoz bo'linish somatik hujayralarga xos bo'lib, ikki asosiy bosqich: **yadroning bo'linishi (kariokinez)** va **sitoplazmaning bo'linishi (sitokinez)**dan iborat. Mitoz uzlusiz jarayon bo'lib, hosil bo'lgan ikkala qiz hujayra o'rtasida irsiy axborotning barobar taqsimlanishi amalga oshadi. Bundan avval esa xromosomalarning ikkilanishi ro'y beradi.

Mitotik sikl 5 bosqichdan tashkil topgan. Bular: **interfaza**, **profaza**, **metaphaza**, **anafaza** va **telofaza**. Ikki bo'linish o'rtasida hujayra yadro si **interfaza** bosqichida bo'ladi. Interfaza tinch holatdagi yadro bosqichi deb atalishiga qaramasdan, aslida yadroda bu davrda metabolik jarayonlar faol amalga oshadi, hujayra bo'linishga tayyorgarlik ko'radi. Interfazada har bir xromosoma bo'linib 2tadan xromatidanı hosil etadi. Interfaza 3 davrga bo'linadi: mitozdan keyingi interfaza **davr G₁**, deb belgilanadi. Bu davr davomiyligi 10 soatdan bir necha sutkagacha cho'ziladi. Shu davrda yosh hujayra kattalashadi, hajm jihatdan ortadi. Unda ko'plab organik, mineral moddalar zahirasi to'planadi. Interfazada DNKnning sintezlanishi **S** davr deb nomланади. Bu davr mobaynida DNK molekulasi ikki hissa ortadi, u 6-10 soat davom etadi. Natijada har bir xromosoma ikitidan xromatidanı hosil etadi.

Interfuzaning DNK sintezidan keyingi **davr G₂**, deb atilib, unda DNK sintezlanmasa ham RNK va oqsil sintezi amalga oshadi hamda u 3-4 soatgacha cho'ziladi. Hayvon hujayralarida telofaza oxirida va interfuzaning boshlanishida sentriolalarning ikkilanishi sodir bo'ladi. Bu davrda yadro bo'yalganda to'rsimon tuzilishga ega bo'ladi. Keyingi bosqichda esa ulardan xromosomalar shakllanadi.

Mitoz bo'linishning birinchi bosqichi **profaza** (*pro - namoyon, phas - davr*) bo'lib, bunda xromosoma iplari — xromatinlarning spirallahishi hisobiga xromosomalarni yo'g'onlashishi va kattalashishi kuzatiladi. Ular


juft-juft xromatidalar holatida bo'lib yorug'lik mikroskopida ko'rindi. Xromosomalardagi xromatidalar profazada tarqalmaydi, balki ular sentromera orqali birikkan holda bo'ladi.

Profazada sentriolalar bo'linib bir-biridan itarila boshlaydi. Profazaning o'rtasi yoki oxirida yadro qobig'i va yadrocha parchalanadi, bo'linish urchug'i shakllanadi. Natijada juft-juft xromatidalar sitoplazma va karioplazmaning umumiy massasida joylashadi. Bu bilan profaza tugallanadi.

Metafaza (*meta - keyin*)da xromatidalar zichlashib, yo'g'onlashib, hujayra markazi bo'ylab to'planadi. Xromatidalar sentromerasi ekvator tekisligida, qolgan qismi ekvator tekislikdan tashqarida joylashadi. Urchuq iplarining zichligi ortib, ular juft-juft xromatidalarga shunday holatda tutashadiki, bunda har bir sentromeraga ikki qutbdan axromatin iplari birikadi. Bu bosqichda sentromeraning cho'zituvchanligi juda kamayadi.

Anafaza (*ana - qayta*) bosqichi, bunda xromatidalar sentromeralar bo'linib, yakka holatdagi xromatidalar qutblarga tarqaladi. Avval sentromera qismlari so'ngra xromatidalarini o'zi ham ajrala boshlaydi. Har bir qutbda xromosomalar soni tenglashadi va ular bo'linishdan oldingi hujayraning xromosoma soniga muvofiq bo'ladi.

Telofazada (*telos - tuga*) xromosoma iplarining yoyilishi, ingichkalashishi, uzayishi kuzatiladi. Xromosomalarning har bir guruhi atrofida yadro qobig'i hosil bo'ladi, yadrocha shakllana boshlaydi. Sitoplazma bo'linishi tugallanadi va hujayra qobig'i hosil bo'ladi ya'ni sitokinez amalga oshadi. Hosil bo'lgan yangi qiz hujayratar interfaza bosqichiga o'tadi.



1-rasm. Hayvon hujayrasidagi mitoz sxemasi.

Mitoz jarayoni odatda 1-2 soat davom etadi. Davomiyligi hujayra turi, yoshi, tashqi muhit sharoitlariga bog'liq. Hujayra bo'linishi yuqori harorat, radiatsiyaning katta dozasi, narkotik moddalar va o'simlik zaharlari ta'sirida to'xtashi mumkin.


2.Xromosomalarning tashqi, ichki tuzilishi va kimyoviy tarkibi

Hujayrani bo'linishida markazi o'rinni xromosomalar egallaydi.

Bu yadro tuzilmalari yaxshi bo'yaganligi uchun nemis olimi **V. Valdeyr** xromosomalar (*chromo-rang somo-tana*) deb atagan. Xromosomalar hamma vaqt yoritgich mikroskopida ko'rinvavermaydi. Ular hujayra bo'linayotgan davrda ko'zga tashlanadi.

Xromosomalar umumiy tashqi tuzilishini metaphaza va anafazaning boshlang'ich davrida yaxshi kuzatish mumkin.

Xromosomalar tashqi ko'rinishi, hajmi bilan o'zaro farqlanadilar. Ularning uzunligi 0,2 – 50 μm , diametri 0,2 – 5 μm oralig'ida bo'ladi. Xromosomalarning shakli asosan sentromeri joylashishiga ko'ra belgilanadi. Sentromeraning asosiy vazifasi hujayra bo'linayotganda uning joyini o'zgartirishdan iborat. Sentromera har bir xromosomaning ma'lum yerida joylashgan bo'ladi.



2 – rasm. Metaphaza davridagi xromosomaning tuzilishi. 1 – tashqi ko'rinishi. 2 – ichki tuzilishi.

Agar sentromera xromosomaning o'rtasida joylashsa, metaphazada bu xromosoma V-shaklli bo'lib ko'rindi. Bunday shakldagi xromosoma **metatsentrik** ya'ni teng yelkali deyiladi. Agar sentromera xromosomani bir-biriga teng bo'lmagan ikki qismga ajratib tursa, u holda biroz teng bo'lmagan – **submetatsentrik** yoki haddan tashqari, noteng yelkali –

akrotsentrik xromosoma, agar sentromera xromosomaning uchki qismiga yaqin joydan o'rin olsa ular **telosentrik** xromosomalar deyiladi. Xromosomalar uchidagi tanachalar esa **telomeralar** deb ataladi. Xromosomada asosiy sentromeradan tashqari ikkilamchi sentromera bo'lishi mumkin. Lekin u xromosoma joyini o'zgartirishda qatnashmaydi. Ko'p hujayralarda uning o'tnida yadrochalar shakllanadi. Ba'zan xromosoma uchlariда uncha katta bo'limgan tanachalar – **yo'ldoshlar** joylashadi. Bunday xromosomalar **yo'ldoshli xromosomalar** deyiladi.

Sentromeraga yaqin joylashgan xromosoma qismi – **proksimal**, uzoqlashgan qismi – **distal** qism deb ataladi. Agar xromosoma bo'linib ketsa va sentromera yo'qolsa, sentromerasiz qism qayta uni tiklay olmaydi va u bora-bora tarkibiy qismlarga ajralib ketadi. Sentromera tarkibida DNK bo'ladi va u xromosomani qayta tiklash qismi bo'lib hisoblanadi. Har bir xromosoma **just xromatidadan** iborat. Xromatidalar juda ko'p ingichka ipchalar – **xromonemalardan** tashkil topgan. Xromonemalar interfazada spirallashgan holatda bo'ladi. Profazada uning spirallashishi xromosoma bo'ylab tarqaladi. Bu iplarda to'q rangga bo'yaluvchi donachalar ya'ni **xromomeralarni** ko'rish mumkin. (2-rasm)

Qutbli va elektron mikroskopiya kabi tadqiqot metodlari xromosomalarning nozik tuzilishini o'rganishga imkon yaratdi. Har bir xromonema ikkita elementar yig'indidan, ya'ni mikromolekular o'lchamli birlamchi ipchalardan tashkil topadi. Birlamchi ipcha diametri 30 \AA ga teng.

Spirallahish ikki ko'rinishda bo'ladi. Ularning biri mayda, ikkinchisi yirik bo'ladi. Xromosomalar uzunasiga bir-biridan farq qiluvchi qismlardan tashkil topgan. Ayrim qismlar ko'proq spirallahadi, boshqalari kam spirallahadi. Spirallahgan qism to'q rangda, kam spirallahgani och rangda bo'ladi. Ko'p spirallahgan qism **geteroxromatin**, kam spirallahgan qism **euxromatin** deb nomlanadi. Xromosomalarning uzunasiga tabaqalashganligi gigant xromosomalarda, ayniqsa ko'zga tashlanadi, chunki ular 1000 dan ortiq xromonemalardan iborat bo'ladi. **Gigant xromosomalar** (3-rasm) chivin lichinkasining so'lak bezi hujayralarida, so'ng drozofila lichinkasi so'lak bezlarida, o'simlik hujayralarining endosperm va antipod yadrolarida topilgan.

Xromosomalarni maxsus bo'yoq moddalari bilan bo'yaganda uning turli qismlari turlicha reaksiyaga kirishadi. Ayrim qismlari to'q rangga bo'yaladi, ular **geteroxromatin**, och rangga bo'yagan qismlari **euxromatin qismlardir**. Ular turlicha genetik xususiyatga ega. Geteroxromatin qism irlisyat jihatdan nofaol, ular xromosomalarning sentromeraga yaqin joyda ko'proq uchraydi. Euxromatin qismlari esa faoldir.



3 – rasm. So'lak bezi hujayralari yadrosidagi (gigant) va nerv hujayralari yadrosidagi (normal) xromosomalarning ko'rinishi.

Xromosomalarning kimyoviy tarkibi 90-92% nukleoproteidlardan iborat. Nukleoprotein dezoksiribonuklein kislotasi (DNK) va oqsil gistonlardan tashkil topgan. Bundan tashqari, xromosomada RNK, kalsiy, magniy, temir ionlarining birmuncha miqdori va gistonsiz oqsillar ham mavjud.

DNK tabiatan **biologik polimer** hisoblanadi. D NK molekulasi dezoksiribonukleotidlarning monomer yig'indilarining ketma-ketligidan tuzilgan. Nukleotid tarkibida **geterotsiklik azot asoslari** (purin yoki pirimidinli), **uglevod-dezoksiriboza** va **fosfor kislota qoldig'i** uchraydi. Ko'pchilik dezoksiribonukleotidlarning tarkibiga purin hosilalari – **adenin va guanin**, pirimidin hosilalari – **sitozin va timin** asoslari kiradi. D NK zanjiridagi nukleotidlari o'rtasidagi bog'lanish fosfor kislotasining diefir hosilasining qo'shni dezoksiriboza qoldiqlarining gidroqsillari ($3'$ va $5'$) o'rtadagi bog'lar hisobiga amalga oshadi, ya'ni D NK polimer zanjiri dezoksiriboza va fosfatli qoldiqlar ketma-ketligidan iborat. Bu zanjir dezoksiriboza qoldig'iga yonbosh radikallar purin va pirimidin asoslari qo'shilgan bo'ladi. (4-rasm)


D NK molekulasida ikki nukleotid zanjirlarining yani ikkilangan zanjir ko'rinishida birlashgan bo'lib, bunda ikki zanjirning purin va pirimidin asoslari zanjirning ichki bo'shilg'ida joylashadi va bir-biri bilan vodorod bog'lari bilan bog'lanadi.

DNKning yarim konservativ ikkilanishi **D.J.Uotson** va **F.Krik** tomonidan ishlab chiqilgan modelga to'g'ri keladi. Bu sxemaga ko'ra, DNK replikatsiyasida purin va pirimidin asoslari o'rtaqidagi vodorod bog'lar uziładi. Polinukleotid zanjir bir-biridan ajraladi. Hosil bo'lgan har bir zanjir polimerizatsiya yo'li bilan o'ziga komplementar zanjirni karioplazmadagi mononukleotidlardan hosil etadi.

4. DNK reparatsiyasi

Tashqi muhit omillari xususan fizikaviy-ultrabinafsha, rentgen, kobalt nurlar kimyoiy-alkoloidlar va boshqa moddalar hujayraga ta'sir ko'rsatib DNK molekulasini shikastlantirishi mumkin. Buning natijasida nukleotidlар jufti orasidagi vodorod bog'lar buzilishi va nukleotidlар o'z o'midan qo'zg'alishi, parchalanishi mumkin. Agar mazkur mutatsiyalar unchalik katta bo'limasa, ular fenotipda namoyon bo'lmaydi. Bunga asosiy sabab hujayrada ana shunday shikastlarni bartaraf etadigan DNK molekulasini asl holatiga qaytaradigan reparatsion sistema mavjud bo'lib, uning faolligida shikastlangan qism ta'mirlanadi (6-rasm). Genetik reparatsion sistema alohida fermentlar kolleksiyasidan tashkil topgan. Shunday fermentlar qatoriga fotoliaza endonukleazalar-polimeraza, ligaza fermentlari kiradi.

6-rasmning chap tomonida DNKning ayrim qo'sh zanjirining bir tomonida shikastlanish fotoliaza, markazda esa DNK qo'sh zanjirining birida shikastlangan nukleotidlар endonukleaza fermenti faolligida olib tashlanishi, DNK polimeraza fermenti ishtirokida esa "teshikcha"ga yangi nukleotidlар joylashtirilganligi, hamda tuzatilgan nukleotidlар saytidagi uzelish DNK – ligaza yordamida tikib qo'yilishi berilgan. Rasmning o'ng tomonida DNK replikatsiya mobaynida shikastlangan alohida-alohida DNK zanjirlari o'zaro rekombinatsiyalanishi tusayli komplementarlik prinsipiiga ko'ra shikastlangan qismlar tiklanganligi ko'rsatilgan.



6-rasm. DNK reparatsiyasining uch yo'nalishi

5. Kariotip haqida tushuncha

Ma'lum turga tegishli organizmlarning turli somatik to'qimalarining hujayra xromosomalarini tadqiq etish shuni ko'rsatdiki, har bir tur uchun xromosomalarning o'ziga xos soni, shakli va tarkibi mavjuddir.


I-jadval

Ayrim o'simlik va hayvon turlarida xromosomalarning diploid to'plami.

№	Tur nomi	Xromosomalar soni
1.	Yumshoq bug'doy (<i>Triticum aestivum</i>)	42
2.	Qattiq bug'doy (<i>Triticum durum</i>)	28
3.	Arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	14
4.	Javdar (<i>Secale cereale</i>)	14
5.	Suli (<i>Avena sativa</i>)	42
6.	Makkajo'xori (<i>Zea mays</i>)	20
7.	Sholi (<i>Orusa sativa</i>)	24
8.	No'xat (<i>Pisum sativum</i>)	14
9.	Soya (<i>Glycine hispida</i>)	28
10.	Lyupin (<i>Lupinus albus</i>)	50
11.	Kartoshka (<i>Solanum tuberosum</i>)	48
12.	Piyoz (<i>Allium cepa</i>)	16
13.	Lavlagi (<i>Beta vulgaris</i>)	18
14.	Kungaboqar (<i>Helianthus annis</i>)	34
15.	Beda (<i>Medicago sativa</i>)	32
16.	Karam (<i>Brassica oleracea</i>)	18
17.	Bodring (<i>Succowis sativus</i>)	14
18.	Ot askaridasi (<i>Ascaris megalcephala</i>)	2, 4
19.	Daryo qisqichbaqasi (<i>Astacus fluviatilis</i>)	98
20.	Osiyo chigirtkasi (<i>Locusta migratoria</i>)	23
21.	Tut ipak qurti (<i>Bombyx mori</i>)	28, 56
22.	Ari (<i>Apis mellifera</i>)	16, 32
23.	Okun (<i>Perca fluviatilis</i>)	28
24.	Sazan (<i>Syprinus carpio</i>)	104
25.	Tovuq (<i>Gallus gallus</i>)	78
26.	Mushuk (<i>Felis catus</i>)	38

27.	Sichqon (<i>Mus musculus</i>)	40
28.	Kulrang kalamush (<i>Rattus norvegicus</i>)	42
29.	Shimpanze (<i>Anthropopithecus pan</i>)	48
30.	Odam (<i>Homo sapiens</i>)	46
31.	Meva pashshasi (<i>Drosophila melanogaster</i>)	8
32.	Quyon (<i>Lepus cuniculus</i>)	44
33.	Tulki (<i>Vulpes vulpes</i>)	38
34.	Uy pashshasi (<i>Musca domestica</i>)	12
35.	Suvarak (<i>Blatta orientalis</i>)	48
36.	It (<i>Sanis familiaris</i>)	75
37.	Ot (<i>Equus caballus</i>)	66

O'simlik va hayvonlarning ma'lum sistematik guruhli uchun xos bo'lgan somatik hujayra xromosomalarining soni, shakli va o'licheami **kariotip** deb ataladi.(7-rasm)



7-rasm. Odam kariotipi.

Har xil turlarga kiruvchi organizmlar hujayralarda xromosomalar shakliga ko'ra bir-biridan farq qiladi: xromosomalarning ba'zilarida uzun bo'lsa, ba'zilarida kaltaroq bo'ladi. Xromosomalar shakli va o'licheamlari bilan ham farq qilishi mumkin. Somatik hujayralarda xromosomalar soni jinsiylaridagi xromosomalar soniga nisbatan ikki marta ko'p. Chunki ular miqdorining yarmi ona jinsiylaridagi, yarmisi ota jinsiylaridagi o'tgan. Somatik hujayralarda xromosomalar soni **diploid to'plam** deyiladi va $2n$ bilan belgilanadi. Jinsiylaridagi xromosomalarning soni **gaploid to'plam** deyiladi va n bilan ifodalanadi. Diploid to'plamdagagi morfologik jihatdan bir-biridan farq qilmaydigan juft xromosomalar **gomologik xromosomalar** deyiladi. Ular ota va ona organizmlarning gaploid sondagi xromosomalarning qo'shilishi natijasida paydo bo'ladi. Kariotipdagi xromosomalar miqdori o'simlik va hayvonlarning sistematik guruhlarda egallagan mavqeい va o'mni bilan bog'liq emas. Shunga ko'ra sistematikaning quyi guruhlarida turgan

organizmlarda xromosomalar soni ko'p va aksincha, yuqori tabaqalarda turgan organizmlar esa kam sonli xromosomaga ega bo'lishi mumkin. Masalan, sazan balig'i 104ta, shimpanze maymuni 48ta xromosomalidir. Har bir turning somatik hujayralardagi xromosomalarning katta kichikligi, shaklining grafik tasviri **idiogramma** deb ataladi.

6.Hujayra bo'linishining norasmiy tiplari

Mitoz bilan birga somatik hujayralar bo'linishining boshqa turi **to'g'ridan-to'g'ri bo'linish yoki amitoz** ham mavjud. Bunda yadro oldin o'rtaidan ingichkalashib, so'ng ikkiga teng bo'linadi. Amitoz yo'li bilan oddiy organizmlar, maxsus hujayralar bo'linadi. Masalan, hayvonlarda jigar hujayralari, o'simliklar murtak parenximasidagi. Amitoz patologik xususan, saraton kasalligi hujayralarida ham uchraydi.

Amitoz boshlanishidan avval DNKnинг ikkilanishi sodir bo'ladi. Lekin xromosomalar va bo'linish urchug'i mikroskopda ko'rinnmaydi. Hujayralar o'rtaida yadro muddasining taqsimlanishi turliha bo'ladi. Shuning uchun bu hujayralar irlari jihatdan mukammal sanalmaydi.

Endomitoz bo'linishda xromosomalar sonining ikki hissa ortishi hujayra yoki yadroning bo'linishisiz sodir bo'ladi. Buning natijasida xromosomalar ikki hissa ortib, ular yadro ichida qoladi. Ba'zi hollarda hujayradagi xromosomalar soni bir necha o'n hissa ortib ketadi. Endomitoz har xil o'simlik va hayvon to'qimalarining hujayralarida uchraydi. Natijada polipliodiya hodisasi ro'y beradi.

Politeniya -- ba'zan hujayra bo'linishida xromatidalar tarqalib ketmay, bir-biriga yopishgan holda qoladi. Bu hodisa **politeniya** deb ataladi. Politeniya natijasida xromosomalar diametri ortadi, xromatidalar soni 1000-2000 ga yetadi va oqibatda "gigant" xromosomalar vujudga keladi.

Politeniya hodisasi ikki qanotli hasharotlarning so'lak bezi to'qimasidagi hujayralarda va ba'zi bir o'simliklar hujayrasida uchraydi.

7.Mitozning biologik ahamiyatini

Hujayraning mitotik bo'linishi yuqori darajadagi aniqligi bilan ajralib turadi. Mitoz mexanizmi organizmning evolyutsion taraqqiyotda million yillar davomida tarkib topgan. Mitoz bo'linish hujayralarning yashab qolishiga sababchi bo'ladi, aslida hayotni uzlusiz davom ettiradigan jarayondir.

Mitoz bo'linishda hosil bo'lgan qiz hujayralar ona hujayra singari xromosomalarning diploid to'plamiga ega bo'ladi. Hujayraning mitoz bo'linishi o'simliklarning vegetativ ko'payishini, hayvonlarning jinssiz ko'payishini, embrional va postembrional taraqqiyotning, tananing jarohatlangan qismini qayta tiklanishining asosini tashkil etadi. Mitoz tufayli organizmlarda irlari axborotning tekis taqsimlanishi amalga oshadi va bir butunligicha saqlanadi.

Savol va topshiriqlar

1. Mitotik sikl bilan mitozning nima farqi bor?
2. Mitoz fazalarini izohlang.
3. Xromosomalar tashqi qiyofasi bilan qanday xillarga bo'linadi?
4. Xromosoma strukturasining yaxshi bo'yaladigan qismlariga nima deyiladi?
5. DNK replikatsiyasi nima va u haqida qanday farazlar mavjud?
6. Nukleotidlardan tarkibiga nimalar kiradi?
7. DNK tuzilishida komplementarlik deb nimaga aytildi?
8. DNK va RNK orasida nima farq bor?
9. Hujayrada RNKning qanday xillari uchraydi?
10. Kariotipga ta'rif bering?
11. Gomologik xromosomalarga izoh bering.
12. Diploid to'plam bilan gaploid to'plam orasida qanday farq bor?
13. Mitoz bilan amitozni taqqoslang. Ular orasidagi o'xshashlik va farqni tushuntiring.
14. Endomitoz bilan politeniya hodisasidegi o'xshashlik va tafovut qanday?
15. Mitoz bo'linishni qanday biologik ahamiyati bor?
16. Kariotip bilan idiogramma o'rtaida nima farq bor?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Mitotik sikl nechta fazadan iborat?
A. 3 B. 4 S. 5 D. 6
2. Mitoz fazalari izchilligini ko'rsating.
A. Telofaza, profaza, anafaza, metafaza
B. Profaza, metafaza, anafaza, telofaza
S. Metafaza, anafaza, profaza, telofaza
D. Anafaza, telofaza, profaza, metafaza
3. Mitoz bo'linish qanday hujayralarga xos?
A. Somatik hujayralarga
B. Jinsiy hujayralarga
S. Miya hujayralariga
D. Jigar hujayralariga
4. Interfaza bosqichlari
A. G₁, S
B. S, G₂
S. G₁, G₂
D. G₁, S, G₂
5. Mitozning qaysi fazasida sentromerani bo'linishi va xromatidalarni tarqalishi ro'y beradi?
A. Metosentrik, submetosentrik
B. Akrosentrik, telosentrik
S. Kariokinez, sitokinez
D. A,B

- A. Profazada
- B. Metafazada
- S. Anafazada
- D. Telofazada

6. DNK replikatsiyasi to'g'risida nechta far

- A. 2
- B. 3
- S. 4
- D. 1

7. Mitoz bo'linishda xromosomalarni qanda

- A. Gaploid
- B. Diploid
- S. Triploid
- D. Tetraploid

8. DNK replikatsiyasi qachon ro'y beradi?

- A. G₁ da
- B. S da
- S. G₂ da
- D. Mitozda

9. Mitozning biologik ahamiyati

- A. Qiz hujayralarga genetik axborotni teki
- B. Hujayra sonini ortishi
- S. Jarohatlangan hujayralarni qayta tiklanishi
- D. A,S

10. DNK replikatsiyasi to'g'risidagi qaysi faraz Dj.Uotson va F.Krik tomonidan ishlab chiqilgan modelga to'g'ri keladi?

- A. Yarim turg'un
- B. Dispersion
- S. Endomitoz
- D. Turg'un

11. Pirimidin hosilalariga nima kiradi?

- A. Adenin va guanin
- B. Sitozin va timin
- S. Adenin va uratsil
- D. Sitozin va guanin

12. Sentromera joylashishiga qarab xromosomalarni qanday xillarga ajraladi?

- A. Metosentrik, submetosentrik
- B. Akrosentrik, telosentrik
- S. Kariokinez, sitokinez
- D. A,B

38. Jinsiy ko'payishning sitologik asoslari

Tayanch tushunchalar: Meyoz, Reduksion, ekvatsion, leptonema, zigonema, paxinema, diplonema, diakinez, kon'yugatsiya, sinapsis, krossingover, xiazma, interkinez, gametogenez, spermatogenez, oogenet, bo'linish, o'sish, yetilish va shakllanish, goniylar, spermatagoniy, oogoni, spermatozit I, oosit I, spermatozit P, spermatida, spermatozoid, spermatogenez, oosit P, birinchi tartibli yo'naltiruvchi tana, ootida, ikkinchi tartibli yo'naltiruvchi tana, tuxum, sporogenez, gametogenez, mikrosporogenez, megasporogenez, mikrospora, sporalarning tetradasi, vegetativ va generativ hujayra, megasporagenez, megagametogenez, mikropile, sinergidlar, markaziy yadro, xafaza, antipod, soxta urug'lanish, haqiqiy urug'lanish, pronukleus, kariogamiya, singamiya, qo'sh urug'lanish, partenogenez, ginogenez, androgenez, gaplofaza, diplofaza.

I. Hujayralaring meyoz bo'linishi

Jinsiy hujayralar **meyoz** bo'linish orqali amalga oshadi. Meyoz ham mitoz singari interfazadan boshlanadi. Interfazada xromosomalar ikki hissa ortadi. Meyoz yadroning ikkita ketma-ket bo'linishidan iborat. Birinchi - **reduksion** bo'linishda xromosomalar soni ikki marta kamayadi. Ikkinchi **ekvasion** (tenglashtiruvchi) bo'linishda gaploid xromosomali jinsiy hujayralar-gametalar hosil bo'ladi.


Birinchi Reduksion bo'linishga taalluqli bosqichlar rim raqami I bilan, ikkinchi ekvatsion bo'linish bosqichlari II bilan belgilanadi. Reduksion bo'linish yadroning profaza I dan boshlanib, telofaza I gacha davom etadi. Ekvatsion bo'linish esa profaza II dan telofaza II gacha bo'lgan davrni qamrab oladi.

Reduksion bo'linish fazalarining orasida eng murakkab va uzoq muddatli **profaza I** dir. U ketma-ket keluvchi **leptonema**, **zigonema**, **paxinema**, **diplonema**, **diakinez** bosqichlaridan tashkil topgan. Leptonema bosqichida interfazadagi yadro to'rsimon ingichka iplarga - xromonemalarga aylanadi. Bu xromonema iplari diploiddir. Ular interfaza bosqichidayoq qo'shaloqlangan bo'lib, bu elektron mikroskop yordamida tasdiqlangan. **Zigonema** bosqichida gomologik xromosoma iplari bir-biriga tortiladi. Ular ichki qismidan boshlab uzunasiga birlashib ketadi. Gomologik xromosomalarning uzunasiga birlashishi **kon'yugatsiya** yoki sinapsis deyiladi.

Xromosomalar sinapsisi tugallanishi bilan yadro keyingi **paxinema** bosqichiga o'tadi, bunda xromosoma iplari eng ko'p buralib, ular yo'g'on tortadi. Kon'yugatsiyalananuvchi bir juft xromosoma **bivalent** deb ataladi, u to'rtta xromatidalardan tashkil topadi. Paxinemada **krossingover** ya'ni

kon'yugatsiyalananuvchi gomologik xromosomalarning xromatidalari o'tasida o'xshash qismlarning o'zaro almashinishi sodir bo'ladi. Natijada xromosomalardagi genlarning joylashish tartibi va o'rni o'zgaradi. Paxinemaning oxirgi bosqichida va keyingi bosqich **diplonemada** kon'yugatsiyalashgan gomologik xromosomalarning bir-biridan ajralishi yuz beradi. Gomologik xromosomalar odatda ichki qismi bilan bir-biridan ajrala boshlaydi va natijada X ga o'xshash shakllari hosil bo'ladi. Bu holat **xiazma** deyiladi. Xiazmalar soni gomologik xromosoma uchlarini harakatlanishi tufayli asta-sekin kamayadi. Profaza I ning oxirgi bosqichi bo'lgan **diakinezda** gomologik xromosomalar spirallahishi hisobiga qisqarib, yo'g'onlashadi. Bivalentlar soni gaploidga aylanadi. Bu bosqichda yadrochalar va yadro qobig'i yo'qoladi.

Metafaza I da xromosomalar o'z sentromerlari bilan birgalikda ekvatorda to'g'ri chiziq bo'ylab joylashadi. **Anafaza I** da gomologik xromosomalar xromatidalarga ajralgan holda qarama-qarshi qutblarga tarqaladi. Oqibatda qiz hujayralarning yadrosida xromosomalar soni teng ikki hissaga kamayadi. Har bir juftdagagi ota va ona xromosomalari istalgan qutblarga teng imkoniyatlarda tarqalishi mumkin.



8 -rasm. Meyoz sxemasi. A va V gomologik xromosomalarning har xil juftlari.

Reduksion bo'linishning keyingi fazasi **telofaza I** bo'lib, u qisqa vaqt davom etadi. Bu bosqichda xromatinlarning despirallahishi, yadro qobig'i hosil bo'ladi. **Telofaza I** dan so'ng doim ham sitokinez ya'ni sitoplazmating bo'linishi ro'y beravermaydi. Ba'zan bu jarayon meyzozning ikkinchi bo'linishdan so'ng amalga oshadi.

Meyozning birinchi va ikkinchi bo'linishi o'rtasidagi bosqich **interkinez** deb ataladi. Interfazadan farqli o'laroq, interkinezda xromosomalar reproduksiyasi va DNK replikatsiyasi ro'y bermaydi. Interkinezda har bir xromosoma qo'sh xromatidalardan tashkil topgan bo'ladi. **Profaza II** mitoz profazasidan farq qilmaydi ya'ni yadro membranasi, yadrocha yo'qoladi, xromosomalar shakllanadi.

Metafaza II da xromosomalar o'z sentromeralari bilan ekvator tekisligida joylashadi.

Anafaza II da sentromerlar bo'linadi va har bir xromatida mustaqil xromosoma bo'lib qoladi.

Telofaza II da xromosomalar qutblarga tarqaladi va sitokinez amalga oshadi, ya'ni I meyoz bo'linish natijasida har bir gaploid sondagi xromosoma juftligiga ega bo'lgan ikkita yadro hosil bo'ladi. Ikkinci meyoz bo'linishda har bir yosh yadro yana bo'linadi, biroq bunda qutblarga yosh xromatidalardan vujudga kelgan xromosomalar tarqaladi. Binobarin meyoz bo'linishga uchragan har bir hujayradan gaploid xromosoma to'plamiga ega to'rtta jinsiy hujayra-gameta hosil bo'ladi.

2. Hayvonlarda gametogenez

Jinsiy hujayralarning hosil bo'lish jarayoni **gametogenez** deyiladi. Erkak jinsiy hujayralarni hosil bo'lishi — **spermatogenez**, urg'ochi jinsiy hujayralarni hosil bo'lishi — **oogenez** deyiladi. Gametogenez to'rtta - **ko'payish, o'sish, yetilish va shakllanish** bosqichlaridan iborat. Hayvonlarda jinsiy hujayralar xuddi somatik hujayralardek embrional hujayralardan rivojlanadi. Murtak hujayralardan bora-bora jinsiy bezlar va jinsiy hujayralar taraqqiy qiladi. **Ko'payish** bosqichida murtak hujayralari bir necha bor mitoz orqali bo'linib gonial hujayralarni — **goniylarni** hosil qiladi. Oldiniga ular ikkala jins organizmlarda o'xshash bo'lsada, keyinchalik tabaqlananib, erkaklarda **spermatagoniy**, urg'ochi organizmlarda **oogoniya** ajraladi.

3. Spermatogenez


Urug'dondagi maxsus to'qima oldin mitoz yo'li bilan bir necha marota bo'linib, o'chamlari kichraygan spermatogoniylarni hosil etadi. Shundan so'ng **o'sish** bosqichi boshlanadi. Ular yana mitoz yo'li bilan bo'linib birinchi tartibli spermatotsitlarga aylanadilar. **Yetilish** bosqichida birlamchi spermatotsit hujayralari meyoz bo'linishga o'tadilar. Reduksion bo'linishdan so'ng ikkita ikkinchi tartibli spermatotsitlar hosil bo'ladi. Ekvatsion bo'linish natijasida 4 spermatidalar rivojlanadi (9-rasm).

Shakllanish bosqichida spermatidalarining **spermatozoidga** aylanishi kuzatiladi. Bu jarayonga yadro va sitoplazmaning barcha elementlari

qatnashadi. Yetilgan spermatozoid boshcha, bo'yin va dum qismalaridan tashkil topadi. (10-rasm) Spermatozoidning bosh qismida Goldji apparatidan hosil bo'lgan akrosoma joylashadi. U fermentlarga boy bo'lib, urug'lanish paytida tuxum hujayra qobig'ini eritadi. Akrosomadan keyin bosh qismda yadro joylashgan. Spermatozoidning bo'yin qismida sentriola, mitoxondriyalar bo'ladi. Dum qismi spermatozoidning harakatlanishini ta'minlaydi.

4. Oogenez

Urg'ochi organizmlarning jinsiy hujayralarini rivojlanishi **oogenez** deyiladi. Oogenez jarayonining spermatogenezdan farqi shundan iboratki, birinchidan, birlamchi **oosit (ootsit I)** ning o'sish bosqichi ko'proq davom etadi. Ikkinchidan oositda oziq moddalarning yig'ilishi ro'y beradi. Oosit I meyozning Reduksion bo'linishidan so'ng ikkita hujayra - biri yirik **oosit II**, ikkinchisi **oosit** mayda oosit II hosil etadi. U **birinchi tartibli yo'naltiruvchi tana** deb ataladi. Ekvatsion bo'linishdan so'ng oosit II dan bitta yirik **ootida** va bitta mayda **ootida**, birinchi tartibli yo'naltiruvchi tanadan bo'lsa ikkita mayda ootida hosil bo'ladi. Shunday qilib meyozning Reduksion va ekvatsion bo'linishidan so'ng to'rtta ootidalar hosil bo'ladi.




9- rasm. Erkak (spermatogenez) va urg'ochi (oogenez) hayvon jinsiy hujayralari rivojlanishining solishtirma sxemasi. Hujayralarda bir just xromosomalar tasvirlangan

Ular sporalarning tetradi deb ataladi. Mikrosporalar hosil bo'lgandan so'ng mikrogametogenez boshlanadi. Har bir mikrospora mitoz bo'linishi oqibatida **vegetativ va generativ** hujayralarning hosil bo'lishiga olib keladi. Keyinchalik vegetativ hujayra va uning yadrosi bo'linmaydi. Unda oziq moddalar to'planadi, ular generativ hujayraning bo'linishini ta'minlab beradi. Generativ hujayra yana bo'linib, **ikkita spermiyalar** rivojlanadi. Shunday qilib, **yetilgan chang donachasi bitta vegetativ hujayra va ikkita generativ yadrodan** tashkil topadi.

Urug'chi hujayraning hosil bo'lishi **megasporagenez va megametogenez**. Yosh urug'kurtakning subepidermal qavatida arxeospora hujayra yetishadi. U reduksion usulda bo'linib bitta yirik, bitta mayda sporani hosil qiladi. Bu sporalar ekvatsion usulda bo'linish natijasida bitta yirik, uchta mayda spora rivojlanadi. Uchta maydasi keyinchalik yemirladi. Qolgan bitta yirik spora gaploid to'plamli xromosomaga ega bo'ladi. Bu spora uch marotaba mitoz usulda bo'linib 8 yadroli murtak xaltachasini hosil qiladi. Murtak xaltachasining **mikropile** (spermiyalar kiradigan joy) qismida to'rtta yadro joylashib, ularning **ikkitasi sinergidlari** deb nomlanadi, **bittasi tuxum hujayrani** hosil qiladi, to'rtinchchi yadro bo'lsa murtak xaltachasini markazidan o'rinn oladi. Murtak xaltachasini mikropilega qarama-qarshi xalazal qismida ham to'rtta yadro joylashib, ulardan bittasi markazga intilib mavjud markazdagi yadro bilan qo'shilib diploid to'plamli **markaziy yadroni** tashkil qiladi. Murtak xaltachasining **xalazal** tomonida qolgan uchta yadro qo'shilib ularni **antipod** deb ataladi. Sinergid yadrolari va antipod hujayralari murtakning rivojlanishida yordamchi funksiyalarni bajarib keyinchalik parchalanib ketadi.

Shunday qilib murtak xaltachadagi 8 hujayradan 6 tasi gaploid xromosomalni, murtak xaltachasini markazidagi ikkitasi o'zaro qo'shilib diploid xromosomalni hujayraga aylanadi.



12 - rasm. O'simliklarning qo'sh urug'lanish sxemasi. 1 – chang naychasining murtak xaltachasiga o'sib kirishi. 2 – naycha ichidagi spermiyalarning murtak xaltachasiga quyilishi. 3 – urug'lanishdan so'ng murtak xaltachasi.

6.O'simliklar va hayvonlarda urug'lanish

Hayvonlarda urug'lanish bir necha fazadan iborat. Birinchi fazada spermatozoid tuxum hujayraning biror yuza qismiga ilinadi yoki uning ichiga kiradi. Ba'zi hollarda masalan, spermatozoidni boshi tuxum hujayraga tegib uni faollashtirishi, lekin u bilan qo'shilmasligi mumkin. Bunday hodisa **soxta urug'lanish** deb ataladi. Ayrim holatlarda tuxum hujayraga bir necha spermatozoidlar kirishi mumkin. Uni **polispermiya hodisasi** deb ataladi. Tuxum hujayra ichiga kirgan spermatozoid uning yadrosi bilan qo'shilishga tayyorgarlik ko'radi, ya'ni spermatozoid yadrosi kattalashib interfaza bosqichiga o'tadi. Bunday yadro **erkak pronukleus** deb nomlanadi.

Spermatozoid tuxum hujayra yuzasiga ilinganda yoki ichiga kirganda turli xil hayvonlarda tuxum hujayrasi yetilish bosqichining turli davrida bo'lishi mumkin. Spermatozoid bilan qo'shilishga tayyor tuxum hujayra **urug'ochi pronukleus** deb ataladi.

Spermatozoidning yadrosi bilan tuxum hujayra yadrosining qo'shilishi **haqiqiy urug'lanish** deyiladi. Tuxum hujayrasining haqiqiy urug'lanishi yetilish bosqichida yoki tuxum hujayrasining meyozi bo'linishi to'liq tugagandan keyin ro'y beradi. Chunki tuxum hujayra ichiga spermatozoidni kirishida tuxum hujayra: 1) tinch holatda oosit I; 2) metafaza holatdagi oosit I; 3) metafaza yoki anafaza holatdagi oosit II va niroyat yetilgan tuxum hujayra holatida bo'lishi mumkin.

Binobarin, tuxum hujayraga kirgan spermatozoid undagi meyozi jarayonini tugashini «kutadi». Tuxum hujayra yadrosi bilan spermatozoid yadrosining qo'shilishi **kariogamiya** deyiladi. Demak, hayvonlarda urug'lanish ikki bosqichdan, **singamiya** – tuxum va urug' hujayralarning, **kariogamiya** – ularning yadrolarini qo'shilishidan iborat.

O'simliklarda urug'lanish o'z mohiyatiga ko'ra hayvonlardagi urug'lanishga o'xshash ya'ni ikkita gaploid yadroning qo'shilishidan tashkil topadi. Shu bilan birga o'simliklarda urug'lanishning o'ziga xos jihatlari bor.

Ochiq urug'lillardagi urug'lanishni dastlab tasvirlagan olim N.N.Gorjankin, yopiq urug'lillarda esa E.Strasburger hisoblanadi. O'simliklarda mikrogametogenez chang hujayrasining hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Urug'chi gulining ustunchasiga kelib tushgan chang vegetativ hujayrali chang naychasi hosil qilib, urug'kurtak tomon harakatlanadi va uni ichida joylashgan murtak xaltachasining mikropilega yetgach, u sinergidlarga tegib yoriladi. Chang hujayrasidagi spermianing biri murtak xaltasidagi tuxum hujayra bilan, ikkinchisi esa markaziy yadro bilan qo'shiladi (12-rasm). Urug'langan tuxum hujayrada xromosomalarning

diploid to'plami tiklanadi va u urug'ning murtak qismini hosil qiladi. Murtak xaltasidagi markaziy yadro bilan spermiya qo'shilishidan xromosomalarning triploidi hosil bo'lib, undan urug'ning endospermasi rivojlanadi. Chang naychasidagi bir spermianing tuxum hujayra, ikkinchisining markaziy yadro bilan qo'shilishi **qo'sh urug'lanish** deyiladi. U 1898-yilda rus olimi **S.G.Navashin** tomonidan kashf qilingan.

Xulosa qilib aytganda jinsiy ko'payishda 1) erkak va urg'ochi gametalarning hosil bo'lishi; 2) urug'lanish mobaynida qarama-qarshi jins gametalarning o'zaro qo'shilishi; 3) meyoza gomologik xromosomalarning konyugatsiyalanishi; 4) qarama-qarshi jinslarning irlari omillarini birikishi ro'y beradi.

7.Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplari

Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplariga **partenogenetik**, **ginogenezi** va **androgenezi** kiradi. Jinsiy ko'payishning qayd etilgan tiplari meyoza bo'linish to'liq va qisman yo'qolishi va uning o'mriga jinsiy sikl mitoz bilan almashishi oqibatida paydo bo'lган.

Yuqorida biz jinsiy ko'payish vaqtida otalik, onalik gametalarni qo'shilishi to'g'risida aytib o'tdik. Ayrim hayvon va o'simlik turlarida ko'payish spermatozoidsiz ro'y berishi mumkin. Murtakni otalanmagan tuxum hujayradan rivojlanishi **partenogenetik** deb ataladi. Partenogenetik tabiiy va sun'iy bo'ladi. Tabiiy partenogenetikda voyaga yetgan tuxum hujayra rivojlanib normal organizmni hosil qiladi. Tabiiy partenogenetik tuban qushlarda (tustovuq) kuzatiladi. Partenogenetik doimiy va qisman bo'lishi mumkin. Ba'zi hayvonlarda urug'lanmagan tuxum hujayradan faqat urg'ochi, urug'langan tuxum hujayradan esa ham urg'ochi, ham erkak jinsli organizmlar rivojlanadi. Ikkinci holatda esa urug'lanmagan tuxum hujayradan faqat erkak, urug'langanidan esa urg'ochi organizm hosil bo'ladi. Tuban qisqichbaqasimonlardan dafniyalarda urg'ochi organizm diploid, erkaklariga gaploid xromosomalarning to'plamiga ega bo'ladi. Qulay sharoitda dafniya partenogenetik yo'l bilan ko'payadi. Natijada faqat urg'ochi organizmlar voyaga yetadi. Noqulay sharoitda (ozuqa yetishmaganda, harorat pasayganda) urg'ochi dafniya xromosomalarning diploid bo'lgan tuxum hujayrani hosil qiladi va undan erkak dafniyalar rivojlanadi.

Sun'iy partenogenetik tajribada tuxum hujayrani har xil omillar ta'siri bilan faollashtirish natijasida hosil qilinadi. Bunday omillarga yuqori harorat, har xil kislotalar, yorug'lik bilan tuxum hujayraga ta'sir etib

uni faollashtirish kabilari kiradi. Sun'iy partenogenetik tuxum qurtida, baqalarda, quyonlarda, suv o'tlarida, zamburug'larda, yuksak o'simliklar (g'alladoshlar, dukkakli o'simliklar)da hosil qilingan.

Partenogenetik alohida xili bo'lib **ginogenezi** sanaladi. Ginogenezi germafrodit yumaloq chuvalchanglarda, baliqlardan - kumushsimon karas balig'ida kuzatilgan. Ginogenezdak tuxum hujayrani faollashtirishda qatnashadi, lekin u bilan qo'shilmaydi.

Ginogenezing teskari ko'rinishi bo'lib **androgenezi** hisoblanadi. Agar tuxum hujayrada yadro qanday sababga ko'ra nobud bo'lsa, tuxum hujayraga kirgan spermatozoidning ikkitasi bir-biri bilan qo'shib xromosomaning diploid to'plamini hosil qilishi mumkin. Bunday xromosoma to'plamiga ega zigotalaridan rivojlangan organizmda faqat ota organizm belgilari namoyon bo'ladi. Partenogenetik, ginogenezdak rivojlangan organizmdan urg'ochi, androgenezdak esa erkak jinsiga mansub organizmlar yetishadi.

8. O'simlik va hayvonlarda nasllarning gallanishi

Hayvon, o'simlik va mikroorganizmlarni hayot siklida gaplofaza va diplofaza doimo gallanib turadi. Gaplofaza hujayralarda xromosomalarning gaploid to'plami, diplofazada esa diploid to'plami bo'ladi. Hujayralarda xromosomalarning gaploid to'plami meyoza bo'linishda, diploid to'plami esa urug'lanish natijasida yuzaga keladi. Har xil organizmlarda gaplofaza va diplofazaning gallanishi va ularning davomiyligi turlicha. Ko'p hujayrali organizmlar hayot siklida diplofaza uzoq muddatli, gaplofaza qisqa muddatni, ya'ni gametalarning mayjudligi bilan belgilanadi. Morfologik va tuzilish jihatidan hayvonlarning gaplofaza va diplofazasi o'zaro farq qiladi. Gaplofaza bir hujayrali, diplofaza esa ko'p hujayralidir. Gulli o'simliklarda ham gaplofaza qisqa muddatli va u chang donasi, murtak xaltachasidan iborat. Har ikki holda ota-onalik o'simliklar diplofaza sporafitdan tashkil topadi.

Hayvon va o'simliklarda gaplofaza qisqargan bo'lib, asosiy hayot sikli diplofaza holatda bo'ladi. Tuban o'simliklar va mikroorganizmlarda aksincha, organizm hayoti gaplofaza holatda bo'lib, diplofaza niroyatda reduksiyalashgan holatadir. Diplofaza zigota ko'rinishida bo'lib, u tezda meyoza bo'linishga o'tadi va sporalarini hosil qiladi. Gaplofaza yakka hujayra yoki ko'p hujayrali holatda bo'ladi. Hayot sikllarini bilish genetik tahlil uchun niroyatda kerak. Chunki, gaplofaza va diplofazada genlarning ta'siri har xil bo'ladi. Gaplofazada barcha genlarning ta'sirini bilish imkoniyati bo'ladi, chunki genlar toq holatda namoyon bo'ladi. Shunga

ko'ra ular ta'sirida paydo bo'lgan irlisyat va irlisylanishni o'rganish mumkin. Bakteriyalarda jinsiy jarayon gaplofaza holatda ro'y beradi. Konyugatsiya paytida bakteriyalar o'zaro ayrim genetik axborot ayriboshlashadi.

9. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyati

Meyoz bo'linish natijasida xromosomalar sonining kamayishi kuzatiladi. Agar meyoz bo'linish davomida xromosomalar soni kamaymaganda edi, har bir yangi avlodda urug'lanish tufayli xromosomalar soni tinmasdan ikki hissadan ortib boraverardi.

Meyoz bo'linish va gametalalar hosil bo'lishi davomida rivojlangan gametalarda ota-onalarning xromosomalarini aralashgan holda bo'ladi. Xromosomalarning turli xil kombinatsiyalari hosil bo'ladi. Bundan tashqari gomologik xromosomalarning kon'yugatsiyasi, ya'ni o'xshash qismlari bilan ayriboshlanishi (crossingover) tufayli ham xromosomalarda irlisyat axborotning yangi to'plami paydo bo'ladi. Ota-onalarning xromosomalarini kombinatsiyalashuviga ular orasidagi crossingover natijasida yangi tarkibli xromosomalarini hosil bo'lishi organizmlarda irlisyat o'zgaruvchanlikni keltirib chiqaradi. Irlisyat o'zgaruvchanlik organizmlar evolyutsiyasiga olib keluvchi asosiy omillardan biri sanaladi. Ayrim holatlarda meyoz jarayonida xromosomalarning gametalarga tarqalishi teng bo'lmasligi, 1-2 xromosoma normadan ortiqcha, ikkinchisida esa 1-2 xromosoma kam tarqalishi mumkin. Ular monosomik va nullisomik. Bunday holat organizm rivojlanishining buzilishiga, xususan, odamlarda turli kasalliklarning kelib chiqishiga olib keladi.

Savol va topshiriqlar

1. Meyoz bo'linish qanday hujayralarda kuzatiladi?
2. Hujayraning meyoz bo'linishini mitoz bo'linish bilan taqqoslang. Ular orasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlang.
3. Reduksion bo'linishni anafazasi bilan ekvatson bo'linishning anafazasida qanday o'xshashlik va tafovut bor?
4. Reduksion bo'linishning profazasi mitozning profazasidan nimasi bilan ajralib turadi?
5. Interfaza bilan interkinezning orasidagi farq nimadan iborat?
6. Hayvonlardagi gametogenez tafsilotini tushuntiring.
7. Birlamchi, ikkilamchi ootsitlar va spermatotsitlarning rivojlanishida qanday o'xshashlik va tafovutlar kuzatiladi?
8. Mikrosporagenez va mikrogametagenez tafsilotlarini izohlang.
9. Megasporogenez va megagametagenez jarayonlarini izohlang.
10. Hayvonlarda urug'lanish qanday sodir bo'ladi?

11. Gulli o'simliklarda qo'sh urug'lanish qanday amalga oshadi?
12. Qo'sh urug'lanishning biologik ahamiyati nimadan iborat?
13. Partenogeneza bilan androgenezi taqqoslang. Ularning bir-biridan farqi nimada?
14. O'simlik va hayvonlarda nasllar gallanishining genetik ahamiyatini tushuntiring.
15. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyatini yoriting.

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Qachon gomologik xromosomalar konyugatsiyasi va krossingoveri ro'y beradi?

- A. Profaza I
- B. Metafaza I
- C. Profaza II
- D. Anafaza II

2. Konyugatsiya va krossingover tufayli xromosomalar:

- A. Ikki hissa ortadi
- B. Ikki qutbga bir maromda tarqaladi
- C. Bo'laklarga bo'lindi
- D. Genetik axborot bilan almashinadi

3. I tartibli spermatositdan hosil bo'ladigan spermatozoidlar soni

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

4. I tartibli oositlardan hosil bo'ladi

- A. 4 tuxum hujayra
- B. 1 tuxum hujayra, 3 yo'naltiruvchi tanacha
- C. 2 tuxum hujayra, 2 yo'naltiruvchi tanacha
- D. 3 tuxum hujayra, 1 yo'naltiruvchi tanacha

5. Gametogenezni qaysi bosqichida meyoz bo'linishi sodir bo'ladi?

- A. Ootsit spermatozit II
- B. Ootsit II spermatozit I
- C. Ootsit II spermatozit II
- D. Ootsit I spermatozit I

6. Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplari

- A. Ovogenez, partenogenez
- B. Spermatogenez, androgenez
- C. Ovogenez, spermatogenez
- D. Partenogenez, androgenez

7. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyati

- A. Diploid to'plamli xromosomalar, gaploid to'plamli gametalarga aylanadi
- B. Hujayradagi xromosomalarning diploid to'plami saqlanadi
- C. Gomologik xromosomalar konyugatsiyasi va krossingover natijasida irlsiy axborotni ayirboshlanishi sodir bo'ladi
- D. A-S

8. Qaysi o'simliklarda qo'sh urug'lanish sodir bo'ladi?

- A. Suv o'tlarida
- B. Sporali o'simliklarda
- C. Yopiq urug'li o'simliklarda
- D. Ochiq urug'li o'simliklarda

9. Tuxum va urug' hujayra yadrolarini qo'shilishi qanday nomlanadi?

- A. Kariogamiya
- B. Sitogamiya
- C. Singamiya
- D. Shizogamiya

10. Qo'sh urug'lanish bu...

- A. Markaziy hujayra bilan spermiy hujayrasining qo'shilishi.
- B. Tuxum hujayra bilan spermiy xujayrasining qo'shilishi.
- C. Bir spermiy tuxum xujayra bilan, ikkinchisi markaziy hujayra bilan qo'shilishi.
- D. Chang naychasini mikropile tomoniga qarab o'sishi.

11. Ginogenez qaysi organizmlarda kuzatiladi?

- A. Kumushsimon karas, yumaloq chuvalchang.
- B. Tut ipak qurti, baqalar.
- C. Asalari, qisqichbaqa.
- D. Tut ipak qurti, asalari.

II-BOB. IRSIYAT QONUNLARI

48. Monoduragay chatishtirish

Tayanch tushunchalar: Duragaylash, monoduragay chatishtirish, ota-

ona organizmlari, duragay avlod, P, ♀, ♂, X, F ramzlari, dominant, retsessiv, Mendelni birinchi qonuni, Mendelni ikkinchi qonuni, pennet katagi, allelomorf, allelizm, allel holat, fenotip, genotip, geterozigota, gomozigota, fenotip bo'yicha nisbat, genotip bo'yicha nisbat, gametalar sofligi farazi, takroriy chatishtirish, bekross, tahliliy chatishtirish, oraliq chatishtirish, ko'p tomonlama allelizm, kodominantlik, χ^2 usuli, ozodlik darajasi.

1. Mendelning birinchi va ikkinchi irlsiyat qonunlari

Genetikada belgilarning irlsiylanishini, o'rganishda keng qo'llaniladigan metod **duragaylash*** ya'ni muqobil belgilari bilan farqlanuvchi organizmlarni chatishtirish hisoblanadi.

Chex tabiatshunosi G. Mendeldan oldin ham tadqiqotchilar turli o'simlik va hayvonlarning bir-biridan belgilari bo'yicha farq qiluvchi formalarini chatishtirganlar, biroq irlsiyat qonunlarini ochishga muvaffaq bo'imadilar. Irsiyat qonunlari birinchi marotaba G. Mendel tomonidan kashf qilindi. Olim irlsiyat qonunlarini duragaylash metodi asosida kashf etdi.

Quyidagi omillar Mendel muvafiqiyatlarini ta'minlagan:

1. Chatishtirish uchun qulay bo'lgan no'xat o'simligini tanlanganligi va ular orasidan bitta, ikkita, uchta turg'un belgisi bilan farq qilgan formalarni chatishtirib duragaylar olinganligi;



13 -rasm. G. Mendel
(1822-1884).

* Duragaylash metodidan foydalanganda tubandagi ramziy belgilarni bilsish kerak. Chatishtirishda qatnashayotgan ota-ona organizmi oldiga "P" harfi qo'yiladi. U lotin tilidagi *parentale* – ota-ona so'zining bosh harfidir. Urg'ochi jins ♀ (Zuhro sayyorasi, dastali ko'zgu ramzi), erkek jinsi ♂ (Mars sayyorasi, qalqon va nayza ramzi) belgisi bilan ifodalanadi. Chatishtirish belgisi "X" hisoblanadi. Duragay organizmlar oldiga "F" harfi qo'yiladi, u lotincha filiale (farzandlar) so'zining bosh harfini ifodalaydi. Duragayni nechanchi avlodga tegishligi F indeksiga raqam, ya'ni F₁, F₂, F₃ bilan ko'rsatiladi.

2. Kelgusida har bir duragay o'simlik naslini alohida ekib, ularda ota-onal belgilarini qanday rivojlanganligini aniqlanganligi;

3. Duragaylarni o'z-o'ziga chatishtirib ularning ikkinchi, uchinchi va keyingi avlodlarida ota-onal o'simliklarga o'xshash formalarni miqdorini aniqlanganligi va ularni matematik-statistik metod bilan tahlil qilinganligi;

4. Tadqiqot natijalarini xulosalab, irsiyat qonunlarini ixtiro qilinganligi;

Mendel tajribalarini birtida no'xat doni rangi sariq va yashil bo'lgan o'simliklar chatishtirildi. Bitta turg'un belgisi bilan farqlanuvchi organizmlarni chatishtirishga **monoduragay chatishtirish** deyiladi. Chatishtirish natijasida olingen barcha duragay o'simliklar doni sariq rangda ekanligi ma'lum bo'ldi. Boshqa tajribada no'xat o'simligining guli qizil va oq formalari chatishtirilgan edi, duragaylarning guli bir xil qizil rangda ekanligi aniqlandi. Duragaylarning birinchi avlodida yuzaga chiqqan belgilarni **dominant** (ustun), yuzaga chiqmagani esa **retsessiv** (yashirin) belgi deb nomjandi. **Ota-onal organizmlardagi belgining duragagaylarning birinchi avlodida birining ikkinchisi ustidan dominantlik qilishi Mendel tomonidan kashf etilgan irsiyatning birinchi qonunidir.** Mazkur qonunni ba'zan duragay organizmlar **birinchi avlodida belgilarning bir xillik qonuni** deb ham yuritiladi.


Yuqoridaq tajribada qayd qilingan F_1 duragaylar o'z-o'zi bilan chatishtirilsa, ulardan olingen ikkinchi avlodda don rangi yoki gul rangi bo'yicha xilma-xillik kuzatilgan. Duragay organizmlarda urug'chi changechi belgilari o'xshash doni sariq yoki yashil, guli qizil yoki oq rangli o'simliklar uchragan. Dominant belgili o'simliklarning retsessiv belgili o'simliklarga nisbatan miqdori o'rtacha 3 marotaba ko'p bo'lgan. Bu jarayonni xulosalab Mendel ikkinchi irsiyat qonunini, ya'ni **ikkinchi avlod duragaylarda ota-onal belgilarning ajralishini** va ularning nisbatini 3:1 holatda bo'lishini ixtiro qilgan.

F_1 da hosil bo'lgan oq gulli no'xatlarni o'zaro chatishtirilganda F_2 da faqat oq gulli o'simliklar rivojlanadi. F_2 dagi qizil gulli no'xatlarni chatishtirilganda ulardan 1/3 qismi F_1 da faqat qizil gulli, 2/3 qismi bo'lsa F_2 dagi singari qizil gulli va oq gulli o'simliklarga ajralish beradi. Bunday hodisa no'xat o'simligining donini rangi bo'yicha F_1 dan F_2 ni olganda ham namoyon bo'lgan (14-rasm). Bu tajriba asosida Mendel duragaylar tashqi belgilari bilan bir xil bo'lsada o'simliklar irsiy omillari bo'yicha farqlanishi mumkin ekan, degan xulosaga keldi.

Genetikada organizmning tashqi, ichki belgi -xossalarning majmui **fenotip**, irsiy omillarning yig'indisi esa **genotip** deb ataladi. Yuqoridaq misolda donning, gulning ranglari fenotip, ularning rivojlanishiga mas'ul omillar genotip deyiladi.

2. Gametalarning soqlik farazi

Mendel monoduragay chatishtirish natijalarini tahlil qilgan holda birinchi avlodda retsessiv belgini namoyon bo'lmasligini, lekin F_2 da dominant belgili organizmlar bilan bir qatorda retsessiv belgili organizmlar qayta hosil bo'lishiga e'tibor berdi. U bu hodisani sababini tushuntirish uchun **gametalar soqligi farazini** ilgari surdi.



14 - rasm. No'xat o'simligining duragaylarida gul rangining irsiylanishi.


Bu farazga ko'ra har qanday organizmda ko'zga ko'rindigan tashqi belgilardan tashqari ularni avloddan-avlodga tashib yuruvchi irsiy omillar ham bo'ladi. Mendel ana shu irsiy omillarni lotin alifbosining harflari bilan ifodalash lozimligini qayd qildi. Bunda dominant belgining irsiy omilini bosh harf, retsessiv belgining irsiy omilini esa kichik harf bilan ifodalash kerakligini uqtirdi. Masalan, no'xat donining rangini sariqlik irsiy omilini "A", yashillik irsiy omilini "a" bilan ifodaladi.

Organizmlarda irsiy omillar just holda bo'ladi, chunki ulardan biri ona organizmdan o'tgan bo'lsa, ikkinchisi ota organizmdan kelgan bo'ladi. Belgini **muqobilligini** keltirib chiqaruvchi genlar justiga **allelomorf** justlik deyiladi. Har bir gen ikki xil holatga **dominant allel holat -A, retsessiv allel holat -a** bo'ladi. Modomiki shunday ekan, u holda chatishtirishda qatnashgan sariq donli no'xatning irsiy omil justligi AA, yashil no'xatning irsiy omil justligi esa aa ko'rinishida bo'ladi. Tabiiy ravishda sariq donli no'xatlarni gametalarida "A" omili, yashil no'xatning gametalarida "a" omili uchraydi. Chatishtirish chog'ida changechi va urug'chi gametalaridagi "A" va "a" allellar o'zaro qo'shilganligi sababli F_1 duragayida irsiy omillar "Aa" genotip holda namoyon bo'ladi. F_1 organizm rivojlanish davrida ularda yetishgan jinsiy hujayralar — gametalarni birida A, ikkinchisida esa a irsiy allellar uchraydi. Agar F_1 avlod duragaylari o'z-o'zi bilan chatishtirilsa, u holda urug'chi o'simligi A va a irsiy omilga, changechi o'simlik ham A va a irsiy allellarga ega gametalarning hosil qiladi. Urug'lanish sodir bo'lganda gametalardagi irsiy omillar qo'shilishi sxemasini osonlashtirish maqsadida angliyalik genetik **R. Pennet** maxsus penet katagini joriy etdi. Kataknning yuqori gorizontal qismiga changechi jinsining, chap yonboshdag'i vertikal qismiga urug'chi jinsining gametalari, katakchalar ichiga esa gametalarning qo'shilish imkoniyatlari yozilsa tubandagi holat yuzaga keladi:

\hat{z}	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Natijada, F_1 da AA, Aa, Aa, aa irsiy genotiplarga ega o'simliklar rivojlanadi. "A" allel holati no'xat domining sariq rangini, "a" allel holati yashil rangini ifoda etgani sababli, duragaylarning 3/4 sariq, 1/4 qismi esa yashil rangli bo'ladi. F_2 dagi AA — genotipi doni sariq rangli organizmlar o'zaro chatishtirilganda F_3 da faqat "toza" AA — genotipi doni sariq rangli organizmlar hosil bo'ladi. Aa — genotipi doni sariq rangli organizmlar o'zaro chatishtirilganda F_3 da 3:1 nisbatda ajralish (3sariq donli, 1yashil donli) sodir bo'ladi. F_2 dagi aa — genotipi doni yashil rangli organizmlar o'zaro chatishtirilganda F_3 da faqat "toza" aa — genotipi doni yashil rangli o'simliklar hosil bo'ladi. Shunday qilib F_2 dagi organizmlarni yarmi 2/4 "sof" (AA, aa) keyingi bo'g'inda ajralish bermaydi va ularni **gomozigota** deyiladi. Qolgan yarmi 2/4 duragay (Aa) F_3 da belgilar bo'yicha ajralish beradi ularni **geterozigota** deyiladi.

Bayon etilgan mulohazalarni xulosalab no'xatning doni sariq va yashil rangli changchi va urug'chi o'simliklarini chatishtirishdan olingan birinchi, ikkinchi avlod duragaylar tubandagicha yoziladi:



Fen. sariq yashil


$F_{\text{2 Gen.}}$ AA Aa Aa aa

Binobarin F_2 da fenotip bo'yicha nisbat 3:1 (3 qism sariq donli va 1 qism yashil donli), genotip bo'yicha 1:2:1 (1AA : 2Aa : 1aa) namoyon bo'ladi.

3.Takroriy va tahliliy chatishtirish

Birinchi avlod duragayini gomozigota holdagi dastlabki ota yoki ona organizmi bilan chatishtirishga **takroriy chatishtirish** yoki **bekkros** deyiladi. Takroriy chatishtirish natijasida olingan avlod F_b bilan belgilanadi. Demak, takroriy chatishtirish Aa x AA yoki Aa x aa sxemada o'tkaziladi.

Dominant belgili organizmlar genotipi gomozigota yoki geterozigota ekanligini aniqlashtirish uchun **tahliliy chatishtirish** olib boriladi. Bunda tahlil qilinayotgan organizm retsessiv belgili organizm -aa bilan chatishtiriladi. Agar bunday chatishtirishdan olingan F_b duragay bir xil belgili bo'lsa, u holda chatishtirishda qatnashgan dominant belgili organizm gomozigota, mabodo F_b da ham dominant belgili, ham retsessiv belgili organizmlar rivojlansa, u holda chatishtirishda qatnashgan dominant belgili organizm geterozigota hisoblanadi.




4.Belgilarning oraliq holda irlsylanishi

Mendel tajribalarida no'xat domining sariq rangi yashil rangi, gulining qizil rangi, oq rangi ustidan to'liq dominantlik qilishi kuzatildi. Biroq


o'simlik va hayvonlar o'zaro chatishtirilganda hamma vaqt shunday hodisa namoyon bo'lavermaydi. Ba'zan chatishtirishda qatnashgan ota-onal belgilari duragaylarda **oraliq holda irsiylanishi** mumkin. Belgilarning oraliq holda irsiylanishiga doir ba'zi misollar bilan tanishaylik. G'o'za o'simligini totalari malla va oq rangli xillarini chatishtirilsa F_1 duragaylarda tola novvot rangda bo'ladi. Agar birinchi avlod duragaylari o'zaro chatishtirilsa, ulardan hosil bo'lgan F_2 avlod duragaylar orasida 25% malla, 50% novvot, 25% oq tola rangli o'simliklar rivojlanadi (15-rasm).

Xuddi shunday holat namozshomguuning gultojibargi qizil va oq bo'lgan xillarini chatishtirganda ham kuzatiladi.



15-rasm. G'o'za o'simligida tola rangining irsiylanishi.


Oraliq holda belgilarning irsiylanishi ayrim hayvon tur individularini chatishtirganda ham ko'rish mumkin. Masalan, andaluz tovuqlarni qora patli xo'rozi bilan oq patli tovug'ini chatishtirishdan olingan F_1 dagi xo'roz ikkinchi avloddagagi 25% tovuq va xo'rozlar qora, 50% kulrang va 25% oq patli bo'ladi (16-rasm). Qora patli tovuq va xo'rozlar bir-biri bilan chatishtirilganda F_2 faqat qora patli, oq erkak va urg'ochi parrandalar chatishtirilganda oq patli tovuq va xo'rozlarni hosil qiladi. Binobarin, oq geterozigota sanaladi.



16 - rasm. Andaluz tovuqlarda pat rangining oraliq holda irsiylanishi.


5. Ko'p tomonlama allelizm

Xromosomalar to'plami diploid holatda bo'lganda organizmlar genotipida bir genning ikki alleli bo'ladi. Bu allellar dominant yoki retsessiv holatda bo'lishi mumkin. Lekin bundan har bir gen faqat ikki allel holatda bo'ladi degan xulosaga kelmaslik kerak. Ayrim vaqlarda mutatsiya oqibatida bir genning ko'p allel holatlari namoyon bo'lishi mumkin. Bu hodisaga **ko'p tomonlama allelizm** deyiladi. Chunonchi, quyonlarda mo'yna rangini hosil etuvchi C genning uch xil allel holati mavjud. Bular C, c^h, c^a allel holatlari. Odatda CC, Cc^h, Cc^a genotipli quyonlar qora rang, $c^h c^h, c^h c^a$ genotiplilar himolay rang, $c^a c^a$ genotiplilar oq yungli bo'ladi. Himolay quyonlarning mo'ynasi oq bo'lsa tananing bo'rtib chiqqan qismi: quloqlari, oyoqlari, tumshug'i qora rangda bo'ladi (17-rasm).



17 - rasm. Ko'p tomonlama allelizmida quyonlar yung rangining irtiyonishi. S - yungning qora rangi; c^b - quyonning himolay rangi; s^a - albinos quyon.

Tabiatda ko'p tomonlama allelizm keng tarqalgan. Chunonchi og rangli beda barglaridagi tasvirlar bir qancha allellarning geterozigota holatiga qarab har xil ko'rinishlarda bo'ladi.



18 - rasm. Har xil allellarning dominantlik tiplari.

Genlarning ko'p tomonlama allelizmi odamlarda ham kuzatiladi. Odamlarda to'rt xil qon guruhi borligi XX asning boshida avstriyalik olim K.Landshteyner tomonidan isbotlanganligi ma'lum. Bunda qon guruhibi belgilovchi gen uch xil allel holatga ega bo'ladi - I^A , I^B , i . Genotipda genning turli allel holatlarini just holda kombinatsiyalashuvi natijasida odamda to'rt xil qon guruhi: ii - birinchi qon guruhi, I^AI^A , I^Ai - ikkinchi qon guruhi, I^BI^B , I^Bi - uchinchi qon guruhi, I^AI^B - to'rtinchi qon guruhi belgilanadi. I^A va I^B allel holatlari i allel holati ustidan dominantlik qiladi. Genotipda I^AI^B bo'lganda ikkala dominant allel holatining ta'sirida fenotip shakllanib to'rtinchi qon guruhi namoyon bo'ladi. Bu hodisaga, ya'ni fenotipda bir genni ikkala allel holatini namoyon bo'lishi **kodominantlik** deyiladi. Belgilarni to'liq, oraliq va kodominantlik asosida irtiyonishini qiyosiy taqqosi *18-rasmda* keltirilgan.

6. F_2 dagi belgilarning ajralishini statistik usulda tekshirish - χ^2 .

Yuqorida to'liq irtiyonishga ega organizmlarning F_2 avlodini tahlil qilganda ular fenotip jihatdan 3:1, genotip jihatdan esa 1:2:1 nisbatda ajralganligini ko'rdik. Fenotip va genotip jihatdan bunday ajralish F_2 dagi organizm soni kam bo'lsa, u holda dominant va retsessiv belgilarga ega organizmlar nisbati retsessiv yoki dominant tomon o'zgarishi mumkin. Dominant yoki retsessiv tomon silishi qay darajada 3:1, 1:2:1 nisbatga to'g'ri kelishini statistik yo'll bilan tekshirishni taqozo etadi. Farazni tekshirish uchun tajribada olingan natija bilan nazariy jihatdan kutilgan natija o'zaro taqqoslanadi. Agar tajribada olingan ma'lumotlar nazariy jihatdan kutilgan natijaga mos bo'lsa, u holda yaratilgan faraz to'g'ri deb topiladi. Mabodo, tajribada olingan ma'lumotlar nazariy jihatdan kutilgan natijaga mos kelmasa, u holda yaratilgan faraz noto'g'ri deb hisoblanadi.

Tajribada olingan ma'lumotlar bilan nazariy jihatdan kutilgan natija orasidagi farq turli darajada namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bu farq juda kichik va tasodifiy bo'lsa, boshqa hollarda u ancha katta va muqarrar bo'ladi. Shu sababdan tajribada olingan va kutilgan ma'lumotlarni statistik baholash kerak, degan masala kelib chiqadi. Qayd qilingan masalanı yoritishda genetikada ko'proq χ^2 usulidan keng foydalilanildi. Bu usulni 1900-yili ingliz matematigi K.Pirson taklif etgan. Mazkur usuldan quydagicha foydalaniladi.

Birinchi navbatda jadval chiziladi. U ikki bo'limdan ya'ni ma'lumotlar va individlar miqdoridan iborat bo'ladi. Individlar, hosil bo'lgan fenotipik sinflar miqdoriga ko'ra: a) dominant belgili; b) retsessiv belgili; v) jami individlarga bo'linadi. Ma'lumotlar bo'limiga tajribada olingan ajralish (p), uning ostiga kutilgan nisbat va nazariy jihatdan kutilgan ajralish (q) yoziladi.

Masalan, drozofila meva pashhasining kulrang va qora tanali formalarini chatishtirishdan F_2 da 78 ta kulrang, 18 ta qora tanali, jami 96 ta drozofila olindi deb faraz qilaylik. U holda biz kutilgan nisbat grafasini to'ldirganda 78 raqamining ostiga 3; 18 raqamining ostiga 1 deb yozamiz. Modomiki, barcha drozofilalar F_2 da 96 ta bo'lsa, u holda nazariy jihatdan kutilgan ajralish 72 ta 24 bo'lishi kerak. Endi jadvalning yana bir qator pastiga tajribada olingan natija va nazariy jihatdan kutilgan natija orasidagi farq: $d=p-q$ yoziladi. Misolimizda $u = 78-72=+6$; $18-24=-6$ ga teng. d - qiymatining ishoralarini tenglashtirish uchun kvadratga ko'taramiz. d^2 har ikki holda ham 36 teng bo'ladi. χ^2 ni aniqlash uchun har bir fenotip sinf bo'yicha chiqqan d^2 ni nazariy jihatdan kutilgan fenotipik ma'lumotga (q) taqsimlaymiz. Keltirilgan misolda $36:72=0,50$ dominant belgili, $36:24=1,50$ retsessiv belgili fenotiplar bo'yicha ma'lumot olindi. $\chi^2 = \sum (d^2/q)$ ekanligini e'tiborga olgan holda, dominant va retsessiv belgilari bo'yicha olingan ma'lumotlarni jamlab chiqsak, u holda $u \chi^2 = 2,00$ bo'lishini ko'ramiz.

2-jadval

Ma'lumotlar	Organizmlar soni		
	Kulrang	Qora	Jami
Olingen (p)	78	18	96
Kutilgan nisbat	3	1	4
Nazariy jihatdan kutilgan - q	72	24	96
Farq - $d=p-q$	+6	-6	-
d^2 - farqning kvadrati	36	36	-
d^2/q nisbat	$36:72=0,5$	$36:24=1,5$	$\chi^2=2,00$

χ^2 metodining mohiyati shundan iboratki, uning yordamida kuzatilgan va kutilgan natijalar orasidagi farq tasodifiy yoki muqarrar ekanligini aniqlash mumkin bo'ladi. Bu **R.Fisher** jadvali yordamida amalga oshiriladi. Jadvalning chap tomonida vertikal ustunda ozodlik darajalari, yuqorida gorizontal bo'yicha turli ehtimolliklar ko'rsatilgan.

Har xil ozodlik darajasida χ^2 ning qiymatini aniqlash Fisher jadvali

Ozodlik darajasi $n=n-1$	Ehtimollik						
	0,99	0,95	0,80	0,50	0,10	0,05	0,01
1	0,000157	0,0393	0,642	0,455	1,642	3,841	6,635
2	0,101	0,103	0,446	1,386	3,219	5,991	9,210
3	0,115	0,352	1,005	2,366	4,642	7,815	11,341
4	0,297	0,711	1,649	3,357	5,989	9,488	13,277
5	0,554	1,145	2,343	4,351	7,289	11,070	15,086
6	0,872	1,635	3,070	5,348	8,558	12,592	16,812
7	1,239	2,167	3,822	6,346	9,803	14,067	18,475
8	1,646	2,733	4,594	7,344	11,030	15,507	20,090
9	2,088	3,325	5,380	8,348	12,242	16,919	21,666
10	2,558	3,940	6,179	9,342	13,442	18,307	23,209

Ozodlik darajasining qiymati $n=n-1=2-1=1$ ga teng bo'ladi, n-fenotip sinflar soni, monoduragay chatishtirishda F_2 da 2 ta fenotipik sinf hosil bo'lganligi sababli ozodlik darajasi $n=1$ ga teng. Ehtimolliklarning qiymatini aniqlash qanday maqsadda tajribalar olib borilishiga bog'liq. Meditsinada ko'proq 0,01% ehtimollik ishlataladi, bizning misolimizda 0,05% ehtimollikdan foydalansila kifoya. 0,05 ehtimollik 100 ta voqelikdan 95 tasida biz ilgari surgan faraz to'g'ri chiqadi degan ma'noni bildiradi. Shunday qilib, ozodlik darajasi 1 ga, ehtimollik 0,05 ga teng bo'lgan qiymat Fisher jadvalida 3,841 ga teng. Biz tomonidan hisoblab chiqilgan χ^2 miqdori 2,00 jadvalda berilgan qiymatdan kichik bo'lsa, nol farazga muvofiq tajribada olingan natija bilan nazariy jihatdan kutilgan natija orasida farq muqarrar emasligini anglatadi, ya'ni 3:1 nisbatga to'g'ri keladi. χ^2 ning jadvalda belgilangan qiymatdan kattaligi, oldinga surilgan faraz o'rinsizligini bildiradi, ya'ni nol faraz noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Endi nol farazni tasdiqlovchi va uning o'rinsizligiga doir misol bilan tanishamiz.

Drozofilaning kulrang tanali va qora tanali formalarini chatishtirib, ulardan olingen F_1 urg'ochi drozofilani qora tanali erkak pashsha bilan chatishtirish oqibatida ikkinchi tajribada F_2 300 ta (ulardan 160 tasi kulrang tanali, 140 tasi qora tanali) va birinchi tajribada 60 ta (ulardan

40 tasi kulrang tanali, 20 tasi qora tanali) individga ega oilalar olindi deb faraz qilaylik. Agar ularning qiymatini χ^2 metodi bilan aniqlasak, tubandagicha natija olinadi:

Ma'lumotlar	Organizmlar soni			
	60 individ		300 individ	
	kulrang	qora	kulrang	qora
Olingen (p)	40	20	160	140
Kutilgan nisbat	1	1	1	1
Nazariy jihatdan kutilgan - q	30	30	150	150
Farq - $d^2=p-q$	-10	+10	+10	-10
d^2 -farqning kvadri	100	100	100	100
d^2/q - nisbat	$100:30=3,333$	$100:30=3,333$	$100:160=0,67$	$100:160=0,67$
	$\chi^2=6,66$		$\chi^2=1,34$	

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, drozofilaning turli oilasida olingen χ^2 ning miqdori bir-biridan keskin farq qildi. Birinchi holatda kuzatilgan va nazariy jihatdan kutilgan natijalar orasida farq katta bo'lganligi sababli χ^2 miqdori katta va Fisher jadvalidagi 3,841 dan yuqori. Demak, nol faraz noto'g'riligini anglatadi. Ikkinci holatda olingen χ^2 miqdori jadvaldan olingen qiymatdan kichik ($1,34 < 3,84$), ya'ni olingen natija 1:1 nisbatga mos keladi deyish mumkin.

Savol va topshiriqlar

- Mendel ishlaringning muvaffaqiyatini ta'minlagan omillarni sanab bering.
- Duragaylash metodida qo'llaniladigan ramzlarni izohlang.
- Fenotip, genotip, allel, geterozigota va gomozigota atamalariga ta'rif bering.
- Gametalar sofligi farazini tushuntirib bering.
- Bekkros chatishtrish qanday amalga oshiriladi?
- Tahiliy chatishtrish nima uchun qo'llaniladi?
- Oraliq holda irsiylanish nima va unga misollar keltiring.

- Ko'p tomonlama allelizm hodisasini tushuntiring va unga misollar keltiring.
- Allel va allel bo'lмаган genlar faoliyatida qanday farq bor?
- Kodominantlik nima?
- Qon guruhlari misolida kodominantlikni tushuntiring.
- χ^2 usulining mohiyatini tushuntirib bering.
- K.Pirson usulidan qanday foydalaniлади?
- Qanday holatda yaratilgan faraz noto'g'ri deb topiladi?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

- Mendelning birinchi qonuni qanday ifodalanadi?
 - Belgilarning ajralib ketish qonuni
 - Birinchi avlod duragaylarning bir xillik qonuni
 - Belgilarning birikkan holda o'tish qonuni
 - Belgilarning mustaqil holda irsiylanish qonuni
- Mendelning ikkinchi qonuni qanday ifodalanadi?
 - Belgilarning ajralib ketish qonuni
 - Dominantlik qonuni
 - Gametalarning sofligi qonuni
 - Belgilarning mustaqil holda irsiylanish qonuni
- Fenotip nima?
 - Organizmning xromosomalar yig'indisi
 - Organizmlarning tashqi va ichki belgi-xossalari yig'indisi
 - Organizmning genlar yig'indisi
 - Duragay organizmlar yig'indisi
- Genotip nima?
 - Organizm hujayralarini yig'indisi
 - Organizm to'qimalarining yig'indisi
 - Organizmning genlar yig'indisi
 - Organizmning belgilar yig'indisi
- Gomozigota nima?
 - Genotipi har xil alleldan iborat zigota
 - Genotipi bir xil alleldan iborat zigota
 - Genotipi dominant alleldan iborat zigota
 - Genotipi retsessiv alleldan iborat zigota
- Geterozigota nima?
 - Genotipi har xil alleldan iborat zigota

- B. Genotipi bir xil alleldan iborat zigota
 S. Genotipi dominant alleldan iborat zigota
 D. Genotipi retsessiv alleldan iborat zigota
7. *Tahliliy chatishirishning ahamiyati nimadan iborat?*
 A. Irsiyat qonunlari aniqlanadi
 B. O'rganilayotgan belgining dominant va retsessivligi aniqlanadi
 S. Organizmning gomozigota yoki geterozigotaligi aniqlanadi
 D. Belgilarning ajralib ketishi qoidasi aniqlanadi
8. *Gametalarning sofligi farazi nima?*
 A. Bir belgi ikkinchi belgi ustidan dominantlik qiladi
 B. Organizm genotipi bir xil alleldan tashkil topadi
 S. Organizm gomozigotali bo'ladi
 D. Gametalarda ikkita alleldan bittasi bo'ladi
9. *Monoduragylarning tahliliy chatishirishda belgilarning xilma-xilligi qanday bo'ladi?*
 A. 3:1
 B. 1:1
 S. 1:2:1
 D. 1:1:1:1
10. *Chala dominantlik F_2 da belgilarning ajralishi qanday nisbatda bo'ladi?*
 A. 3:1
 B. 1:1
 S. 1:2:1
 D. 1:1:1:1
11. *Muqobil belgilarga ta'sir etuvchi genlar qanday ataladi?*
 A. Allel
 B. Noallel
 S. Gomozigota
 D. Geterozigota


5§. Diduragay va poliduragay chatishirish
Tayanch tushunchalar: Diduragay chatishirish, kombinativ o'zgaruvchanlik, Mendelning 3-irlisyat qonuni, fenotipik va genotipik sinflar - 9:3:3:1, 1:2:2:4:1:2:1:2:1, diduragay chatishirishning sitologik asoslari, poliduragay chatishirish, poliduragay chatishirishda turli xil gameta, fenotip, genotip sinflar sonini aniqlash, Mendel qonunlarini amalga oshishi uchun zarur shart-sharoitlar.

1. Diduragay chatishirishda belgilarning to'liq va oraliq holda irsiylanishi

A) Belgilarning to'liq irsiylanishi

Mendel o'z tajribalarida no'xatning Faqat bir turg'un belgisi bilan farqlanadigan xillarini emas, balki ikki, uch bilgisi bilan tafovut qiladigan xillarini ham chatishirgan va ulardan hosil bo'lgan duragay avlodlarida belgilarning irsiyanishini o'rgangan. Odatda ikki muqobil belgisi bilan farqlangan ota-onada organizmlarning chatishishi olingan duragaylarni diduragay deb ataladi.

Mendel o'z tajribalarini birida doni sariq, tekis va yashil, burishgan belgili no'xat navlarini bir-biri bilan chatishirdi. Chatishirish natijasida olingan F_1 duragaylarning hammasida doni sariq rangli va tekisekanligi ma'lum bo'ldi. Demak donning sariq rangi yashil rang, tekis formasi burishgan formasi ustidan dominant ekanligi malum bo'ldi. F_1 avlod duragaylar o'z-o'zi bilan chatishirilganda ulardan hosil bo'lgan ikkinchi avlodda ota-onaga o'xshash, ya'ni doni sa'riq tekis, doni yashil burishgan no'xatlar bilan bir qatorda, doni sariq burishgan, doni yashil sirti tekis bo'lgan o'simliklar hosil bo'ldi. To'rtta fenotipik sinflarning miqdoriy nisbati 9 sariq tekis : 3 sariq burishgan : 3 yashil tekis : 1 yashil burishgan ekanligi aniqlandi. Agar biz diduragaylardagi ikki xil belgining har birini alohida-alohida o'rgansak, u holda doni 12 sariq : 4 yashil, 12 tekis : 4 burishgan ekanligini ko'ramiz. Demak ayrim telgilar bo'yicha xuddi monoduragylardagidek F_2 da dominant belgining retsessiv belgiga bo'lgan nisbati 3:1 ga teng. Bu o'z-o'zidan diduragaylardagi bir belgi ikkinchisiga tobe bo'lmagan, balki alohida-alohida irsiyanishidan dalolat beradi (19-rasm). Diduragaylardagi olingan natijalarini xulosalab, Mendel uchinchi - belgilarning mustaqil holda irsiyanish qonuni ixtiro etdi.



19 - rasm. No'xat o'simligining diduragylarda don rangi va shaklining irsiyanishi.

$\hat{\Sigma}$	AB	Ab	aB	ab	
AB	q.m. $AABB$	q.n. $AABb$	or. m. $AaBB$	or. n. $AaBb$	
Ab	q.n. $AAbb$	q.oq. $AAbb$	or. n. $AaBb$	or. oq $Aabb$	
aB	or. m. $AaBB$	or. n. $AaBb$	ya.m. $aaBB$	ya.n. $aaBb$	
ab	or. n. $AaBb$	or. oq $Aabb$	ya.n. $aaBb$	ya.oq $aabb$	


Pennet kataklaridagi genotipik va fenotipik sinflar majmui
vbandagicha bo'ladi:

1. $AABB$ – 1 q.m. - qizil, malla
2. $AABb$ – 2 q.n. - qizil, novvotrang
3. $AaBB$ – 2 or.m. - oraliq, malla
4. $AaBb$ – 4 or.n. - oraliq, novvotrang
5. $AAbb$ – 1 q.oq. - qizil, oq
6. $Aabb$ – 2 or.oq. - oraliq, oq
7. $aaBB$ – 1 ya.m. - yashil, malla
8. $aaBb$ – 2 ya.n. - yashil, novvotrang
9. $aabb$ – 1 ya.oq. - yashil, oq

Diduragaylar ikkinchi avlodining ayrim belgilari ya'ni poya va barg ranglari yoki tola rangi bo'yicha alohida-alohida tahlil qilsak, u holda poyal, bargi qizil rangdagi o'simliklar $4/16$, poya, bargi oraliq holda bo'lgani $8/16$, poyasi, barglari yashil formalar $4/16$ ni tashkil etadi. Tolaning rangi ham shu singari xilma-xillik beradi. Diduragaylarning $4/16$ malla, $8/16$ novvotrang, $4/16$ oq tolalidir. Binobarin har ikki belgi avlodidagi belgilarning xilma-xilligi monoduragaylarning ikkinchi kvadrati ekanligini shohidi bo'lamiz.

2. Diduragay chatishirishning sitologik asoslari

Mendel hujayrada xromosomalar borligini, xromosomalar sonini ikki marolaba kamayishiga sababchi bo'lgan meyoz bo'linish mavjudligini bilmagan.



20 - rasm.
Diduragay
chatishirishdagi
belgilarning
irsylanishini
sitologik asoslari.

Mendel tadqiqotlaridan ancha keyin har bir just belgini hosil qiluvchi genlar gomologik xromosomalarning o'xshash nuqtalarida joylashganligi, meyoz jarayonida gomologik xromosomalar gametlarga taqsimlanishi

ma'lum bo'ldi. Har bir jinsiy hujayraga gomologik xromosomalar juftidan faqat bittasi tarqaladi. Modomiki shunday ekan u holda no'xatning don rangini belgilovchi A (sariq) va a (yashil) genlar bir just gomologik xromosomalarda, donning tekis (B) va burishgan (b) bo'lishini ta'minlovchi genlar ikkinchi just xromosomalarda joylashgan bo'ladi. Tushunishni osonlashtirish maqsadida no'xat donining rangini belgilovchi AA va aa allellar joylashgan gomologik xromosomalarni tayoqchasimon shaklda, no'xat doni tekisligi (BB) va burishganligi (bb) allellari joylashgan gomologik xromosomalarni yumaloq shaklda ifodalaymiz. Urug'chi organizmdan o'tgan xromosomalar bo'yalgan holda, changchi organizmdan o'tgan xromosomalar bo'yalmagan holda ifodalanadi (20-rasm).


Meyoz bo'linish natijasida har bir gomologik xromosomalar juftligidan gametalarga bittadan allel tarqaladi. Urug'lanish jarayonida urug'chi changchi gametalar qo'shilgach zigitada $AaBb$ genlar ikkita tayoqchasimon, ikkita yumaloq xromosomalarda joylashgan bo'ladi. F_1 duragaydan meyoz bo'linishda to'rt xil gameta rivojlanadi. Chunki bu gametalarda changchi va urug'chi gomologik xromosomalari turlicha kombinatsiyalar hosil qiladi. Natijada F_2 xromosomalarda joylashgan genlarning 16 xil kombinatsiyasi namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, XX asrning oxirida hujayraning mitoz, meyozi o'simlik va hayvonlarda urug'lanish tafsilotlari aniqlangach nemis biolog A.Veysman ana shu ma'lumotlarga asoslanib irlisyatni avloddan-avlodga berilishi xromosomalarga bog'liq degan mulohazani ilgari surdi. Bu mulohazaning to'g'riliгини 1902 yili Germaniyada T.Boveri, AQShda U.Setton o'z tajribalari orqali tasdiqladilar, ya'ni ular irlisy omillarni gametalarga tarqalishi haqidagi Mendel mulohazalari bilan meyozi bo'linishda gomologik xromosomalarining gametalarga tarqalishi o'ttasida aynan o'xshashlik borligini ta'kidladilar va gametalar soqlik farazini to'g'riliгini tsitologiya fani da'llillari asosida isbotladilar.

3. Poliduragay chatishirish

Uch, to'rt va undan ko'p turг'un belgilari bilan tafovut qiladigan formalarni chatishishidan hosil bo'lgan organizmlar **poliduragay** deb nomlanadi. Masalan, no'xatning doni sariq, tekis, gultoji bargi qizil bo'lgan navi doni yashil, burishgan, gultojibargi oq rangda bo'lgan navi bilan chatishirilsa F_1 . Don rangini ifoda qiluvchi allellarni A-a, shaklini ifodalaydigan allellarni B-b, gultojibargining rangini C-c deb belgilansa, u holda chatishirishdan olingan duragay o'simligining genotipi $AaBbCc$, retsessiv belgili o'simlikning genotipi $aabbcc$ holatda bo'ladi. Agar G_1 duragaylarni no'xatning doni yashil, usi burishgan va gultojibargi oq bo'lgan o'simlik bilan qayta chatishirilsa va olingan duragaylarni fenotip jihatdan tahlil qilinsa, u holda F_1 duragay 8 xil gameta hosil qiladi. Bular quyidagilardan iborat: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc. Ularning retsessiv formalari o'simlik bilan chatishirilsa $AaBbCc$, $AaBbcc$, $AabbCc$, $Aabbcc$, $aaBbCc$, $aaBbcc$, $aabbCc$ genotipli o'simliklar olinadi.

Ularning fenotiplari quyidagicha: sariq, tekis, qizil; sariq, tekis, oq; sariq, burishgan, qizil; sariq, burishgan, oq; yashil, tekis, qizil; yashil, tekis, oq; yashil, burishgan, qizil; yashil, burishgan, oq bo'ladi va ular 1:1:1:1:1:1:1:1 nisbatda xilma-xillik beradi. Olingan natijani tubandagichka izohlaymiz:



Agar F_1 duragaylar o'zaro chatishirilsa urug'chi o'simlikning 8 xil gametasi, changchi o'simlikning 8 gametasi bilan qo'shilishi oqibatida

64 xil zigota hosil bo'ladi. Ularning fenotipi: 27 ta doni sariq, tekis, guli qizil, 9 ta doni sariq, tekis, guli oq, 9 ta doni sariq, burishgan, guli oq, 9 ta doni yashil, tekis, guli qizil, 3 ta doni sariq, burishgan, guli oq, 3 ta doni yashil, tekis, guli oq, 3 ta doni yashil, burishgan, guli qizil, 1 ta doni yashil, burishgan, guli oq bo'ladi.

Agar monoduragay chatishirishdagi bir just belgining avloddan-avlodga o'tishini tadqiq qilish fenotip diduragaylarda emas, balki triduragaylarda ham belgilarning avloddan-avlodga berilishini tushunishga ko'mak beradi.

Triduragaylarda fenotip va genotip bo'yicha miqdoriy nisbatlarning taqsimlanishi just allellardan har birining nisbiy son ko'paytmasidan ya'ni $(3A:1a)(3B:1b)(3C:1c)$ dan kelib chiqadi. Natijada $27(A-B-C):9(A-B-C):9(A-b-C):9(A-b-C):3(a-B-c):3(a-b-C):1(a-b-c)$ hosil bo'ladi.

Binobarin triduragaylarda genlar soni aniq bo'lgani holda F_1 da rivojlanadigan gameta xillarini, urug'lanish natijasida hosil bo'ladi genotipi hamda genotipi sinflar sonini hisoblash mumkin.

Σ	ABC	ABc	AbC	Abc	aBC	aBc	abC	abc
ABC	c.t.q. AABBCC	c.t.q. AABBCC	c.t.q. AABbCC	c.t.q. AAbCcc	c.t.q. AaBBCc	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCc	c.t.q. AaBbCc
ABc	c.t.q. AABBCc	c.t.oq. AABBcc	c.t.q. AABbCc	c.t.oq. AABbcc	c.t.q. AaBBCc	c.t.oq. AaBbCc	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc
AbC	c.t.q. AABbCC	c.t.q. AABbCC	c.b.q. AAbbCC	c.b.q. AAbbCc	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCc	c.b.q. AabbCC	c.b.q. AabbCc
Abc	c.t.q. AABbCc	c.t.oq. AABbcc	c.b.q. AAbbCc	c.b.oq. AAbbcc	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc	c.b.q. AabbCc	c.b.oq. Aabbcc
aBC	c.t.q. AaBBCC	c.t.q. AaBBCC	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCc	ya.t.q. aaBBCC	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.q. aaBbCC	ya.t.q. aaBbcc
aBc	c.t.q. AaBBCc	c.t.oq. AaBBCc	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.oq. aaBbcc	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.oq. aaBbcc
abC	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCC	c.b.q. AabbCC	c.b.q. AabbCc	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.oq. aaBbcc	ya.b.q. aabbCC	ya.b.q. aabbCc
abc	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc	c.b.q. AabbCC	c.b.oq. AabbCc	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.oq. aaBbcc	ya.b.q. aabbCc	ya.b.oq. aabbcc

Shuni qayd etish lozimki allel juftlar soni qancha ko'p bo'lsa ajralish sinflari, ularning kombinatsiya lanish imkoniyatlari, oqibatda fenotipi va genotipi sinflar ham shuncha ko'p bo'ladi. Buni yuqorida keltirilgan jadvalda aniq ko'rish mumkin.

Allel jumalar soni	Gameta xillari soni	Gametalarning kombinatsiyalari soni	Genotipik sinflar soni	Fenotipik sinflar soni	Ajalishning fenotipik formulasi
1	$2^1=2$	$4^1=4$	$3^1=3$	$2^1=2$	$(3:1)^1=3:1$
2	$2^2=4$	$4^2=16$	$3^2=9$	$2^2=4$	$(3:1)^2=9:3:3:1$
3	$2^3=8$	$4^3=64$	$3^3=27$	$2^3=8$	$(3:1)^3=27:9:9:3:3:3:1$
4	$2^4=16$	$4^4=256$	$3^4=81$	$2^4=16$	$(3:1)^4=81:27:27:27:27:9:9:9:9:3:3:3:1$
n	2^n	4^n	3^n	2	$(3:1)^n$

4. Diduragaylardan olingan natijani statistik usulda o'rganish

Diduragay va poliduragay chatishirishda olingan natijani statistik usulda tekshirish xuddi monoduragaylardagi kabi olib boriladi. Lekin, tajribada olingan fenotipik sinflar sonidan bitta kam bo'ladi.

Chunonchi, F_1 da 4 ta fenotipik sind hosisi bo'ldi deylik, u holda ozodlik darajasi 3 ga teng bo'ladi. Endi duragaylar natijasini statistik usulda analiz qilishga o'taylik. F_1 tajribadagi 3120 ta no'xat o'simligi orasida 1745 ta sariq tekis, 605 ta sariq burishgan, 580 ta yashil tekis, 190 ta yashil burishgan bo'ldi, deb taxmin qilaylik, u holda χ^2 metodini qo'llab quyidagicha natijani olish mumkin.

Ma'lumotlar	O'simliklar soni				χ^2 -jadval
	sariq tekis	sariq burishgan	yashil tekis	yashil burishgan	
Olingan R	1745	605	580	190	3120
Kutilgan nisbat	9	3	3	1	16
Nazariy jihatdan kutilgan - q	1755	585	585	195	3120
Farq -d	-10	+20	-5	-5	-
d^2 - farqning kvadrati	100	400	25	25	-
d^2/q - nisbat	0,057	0,684	0,043	0,128	$\chi^2=0,912$

5-jadvalda ko'tinib turibdiki, χ^2 bizning ma'lumotimiz bo'yicha 0,912 ga teng. Endi uni Fisher jadvaliga taqqoslab chiqamiz.

Ma'lumki diduragaylarda F_1 da 4 ta fenotipik sind hosil bo'lgani uchun, biz uchinchini ozodlik darajasidagi raqamlar bilan taqqoslasak 0,05 ehtimollikda χ^2 miqdori $0,912 < 7,81$ raqamidan kichik binobatini 9:3:3:1 nisbati haqida nol faraz tajribada olingan ma'lumotlarga to'g'ri keladi. Boshqacha aytganda, tajribada olingan natija bilan kutilgan natija bir-biriga mos. Demak, diduragaylarning fenotipik sinflar orasidagi 9:3:3:1 nisbat tajribada isbotlandi.

5. Mendel qonunlarini amalga oshishi uchun zarur sharo'llar

Yuqorida Mendel tomonidan kashf qilingan irsiyat qonunlarini faqat no'xatda emas, balki boshqa o'simlik va hayvonlarning qonunlarini faqat odamlarni nikohlaganda ham o'z tasdig'ini topishi mumkin. Lekin bu irsiyat qonunlari:

- Chatishirish faqat xromosomalari diploid to'planishi organizmlarda olib borilsa;
- Genlar nogomologik xromosomalarda joylashgan, ya'ni birkmagan holatda bo'lganda;
- Chatishirishda qatnashayotgan ota-onalarida hujayraning meyoz bo'linishi normal va turli xil tipdagi gametalar teng miqdorda hosil qilsa;
- Urug'chi va changchi jinsiy hujayralar bir vaqtida yetilib, ularning bir-biri bilan qo'shilishi teng miqdorda bo'lgan taqdida;
- Urug'lanish davrida yo changchi, yo urug'chi gametalarini orasida tanlanish ro'y bermaganida;
- Urug'chi changchi gametalarining yashovchanligi bir xil bo'lganda;
- Har xil genotipli zigotalarning yashovchanligi da tanlanish ro'y bermaganida;
- Voyaga yetgan organizmlar yashovchanligi bir xilda bo'lganda;
- Tajriba o'tkazilayotgan joy sharoiti o'rganilayotgan belgilari rivojiga ta'sir ko'sratmaganda;
- Tajribada olingan organizmlar miqdori ko'p bo'lganda o'z kuchini saqlashini ta'kidlash lozim.

Savol va topshiriqlar

- Diduragay chatishirishning mohiyatini tushunib bering.
- Diduragay chatishirishda F_1 da fenotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish ketadi?
- Diduragay chatishirishda F_1 da genotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish kuzatiladi?

4. Mendelni uchinchi irlsiyat qonunini ta'riflang.
5. Kombinativ o'zgaruvchanlik nima?
6. Fenotip radikal nima? Qachon qo'llaniladi?
7. Diduragay chatishirishning sitologik asoslarini sharhlab bering.
8. Poliduragay chatishirish deb nimaga aytildi?
9. Triduragay chatishirishda F_1 da genotip va fenotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish ro'y beradi?
10. Qanday qilib poliduragay chatishirishda hosil bo'ladigan turli gametalar, genotiplar va fenotiplar soni hisoblanadi?
11. Diduragayning to'liq irlsiylanishida necha xil fenotipik va genotipik sinif kuzatiladi?
12. Statistik usul nima?
13. Mendel qonunlarini amalga oshirish uchun qanday sharoitlar zarur?

Testlardan to'g'ri javobni toping

1. Ikki alternativ belgisi bilan farqlangan organizm'larni chatishirishdan olingan duragay qanday ataladi?

- A. Monoduragay
- B. Diduragay
- C. Triduragay
- D. Poliduragay

2. Digeterozigota organizmning genotipi qanday yoziladi?

- A. AAbb
- B. AABb
- C. AaBb
- D. aaBB

3. Diduragay chatishirishda Mendelning qaysi irlsiyat qonuni namoyon bo'ldi?

- A. Belgilarning ajralib ketish qonuni
- B. Dominantlik qilish qonuni
- C. Gametalarning sofligi qonuni
- D. Belgilarning mustaqil holda irlsiyanishi qonuni

4. Digomozigota organizm genotipi qanday yoziladi?

- A. AAbb
- B. AABb
- C. AaBb
- D. aaBb

5. Diduragay chatishirishda genotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish kuzatiladi?

- A. 3:1, 1:2:1

- B. 9:3:3:1, 6:3:3:1:2:1
- C. 1:2:2:4:1:2:1:2:1
- D. 9:3:3:1, 9:6:1

6. Digeterozigotali duragay qanday gametalarni hosil qiladi?

- A. A, a, B, b
- B. AB, ab
- C. AA, BB, aa, bb
- D. AB, Ab, aB, ab

7. Trigeterozigota duragaylar fenotip bo'yicha qanday nisbatda xilmillik beradi?

- A. 1:15:6:20:6:15:1
- B. 1:6:15:20:15:6:1
- C. 20:15:15:6:6:1:1
- D. 1:1:15:15:20:6:6

8. To'rt xil gameta hosil qiladigan genotipni ko'rsating.

- A. AabbCc
- B. AaBbCc
- C. aaBbcc
- D. aabbcc

9. Diduragay chatishirishda fenotip bo'yicha nisbat qanday bo'ldi?

- A. 1:4:6:4:1
- B. 1:2:2:4:1:2:1:2:1
- C. 9:3:3:1
- D. 1:2:1

10. Sakkiz xil gameta olish mumkin bo'lgan genotipni ko'rsating.

- A. Aabccedd
- B. AaBccedd
- C. AabbecDd
- D. AaBbccDd

11. Doni sariq va tekis, doni yashil va burishgan no'xatlarni chatishirish qanday nomlanadi?

- A. Diduragay
- B. Triduragay
- C. Poliduragay
- D. Monoduragay

III-BOB. JINS GENETIKASI VA JINSGA BIRIKKAN HOLDA BELGILARNING IRSIYLANISHI

6§. Jins genetikasi

Tayanch tushunchalar: Jins muammosi, jinsga ta'rif, birlamchi va jinsiy xromosoma, gomogametali va geterogametali organizmlar, autosomalar, xromosoma orqali jinsni aniqlash, triploid, interseks, o'ta jinsni rivojlanishi, korteks, medula, jinsni tabaqalanishi, biseksuallik, gormonlar orqali jinsni boshqarish.

1.Jins tushunchasi

Bakteriyalar, tuban o'simliklar, hayvonlarda jins bo'lmaydi. Shunga ko'ra ular bo'linish orqali ko'payadilar. Organik olam evojutsiyasining ma'lum bosqichida yer yuzida ayrim jinsli organizmlar paydo bo'lgan. Ayrim jinsli organizmlarning paydo bo'lishi katta biologik ahamiyatga ega. Charlz Darwin ta'kidlashicha o'z-o'zidan chatishish biologik jihatdan zyon, che'tdan chatishish esa foydalidir. Odatda organizmlar chetdan chatishganda avlodlarda ota-onaligda nisbatan irlar axborotining xilma-xilligini orttirish ro'y beradi. Bu esa ularning o'zgargan muhit sharoitiga moslanishida katta imkoniyatlar yaratadi.


Jins muammosi bilan odamzot qadimdan mashg'ul bo'lib kelishiga qaramay, faqat genetika fan sifatida shakllangandan so'ng bu muammo o'z yechimini topdi.

Jins-organizmning gametalar hosil qilish orgali nasl qoldirish, irlar axborotni kelgusi avlodga uzatishni ta'minlaydigan belgi va xossalalar majmuasidir. Yuksak hayvonlarda har xil jinsli organizmlarni farqlantiruvchi belgi-xossalalar **birlamchi** va **ikkilamchi** jinsiy belgilarga ajratiladi. **Birlamchi** jinsiy belgilarga organizmda gametalar hosil bo'lishi, urug'lanish jarayoni va organizm rivojlanishini ta'minlovchi morfosiologik xususiyatlar, tashqi va ichki jinsiy organlar kiradi.

Ikkilamchi jinsiy belgilari erkak va urg'ochi organizmlar gametalarini hosil qilishda, ularning o'zaro qo'shilib urug'lanishni ta'minlashda hamda jinsiy ko'payishda bilvosita rol o'ynaydi. Qushlarning, sut emizuvchini hayvonlarning erkagi gavdasining yirik, chiroyli bo'lishi, odamlarning erkaklarida soqol, mo'yloving bo'lishi, ovozning yo'g'on bo'lishi bunga misoldir. Ular birlamchi jinsiy bezlar tomonidan ajralgan gormonlar ta'sirida rivojlanadilar. Erkak va urg'ochi organizmlar tashqi ko'rinishidagi tafovut **jinsiy dimorfizm** deyiladi. Jinsiy dimorfizm ko'pgina hayvonlarda, odamlarda yaqqol ko'zga tashlanadi.

2.Jinsni aniqlash

Jinsni aniqlashning uch: **progam**, **epigam**, **singam** xili mavjud. Jinsni aniqlashni **progam** xilida jins urug'languncha ma'lum bo'ladi. Ba'zi bir kolovratkalar, chuvalchanglarda urg'ochi organizm odatda yirik, sitoplazmaga boy, hamda mayda sitoplazmasi kam bo'lgan tuxum hosil qiladilar. Sitoplazmaga boy tuxum hujayra urug'langach urg'ochi, mayda, sitoplazmasi kam tuxum hujayra esa urug'langach erkak organizmni hosil qiladi.



21 - rasm. Lichinkaning har xil sharoitda rivojlanishiga qarab Bonella viridisda jinsni tarkib topishi.

Jinsni aniqlashning **singam** xilida jins urug'lanish davrida ma'lum bo'ladi. Bunda jinsni asosan jinsiy xromosomalar belgilaydi.

3.Jinsni belgilashda xromosomalar va genlarning roli

Mendel o'z tajribalarida jins organizmdagi boshqa belgilari singari irlarning xromosomalarini degan fikrni ilgari surgan. Ma'lumki, monoduragaylarda tahliliy chatishirish olib borilsa kelgusi avlodda 1:1 nisbat ya'ni, $Aa \times aa \rightarrow Aa:aa$ kuzatiladi. Ayrim jinsli hayvon va o'simlik turlarida erkak va urg'ochi individlarning miqdoriy nisbati deyarli o'zaro teng. Buni quyida keltirilgan ma'lumotlardan bilish mumkin.

Turli hayvon va o'simlik turlarida erkak jinsiga mansub organizmlar miqdori:

6-jadval

Hayvonlarda jinsiy xromosomalarining o'zaro nisbati

Organizmlar	Geterogametalni jins	Gametalar		Zigotalar	
		Urug'	Tuxum hujayra	Urg'ochi hujayra	Erkak
Odam, drozofila va boshqalar	Erkak	X va Y	X va X	XX	X Y
Qandala (protenor)	Erkak	X va O	X va X	XX	XO
Chigirtka	Erkak	X va O	X va X	XX	XO
Qushlar, kapalaklar	Urg'ochi	X va X	X va Y	X Y	XX
Tut ipak qurti	Urg'ochi	X va X	X va Y	X Y	XX

Shunga asoslanib chatishirishda qatnashgan ota-onaning biri gomozigota, ikkinchisi geterozigota bo'lishi kerak degan xulosaga kelish mumkin. Mazkur xulosani to'g'ri ekanligi birinchi marotaba 1906-yili **L.Donkaster** kriyovnik kapalagida, 1907-yili esa **K.Korrens** qovoqdoshlar oilasiga kiruvchi ikki uyli, bir uyli o'simliklar tarvuzpalak hamda Abu Jahil tarvuzlarini o'zaro chatishirish natijasida olingan duragay o'simliklarda kuzatdi.

Keyinchalik har xil jinsli organizmlarning biri gomozigota, ikkinchisi geterozigota ekanligi sitologik tadqiqotlarda ham o'z tasdig'ini topdi.

Aksariyat hayvon turlari va ayrim jinsli o'simliklarda (nasha, ismaloq, suv otqulog'i, elodeya) jinsni ifodalovchi jinsiy xromosomalar bor. Sutemizuvchi hayvonlar, odamlar, suvda va quruqlikda yashovchilar, baliqlarning esa ayrim turlarini urg'ochilarida jinsiy xromosomalar XX, erkaklarida esa XY, aksincha qushlarda, sudralib yuruvchilarda, ayrim suvda va quruqlikda yashovchilarda, ba'zi o'simlik turlarida, masalan, yertutda urg'ochi organizm XY, erkak organizmida XX bo'ladi. Jinsiy xromosomalar odatda organizmlarda bir justni tashkil qilib, erkak va urg'ochi organizmlarda bir biridan farq qilmaydigan qolgan xromosomalarni **autosomalar** deyiladi.

Agar urg'ochi organizm jinsiy xromosomalari XX, erkak organizmlarda XY bo'lsa urg'ochi organizm bir xil X va Y xromosomali gameta, erkak organizm esa ikki xil X va Y xromosomali gametalarni hosil qiladi. Bunda urg'ochi organizm - **gomogametalni**, erkak organizm - **geterogametalni** deyiladi. Mabodo urg'ochi organizm geterogametalni, erkak organizm gomogametalni bo'lsa, urg'ochi organizmdan X va Y xromosomali ikki xil gameta, erkak organizmdan esa bir xil X xromosomali gameta rivojlanadi.

Ba'zi organizmlarda geterogametalilik bir jinsiy xromosomani yo'qolishi bilan aloqador. Shunga ko'ra gomogametalni organizm XX, geterogametalni organizm XO bo'ladi. Qandalalar va ninachilarning urg'ochi organizmda XX, erkagida XO, kuyalarda esa aksincha urg'ochilarida XO, erkaklarida XX jinsiy xromosomalar mavjud. Shunga ko'ra qandala erkagida 13 xromosoma, urg'ochisida 14 xromosoma bo'ladi. Undan 12 tasi tana xromosomalari yoki autosomalar hisoblanadi. Urg'ochi gametalar 6A bitta X xromosoma, erkak gameta — spermiyalarning birida 6A bitta X, ikkinchi spermiyalarda faqat 6A bo'ladi xolos, chunki keyingisida jinsiy xromosoma uchramaydi. Kuyalarda esa aksincha urg'ochi organizm gametasini autosoma va bitta X jinsiy xromosomaga ega bo'lib, ikkinchisida jinsiy xromosoma bo'lmaydi. Erkak organizm gametalarining har birida X xromosoma bo'ladi.

Gulli o'simliklarning 90% ikki jinsli — **germofroditdir**, 10% gullar bir jinslidir. Ular ikkiga: bir uyli va ikki uyli o'simliklarga bo'linadi. Bir uyli o'simliklarning urug'chi va changchilari bir o'simlikda, ikki uyli o'simliklarda esa changchi bir, urug'chi ikkinchi o'simlikda joylashgan. Ikki uyli o'simliklarning gomogametalni va geterogametalni bo'lishi mumkinligini dastlab **K.Korrens** o'z tajribalarida aniqlagan. U buni jigar mohini bir uyli, ikki uyli xillarini chatishirib isbotlagan va urug'chi o'simlik gomogametalni, changchi o'simlik geterogametalni ekanligini ma'lum qilgan. Jigar moxi o'simligi xromosomalari gaploid to'plamli, sporangiysi esa dipliod to'plamli bo'ladi.

K.Allen 1917-yilda jigar mohining changchi va urug'chi gaploid o'simliklari 7 ta xromosomali bo'lsada, biroq o'zaro farq qilishini, changchi gaploid o'simligida bitta xromosoma nuqtasimon (Y), urug'chi gaploid o'simlikda esa uzun (X) bo'lishini ma'lum qildi. Urug'lanish mobaynida ikkita gaploid to'plamli o'simliklar 14A+XY xromosomaga ega sporafitni hosil qiladi. Sporafitning meyoz bo'linishidan so'ng, bir ona hujayradan 4 spora rivojlanadi. Ulardan ikkitasida 7A+X xromosoma, ikkitasida 7A+Y xromosoma to'plami bo'ladi. Binobarin ana shu sporalardan rivojlangan ikkita o'simlik urug'chi, ikkitasi changchi o'simlik sanaladi. Ularning o'zaro nisbati 1:1 ga teng. Ayrim hollarda ba'zi mohlar sporangiyasi (14A+XY) vegetativ usulda ko'payib, bir uyli o'simlikni rivojlantiradi.

Jinsi xromosomalarni o'zaro farq qilishi ikki uyli gulli o'simliklarning 50 turida topilgan, 26 turida esa ular topilmagan. Jinsi hujayralari bo'yicha geteromorf barcha o'simliklarda jinsi singam tip bo'yicha ya'ni gametalarni va jinsi xromosomalarni qo'shilishi mobaynida belgilanadi.

4.Jinsi aniqlashda balans nazariyasi

1922-yili amerikatik genetik **K.Bridjes** bir nechta triploid 3X+3A drozofila meva pashshalarini aniqladi. Bu triploid pashshalar hayotchang xromosomalari va autosomalari turli sonda va kombinatsiyada bo'lgan 8 xil formalar hosil qildi: 1)3X:3A, 2)2X:2A, 3)[2X+Y]:2A, 4)2X:3A, 5)[2X+Y]:3A, 6)XY:2A, 7)3X:2A, 8)XY:3A. Bunga asosiy sabab triploid urg'ochi pashsha gametogenezda xromosomalarni normal tarqalishini buzilishi oqibatida turli xromosoma to'plamli gametalar hosil bo'lishidir. Olingen 8 xil pashshalarni to'rtta guruhga ajratish mumkin:

- 1) Normal urg'ochi va erkaklar,
- 2) Interseks(germofrodit) – oraliq formalar,
- 3) O'ta erkak formalar(ular odatda bepusht bo'ladi),
- 4) O'ta urg'ochi formalar (bepusht).

K.Bridjes drozofila meva pashshasida jins X va Y xromosomalarning mavjudligi bilan emas, balki jinsi xromosomalarning autosomalarga bo'lgan nisbati (X:A) bilan belgilanishini ta'kidladi. Agar bu nisbat 1 ga teng bo'lsa 3X:3A, 2X:2A, [2X+Y]:2A **normal urg'ochi**, agar bu nisbat 0,5 teng bo'lsa XY:2A **normal erkak**, agar nisbat 0,67 bo'lsa [2X+Y]:3A, 2X:3A **oraliq forma interseks**, agar nisbat 1,5 teng bo'lsa 3X:2A **o'ta urg'ochi**, agar nisbat 0,33 ga teng bo'lsa XY:3A **o'ta erkak organizmlar hosil bo'ladi**. Jinsi xromosomalarning autosomalarga bo'lgan nisbatini aniqlashga **Bridjesni jinsi aniqlashning balans nazariyasi** deyiladi. Demak,

Y xromosoma erkak drozofilalar indikatorlik rolini o'ynamaydi. Balans nazariyasini ba'zi bir o'simlik jinsini aniqlashda ham qo'llash mumkin. Ikki uyli yaylov otqulog'ida Y xromosoma jinsga nisbatan befarq. Bu o'simlikda jins X xromosoma bilan autosomalarning o'zaro nisbatiga qarab belgilanadi. Odatda urug'chi o'simlikda 2A+XX, changchi o'simlikda 2A+XY bo'ladi. Mabodo autosomalar soni X xromosomaga nisbatan ko'p bo'lsa 2X+3A u holda changechi, 4X+3A bo'lsa urug'chi o'simlik rivojlanadi.

5.Odamlarda jinsi shakllanishi

Odam jinsini aniqlashda va uni rivojlanishida hozirgi davrda ikkita: biologik va ijtimoiy (fuqarolik yoki pasportlik, psixoseksual autoidentifikasiya) tushunchalari farqlantiriladi.

Biologik jins genetik, gonada, gormonal va somatik tushunchalar majmuasidan iborat. Genetik jins jinsi xromosomalar yig'indisiga XX, XY ga qarab belgilanadi. Bunda XX ayol jins, XY erkak jinsini ifodalaydi. **Gonadalar** – jinsi bezlar ayollar tanasida tuxumdon, erkaklarda urug'don bo'lishi bilan belgilanadi. Gormonal jins asosan jinsi bezlar ishlab chiqaradigan gormonlar turi va darajasiga qarab aniqlanadi. Ko'p hollarda jinsi organlarning tuzilishi va ikkilamchi jinsi belgilarning rivojlanishiga qarab jins belgilanadi. Biologik jins tarkibidagi barcha komponentlar o'zaro aloqador va bir-birini to'ldiradi. Ularning har birida nuqsonlarni bo'lishi jins rivojlanishini o'zgartirishi mumkin. Aniqlanishicha odam homilasida jinsi xromosomalar XX, XY bo'lishidan qat'iy nazar jinsi hujayralar dastlabki gonadalar selomning epiteliysidan shakllanadi. Odam boshqa sutemizuvchi hayvonlar singari tabiatan biseksual sanaladi. 14 kunlik murtakda dastlabki jinsi hujayralar shakllanadi, lekin hali gonadalarda jinsi tafovut kuzatilmaydi. Odam gonadalarini olti haftadan so'ng jinslarga ajraladi. Bunda gormonlarni roli nihoyatda katta bo'ladi. Bunga misol qilib 19- xromosomada joylashgan MIS (mullerian inhibiting substance) genini olish mumkin. Homilaning 10-12 haftasi oraliq'ida ana shu gen ta'sirida sertoli hujayralaridan ajraladigan gormon erkak jinsning tashqi jinsi organini rivojlantirishiga sababchi bo'ladi.

X xromosoma soniga qaramay gonosit hujayrada Y xromosomani bo'lishi jins tabaqalanishini, moyak, binobarin erkak jinsi tomon rivojlanishini ta'minlaydi. Jinsi bezlar rivojlanishining buzilishi yoki bo'lmasligi jinsi xromosomalar to'plami qanday bo'lmasin rivojlanishni ayol jinsi tomon yo'naltiradi. Aniqlanishicha Y xromosoma yelkasida joylashgan SRY geni erkak jinsi belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qayd etilgan gen jinsi jihatdan hali tabaqalashmagan gonadalarni moyak tomon rivojlanishini ta'minlaydi, ular esa o'z navbatida erkak genotipiga xos gormonlarni

ishlab chiqara boshlaydi. Murtak jinsiy bezlarida Y xromosoma bo'lmashligida tuxumdon rivojlanadi va qiz tug'iladi. Agar hujayrada Y xromosomaning faqat uzun yelkasi bor bo'lsa ayol, faqat kalta yelkasi bor bo'lsa erkak organizm hosil bo'ladi. Bundan tashqari jins belgilanishida va rivojlanishida X xromosoma va autosomalarning ma'lum joyida joylashgan genlar ham ta'sir ko'rsatadi.

Homilaning 12-20-haftasi oralig'ida androgenlar ma'lum darajada bo'lgandagina tashqi jinsiy organlar erkaklik tomon rivojlanishi mumkin. Bu davrda androgenlar yetarli bo'lmasa, u holda genetik yoki gonada jinsidan qat'iy nazar tashqi jinsiy organlari ayollik tomon rivojlanadi yoki erkaklik yo'nalishidagi rivojlanishda kamchiliklar ro'y beradi. Androgenlarning manbai bo'lib urug'don va buyrak usti bezlari hisoblanadi.

Androgenlar (testosteron, ayniqsa digidrotestosteron) tashqi genital organlarni hosil etuvchi hujayralarni belgilaydi. Androgenlar reseptorlarini va 5a reduktaza fermentini kodlovchi genlarning mutatsiyasi erkak soxta germofroditligini hosil etadi. Oqibatda genetik, gonada va gormonal erkak jinsda patologik buzilish ro'y beradi. Tashqi erkak organi rivojlanishi tugallanmay ayol jinsiy organi rivojlanmay qolgan tipi ro'yobga chiqadi.

Gonadalarni jinslarga ajralishida faqat jinsiy xromosomalargina emas, balki X va Y xromosomalaridagi hamda autosomalardagi genlar ishtirokida sintezlangan oqsillar, gormonlar muhim rol o'ynaydi. Masalan Y xromosoma joydalashgan gen SRY (sex determining region) va unga qardosh 17 xromosomadagi 30 ga yaqin genlardan iborat SOX moyak rivojiga ta'sir ko'rsatadi. Y xromosomaning uzun yelkasidegi AZF geni spermatogenezni normal bo'lismiga ta'sir qiladi. Y xromosomaning uzun yelkasidegi AZF (azoospermia faktor) geni jinsiy organlarning erkaklik tomon rivojlanishini ta'minlab, testosteroda gormonini sintez qilishda qatnashadi. Y xromosomaning uzun yelkasidegi AZF (azoospermia faktor) spermatogenezni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Uning mutatsiyasi natijasida spermatogenezni faolligi susayadi yo tamomila to'xtaydi. MIS (mullerian inhibiting substance) geni bo'lmagan holatda bachadon rivojlanadi.

X xromosomadagi DSS (dosage sensitive sex reversal) va AHS (adrenal hypoplasia congenita) tuxumdonni rivojlanishida qatnashadi. Bu genlar normal erkak organizmlarda repressiyaga uchraydi.

Homilada jinsiy xromosomalar XXY holatda bo'lsa erkaklik jinsiy organlar yetarli darajada rivojlanmaydi, ayollik tana tuzilishi ro'y beradi. Jinsiy organlarning shakllanishi, rivojlanishi va funksiyasiga juda ko'p genlar ishtirok etishi ma'lum bo'lgan. Xususan erkak jinsiy organi shakllanishi,

tuzilishi, rivojlanishi prostata bezini rivojiga 120, tuxumdon rivojiga 500, bachadon shakllanishi va rivoji, funksiyasiga 1800 gen qatnashishi aniqlangan. Bu genlar o'zaro bog'liq va aloqador holda jinsiy organ shakllanishi, tuzilishi, funksiyasiga ta'sir ko'rsatadi.

Odamning Y xromosomasini gaploid genomdagi DNK ning 1,6 % ni tashkil etsada uni erkak tomon rivojlanishini ta'minlaydigan 92 geni bor. Ularning ayrimlarining tuzilishi va funksiyasi o'rnilgan.

Masalan Y xromosomaning kalta yelkasidegi SRY geni ming nukleotidlar juftligidan iborat. Uning ekspressiyasi zigitada ro'y beradi. Murtakni rivojlanishi mobaynida SRY geni ba'zan XY yoki boshqa xromosomaga translaksatsiya qilinishi yoki yo'qolishi mumkin. Natijada XY xromosomali genotipi qiz, XX xromosomali genotipi o'g'il bolani rivojlantiradi. Moyakni normal rivojlanmasligi, spermatogenezni normal bo'lmasligi, ayolga xos sut bezlarni taraqqiy qilinishi kuzatiladi.

XY xromosomali ayollarda esa gonadalarni noto'g'ri rivojlanishi ichki jinsiy organlarda nuqson bo'lishi ro'y beradi.

6.Jinsiy xromatin

Sutemizuvchilarining interfaza holatidagi ko'p hujayralarida yadro qobig'iga yaqin joyda kuchli bo'yaladigan gardishsimon "tanacha" borligi ma'lum bo'lgan. Dastlab bunday bo'yaladigan tanachalarini urg'ochi mushuklar nerv hujayrasida olimlardan **Barr M.** ko'rgani sababli **Barr tanachasi** deb yuritiladi. Barr tanachasi urg'ochi organizmlar yadrosida bo'lib, erkak organizmlarda uchramaydi. Shunga ko'ra bunday tanacha jinsiy xromatin degan fikr tarqalgan. Jinsiy xromatin X xromosomaning geteroxromatinlashi tufayli paydo bo'lgan. Mabodo hujayra yadrosida faqat bitta X xromosoma mavjud bo'lsa (erkak hamda Shereshevskiy – Terner sindromali ayol) jinsiy xromatin uchramaydi. Bitta jinsiy xromatin odatda normal ayol hujayrasida kuzatiladi. Agar Klinefelter sindromi ro'y bersa, u holda erkak organizmda ikkita XXY xromosomadan biri jinsiy xromatinga aylanadi.


Ayol organizm hujayralarida to'rtta X xromosoma uchrasa ulardan uchtasi jinsiy xromatindan iborat bo'ladi.

Jinsiy xromatin faqat sutemizuvchilardagina emas, balki qushlar va kapalaklarda ham uchraydi, vaholanki mazkur organizmlarning urg'ochisi geterogameta hisoblanadi. Bu holat jinsiy xromatin urg'ochi organizm tabiat bilan bog'liq ekanligidan dalolat bersa ham uning asl mohiyati hali oydinlashmagan.

7. Jinsning tabaqalanishi

Jins belgilari boshqa belgilarni singari genotip va tashqi muhit omillari ta'sirida rivojlanadi. Organizmlar genetik jihatdan biseksual sanaladi. Organizmning biseksual asosi rivojlanish jarayonida yo'erkaklik, yo'urg'ochilik tomon yo'nalishida namoyon bo'ladi.

Hozirgi vaqtida jins tabaqalanishini genetik, embriologik, sitologik yo'l orqali o'rganiladi va shaxsiy rivojlanish mobaynida jinsn qayta taqsimlanishi mumkin. Jinsnning asosiy mezoni bo'lib jinsn siy sistemasi va chatishishni ta'minlaydigan fiziologik (bioximik) mexanizmlarni urg'ochilish hisoblanadi. Homilaning boshlang'ich gonadalari ham tashqi to'qima (**korteks**) va ichki to'qima qavatdan (**medula**) tashkil topgan. Korteks qavat kelgusida urg'ochi, medula esa erkak jinsn organlarini hosil etadi. Shunday qilib, jins tabaqalanishi mobaynida jinsn ifodalovchi tashqi va ichki qavatlardan biri rivojlanadi.



22 - rasm. Ontogenezda gonadalarni tabaqalanish sxemasi.

Erkak jinsida medulyar qavat rivojlanib, kortikal qavat faoliyatini bo'g'adi va urug'donni hosil etadi. Urg'ochi jinsda esa kortikal qavat rivojlanishi tezlashadi, oqibatda medulyar qavat shakllanishini bo'g'adi va tuxumdon hosil bo'ladi. Binobarin jins tabaqalanishi homilada gonadlarni hosil bo'lishidan boshlanadi. Odamning olti haftalik homilasi uzunligi 12 mm bo'lib, unda halil jins belgilari namoyon bo'lmaydi. 13 mmli homiladan tortib erkak gonadalar – urug'donlar shakllana boshlaydi. Uch oylik homilada o'g'il va qiz bolaning jinsi farqlanadi. Aksariyat ko'pchilik hayvonlarda jinsn tabaqalanishi gormonlar yordamida ro'yobga chiqadi. Bu gormonlar faqat endokrin bezlar emas, balki boshlang'ich gonadalarning korteks va medulyar qavatlar faoliyatiga bog'liq.


Ikkinchisi darajali jinsiy belgilarni rivojlanishi ham gormonlar ta'siri ostida hosil bo'lishiga bog'liq. Agar jinsiy jihatdan voyaga yetmagan

sutemizuvchi hayvonlar, qushlarda urug'don olib tashlansa ya'ni bichilsa, u holda bichilgan hayvonda urg'ochi jinsga xos belgilarni rivojlanadi. Aksincha, bichilgan urg'ochi jo'jalarda keyinchalik tashqi tomondan xo'rozga xos belgilarni hosil bo'ladi.

8. Gormonlar orqali jinsn belgilash

Irsiy jihatdan organizmlarning biseksual ekanligini yorqin isboti bo'lib tabiiy va sun'iy sharoitda jinsn shaxsiy taraqqiyot mobaynida o'zgarishi hisoblanadi. Yuqorida tabiiy sharoitda organizm jinsnini o'zgarishi dengiz chuvalchangi (*Bonella viridis*)da ko'rildi. Jinsn belgilashda gormonlarning ta'siri alohida o'rganiladi. Masalan, tovuq tuxumiga inkubatsiya davriga qadar estrogen gormoni bilan ishlov berilsa, u holda tuxumdan faqat urg'ochi jo'jalarni rivojlanadi.

Akvariumda yashaydigan medaki balig'ini erkagi XY xromosomali bo'lib qizil rangda, urg'ochisi esa XX xromosomali bo'lib oq rangdadir. Xarakterli tomoni shundaki, tananing qizil rangini hosil etuvchi gen (R) Y xromosomada joylashgan. Uning retsessivi r esa X xromosomada bo'ladi. Shunga ko'ra doimo erkak balig qizil rangda, urg'ochi baliglar esa oq rangda bo'ladi.



23 - rasm. Gormonlar ta'sirida baliqlarda jinsn o'zgarishi. R geni qizil, r geni oq rangni ifodalaydi.

Yapon olimi T.Yamamoto endigina otalangan tuxumdan rivojlanayotgan, hali jinsiy tabaqalanishga ulgurmagan baliq chavog'ini ikki guruhga ajratib, ularning bir guruhini normal ozuqa bilan boqqan. Ikkinci guruhining ozuqasiga urg'ochi organizm jinsiy bezlari ishlab chiqaradigan metiltestosteron gormonini 8 oy davomida qoshib bergan. Oqibatda urg'ochi baliq gormoni bilan oziqlangan genotip jihatdan erkak (X^rY^R) baliq chavog'i fenotip bo'yicha urg'ochi baliqqa aylangan. Bunday «urg'ochi» baliqlar normal ya'ni ham genotip (X^rY^R), ham fenotip (qizil) baliqlar bilan chatishirilganda F_1 75 foiz qizil rangli erkak, 25 foiz oq rangli urg'ochi baliqlar hosil bo'lgan:

$$\begin{array}{ll} \text{Fen.} & \text{qizil} \quad \text{qizil} \\ P_{\text{Gen}} & \geq X^rY^R \times X^rY^R = F_{\text{Gen}} \end{array}$$

$$X^rX^r : 2X^rY^R : Y^RY^R$$

Bu misol birinchidan organizmlar genetik jihatdan biseksual, sun'iy ravishda o'zgartirish mumkinligini ko'rsatadi.

Savol va topshiriqlar

1. Jinsga ta'rif bering.
2. Birlamchi jinsiy belgilarga nimalar kiradi?
3. Ikkilamehi jinsiy belgilarga misollar keltiring.
4. Jinsiy dimorfizm nima?
5. Jinsni aniqlashning qanday xillari bor? Ularning har birini tushuntirib bering.
6. Jinsni aniqlashda xromosomalarning rolini izohlang.
7. Gomogametali va geterogametali urg'ochi organizmlarga misollar keltiring.
8. Autosoma nima?
9. Jinsni aniqlashning balans nazariyasini tushuntiring.
10. Jinsiy xromatin deganda nimani tushunasiz? U qaysi jinsli organizmlarda uchraydi?
11. Boshlang'ich gonadalardagi korteks va medula qavatlarning funksiyasi nimadan iborat?
12. Biseksuallik nima?
13. Yapon olimi Yamamoto tajribasi tafsilotini gapiring?
14. Qanday organizmlarni germofrodit deyish mumkin? Gulli o'simliklar misolida tushuntiring.
15. Organizmlarda jinsni rivojlanishida androgenlarni ta'siri qanday?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Sutemizuvchi hayvonlar jinsi genetik jihatdan belgilashning qanday tipiga kiradi?

- A. Urg'ochilar geterogametali, erkaklari gomogametali
- B. Urg'ochilar XO, erkaklari XX
- C. Urg'ochilar gomogametali, erkaklari geterogametali
- D. Jinsiy xromosomalarga nisbatan autosomalar ko'pligi

2. Parrandalarda jins qanday belgilanadi?

- A. Urg'ochi jins gomogametali, erkak jins geterogametali
- B. Urg'ochi jins bitta jinsiy xromosoma, erkagida ikki jinsiy xromosoma
- C. Urg'ochi jins geterogametali, erkak jins gomogametali
- D. Urg'ochi va erkaklari gomogametali

3. Erkak jins gomogametali organizm

- A. Chumchuq, kaptar
- B. A'yiq, yo'lbars
- C. Odam, drozofila
- D. Quyon, tulki

4. Erkak jins geterogametali organizm

- A. Kaptar, qaldirg'och
- B. Timsoh, bo'tri
- C. Odam, drozofila
- D. Chumchuq, musicha

5. Erkak va urg'ochi organizmning o'zaro farqlanmaydigan xromosomalari qanday ataladi?

- A. Jinsiy xromosomalar
- B. Metatsentrik
- C. Poliploidlar, akrotsentrik
- D. Autosomalar

6. Jinsni shakllanishida qanday omillar rol o'ynaydi?

- A. Gonadalar
- B. Gornionlar
- C. Jinsiy xromosomalar
- D. A-C

7. Qaysi xromosoma kasalliklarida jinsiy xromatin mavjud?

- A. Shereshevskiy-Terner sindromida
- B. Klaynfelder sindromida
- C. Daun sindromida
- D. Patau sindromida

78. Jins bilan birikkan holda belgilar (genlar) ning irlsiyanishi

Tayanch tushunchalar: Jins bilan birikkan holda belgilarning irlsiyanishi gemizigota, kris-kross chatishirish, jinsiy xromosomalar tarqalmagandagi belgilarning irlsiyanishi, X xromosoma birikkan holatdagi irlsiyanish, jins bilan cheklangan va jinsga bog'liq belgilar, jinsni erta bilishning genetik usuli.

1. Jinsga birikkan belgilar (genlar)ning irlsiyanishi

Mendel olib borgan tajribalar chatishirishda qaysi belgili o'simlikni urug'chi, qaysi belgili o'simlikni changchi sisatida olinishidan qat'ly nazar birinchi avloddha bir xil natija ya'ni donning sariq rangi yashil rangi ustidan, gulning qizil rangi oq rangi ustidan dominantlik qilishi aniqlangan. Biroq keyinchalik ayrim jinsli organizmlarni chatishirish bo'yicha o'tkazilgan tajribalar ba'zi holatlarda belgilar jinsga birikkan holda avloddan-avlodga o'tishini ya'ni to'g'ri va retsi prok chatishirish har xil natija berishini ko'rsatdi. Shunga binoan ba'zi genlar jinsiy xromosomalarda joylashgan bo'lsa kerak, degan taxmin ilgari surildi va uning to'g'riliqi tajribalar asosida isbotlab berildi.


T.Morgan va uning shogirdlari drozofila meva pashshasida ayrim genlar jinsga birikkan holatda irlsiyanishini kashf etdi. Bu hodisa irlsiyatning **xromosoma nazariyasining** yaratishda dastlabki poydevor bo'ldi.

Morgan tajribalarini birida drozofilaning ko'z rangini irlsiyanishi o'rganildi. Ko'zning qizil rangi dominant, oq rangi esa retsessiv ekanligi ma'lum bo'ldi. Chatishirish uchun olingan urg'ochi qizil ko'zli gomozigota drozofila genotipi $X^{W+}X^{W+}$, oq ko'zli erkakniki X^WY bo'ladi*.

Ularni o'zaro chatishirish natijasida F_1 dagi urg'ochi va erkak drozofilalarning ko'z qizil bo'ladi. Bunga sabab, qizil rangni ifoda qiluvchi gen urg'ochi organizm jinsiy hujayralarda erkak organizmdagi ko'zning oq rangini ifodalovchi genga nisbatan ikki hissa ko'pligidir. Mabodo F_1 dagi qizil ko'zli urg'ochi va erkak drozofilalar o'zaro chatishirilsa, F_2 dagi urg'ochi drozofilalarning hammasi qizil ko'zli, lekin ularning 25 foizi gomozigota, 25 foizi geterozigota holatda, erkaklarining ham 25 foizi qizil ko'zli, 25 foizi oq ko'zli bo'ladi. Buni tubandagicha tasvirlash mumkin. (24-rasm)

*) Gen allellarini ifodalash. Genetika fani tarixida dastlab genlarni harflar bilan ifodalashni – belgilashni G.Mendel joriy etgan. U genning dominant allelini bosh harf, retsessiv allelini esa kichik harf bilan ifodalagan, chunonchi, A, a, B, b, D, d va hokazo. Genlarni bunday lotin alfavitining harflari bilan ifodalash genetikaning dastlabki unchalik ko'p genlar o'rganilmagan paytda ahamiyatli bo'lgan. Lekin keyinchalik turli organizmlarda juda ko'p genlar ma'lum bo'laver vergach, ularni bir xil harflar bilan ifodalash chalkashliklarga olib kelishi ma'lum bo'ldi. Shunga ko'ra hozirgi paytda genni u ifodalovchi belgining engiliz tilidagi so'zining bosh harfi (harflari) bilan ifodalash rasmiy tus olgan.


Masalan no'xat o'simligida gulning erta ochilishi Earfiness – E, gul tuzilishining o'zgarishi flower anomalies – fla, urug'chibargining to'q sariq bo'lishi orange cotyledons – orc yoki drozofila meva pashshasida tananing qora rangi black – b, kulrang bo'lishi – b+, qanotning normal bo'lishi vestigial – vg⁺, kalta bo'lishi – vg, makkajo'xorida endospermning shamsimon bo'lishi woxy endosperm – wx, kraxmalsimon endosperm wx⁺ bilan ifodalananadi. Ko'rinxib turibdiki genlar ingliz tilidagi so'zlarning bosh harfi yoki harflari bilan ifodalanganda dominant alleller hamma vaqt bosh harflar bilan yozilmay, balki kichik harflar orqasiga arifmetikadagi qo'shish belgisi + (plus) qo'yiladi.



24 - rasm. Drozofila meva pashshasida ko'z rangining jinsga birikkan holda irlsiyanishi. W^+ – ko'z rangining qizilligini, $W-$ – ko'z rangining oqligini ifodalaydi.

Fen.	qizil	oq	
P _{Gen.}	$X^{W+}X^{W+}$	X^WY	
	\nearrow	\nearrow	
gam	X^{W+}	X^W	
\nearrow	X^{W+}	Y	
Fen.	qizil	qizil	
F _{1Gen.}	$X^{W+}X^W$	$X^{W+}Y$	
	\nearrow	\nearrow	
gam	X^{W+}	X^{W+}	
	X^W	Y	
Fen.	qizil	qizil	oq
F _{2Gen.}	$X^{W+}X^{W+}$	$X^{W+}X^W$	$X^{W+}Y$
	\nearrow	\nearrow	\nearrow
	X^{W+}	X^W	X^WY

Yuqoridagi drozofilalarda retsi prok chatishirish o'tkazilsa, ya'ni oq ko'zli urg'ochi drozofila qizil ko'zli erkak drozofila bilan chatishirilganda F₁ da hosil bo'lgan urg'ochilar qizil ko'zli, erkaklari oq ko'zli drozofilalar bo'lgan. Chatishirish natijasida hosil bo'lgan erkak pashshalar onasini belgisini, urg'ochi drozofilalar otasini belgisini o'zida namoyon etgan. Otadagi belginining uning qizi (tashuvchi) orqali erkak jinslarda berilishi kris-kross tipdagi irsiylanish deyiladi.




Fen.	oq	qizil	
P _{Gen.}	X ^w X ^w	X	X ^w Y
gam	X ^w X ^w	X ^w Y	
Fen.	qizil		oq
F ₁ Gen.	X ^w X ^w	X	X ^w Y
gam	X ^w X ^w	X ^w Y	
F ₂	X ^w X ^w	X ^w X ^w	oq
	qizil	qizil	
	X ^w Y	X ^w Y	oq

Olingan natijalardan ma'lum bo'ladiki, urg'ochi organizm ko'z rangi bo'yicha gomozigota ($X^{w+}X^{w+}$, $X^{w+}X^w$) yoki geterozigota (X^wX^w) holatda bo'ladi. Ko'z rangini ifodalovchi gen esa faqat X xromosomada joylashgan. Y xromosoma esa genetik jihatdan nofaoldir. Binobarin, erkak


organizmda ko'z rangini ifoda qiluvchi gen bir hissa, urg'ochi organizmda esa ikki hissadir. Belgini ifodalovchi genning bir hissa retsessiv belginining jinsiy xromosomalar geterozigota holatda namoyon bo'lishini **gemizigota** deyiladi, ya'ni X^wY (oq ko'zli).

Urg'ochi organizm gomogameta, erkak geterogameta bo'lgan taqdirda, jins bilan bog'liq belgilari boshqa organizmlarda ham shunday usulda avloddan-avlodga beriladi. Odamda 60 ga yaqin genlar X xromosoma bilan birikkan holda irsiyanishi aniqlangan. Gemofiliya, daltonizm, muskul distrofiyasi bunga yorqin misoldir. Qon ivimasligi – gemofiliya kasalligi asosan o'g'il bolalarda uchraydi. Ular yoshlik yoki o'spirinlik davrida vafot etadilar va ahyon-ahyonda nasl qoldiradilar. Kasallik avloddan-avlodga geterozigota ayollar orqali beriladi. Daltonizm geni ham shu usulda irsiyanadi. Erkak jinsidagi X xromosomadagi barcha retsessiv genlar bayon etilgan usulda avloddan-avlodga beriladi.


Mabodo urg'ochi organizm geterogameta bo'lsa, jinsiy xromosomalar Z va W bilan belgilanadi va jins bilan birikkan belgilarning irsiyanishi boshqacha usulda amalga oshadi. Masalan, tovuq va xo'rozlarning patini chipor bo'lishi dominant, qora rangda bo'lishi retsessiv genlarga bog'liq. Ular Z xromosomada joylashgan. Agar qora patli tovuq bilan chipor patli xo'roz chatishirilsa F₁ avloddagi tovuq va xo'rozlarning pati chipor rangda bo'ladi. Chunki chipor belgini ifoda etuvchi gen xo'roz gomogameta bo'lani sababli ikki hissadir. F₁ dagi xo'roz va tovuqlar o'zaro chatishirilsa F₂ parrandalarni barcha xo'rozlari chipor, tovuqlarning 25 foizi chipor, 25 foizi esa qora patli bo'ladi. Nisbat 3:1 yoki 75% parrandalar chipor patli, 25% qora patli hisoblanadi.



26 - rasm. Tovuqlarda pat rangining jins bilan birikkan holda irsiyanishi.



Retsi prok chatishirishda ya'ni chipor tovuq bilan qora xo'roz chatishishidan olingan F_1 parrandalarning tovuqlari qora, xo'rozlari chipor rangda bo'ladi. Ularning ikkinchi avlodida tovuq va xo'rozlarning 50 foizi chipor, 50 foizining pati qora rangda bo'ladi. Bu xil chatishirish natijasi tubandagicha:




Tajribalarning ko'satishicha Y xromosoma hamma vaqt genetik jihatdan nofaol bo'lavermaydi. Ayrim holatlarda Y xromosomada ham ba'zi genlar uchrashi mumkin. Bunday vaqtida Y xromosomada joylashgan gen ta'sirida rivojlanadigan belgi faqat erkak organizmdan erkak organizmga irsiylanadi. Masalan, akvariumda boqiladigan tirik tug'adigan guppi balig'ini orqa tomonidagi suzgich qanotida qoramtr dog'ni rivojlaniruvchi gen Y xromosomada joylashgan bo'lib, bu belgi urchiyotganda erkakdan erkak guppiga beriladi.

Odam qulog'idan tuk o'sib chiqishini belgilovchi gen, shuningdek tishlarni katta-kichikligi, barmoqlar orasidagi parda hamda erkaklik kuch-quvvati Y xromosomada joylashgan genlarning ta'sirida rivojlanib, otadan faqat o'g'il bolalarga beriladi.

2.X xromosoma tarqalmagandagi belgilarning irsiylanishi

Odatda hujayraning meyoz bo'linish jarayoni normal kechsa autosomalar ham, jinsiy xromosomalar ham gametalarga teng taqsimlanadi. K. Bridjes tadqiqotlariga ko'ra ayrim vaqtida jinsiy xromosomalar meyoz jarayonida hujayralarga notejis taqsimlanishi mumkin. Oqjbatda bir gametaga ikkita X xromosoma tarqalib, ikkinchi gametada esa X xromosoma bo'lmaydi. Bunday tuxum hujayralar X xromosomali yoki Y xromosomali spermatozoidlar bilan urug'langanda 4 xil: XXX, XXY, XO, OY tipdagi zigotalar hosil bo'ladi. Mazkur holatda jins bilan bog'liq belgililar qanday irsiylanadi?

Yuqorida qayd qilinganidek agar oq ko'zli urg'ochi drozofila bilan qizil ko'zli erkak drozofilani chatishirilsa jinsiy xromosomalar normal gametalarga tarqalganda F_1 da urg'ochi qizil ko'zli, erkak oq ko'zli bo'ladi. X xromosoma gametalarga notejis tarqalganda esa uchta XXX xromosomaga ega drozofila yirik gavdali o'ta urg'ochi bo'lib, ular odatda o'ladir. Ikkita X va bitta Y xromosomali zigotadan rivojlangan drozofila erkak emas, u urg'ochi jinsli ko'zi oq bo'ladi. Bitta X xromosomali drozofilada Y xromosoma yo'q bo'lsada, qizil ko'zli erkak bo'ladi. Genotipi faqat Y xromosomali erkak organizm ham o'ladi.



27 - rasm. X xromosoma tarqalmaganda ko'z rangining jins bilan birikkan holda irsiylanishi. W^+ — ko'zning qizil, w — ko'zning oq rangi.


1 — X xromosoma normal tarqalganda;
2 — X xromosoma tarqalmaganda, ikkita X xromosoma tuxum hujayrada joylashgan;
3 — ikkita X xromosoma yo'naltiruvchi tanaga tarqalganda.

Demak, X xromosoma meyoz jarayonida tarqalmay qolgan taqdirda ona o'z belgisini qiziga, erkak o'z belgisini o'g'liga beradi. Vaholanki X xromosoma meyoz bo'linishda gametalarga teng taqsimlansa, ota organizm o'z belgisini qiziga, ona esa o'z belgisini o'g'liga bergen bo'lar edi.

3.X xromosoma birikkan holatdagi irlsiyanish

Ayrim hujayralarda X xromosomalar o'zaro birikkan holatda uchraydi, Natijada meyoz bo'linishda bir gametaga albatta o'zaro birikkan ikkita X xromosoma yo'naladi. Ikkinci gametada esa X xromosoma tamomila bo'lmaydi. Bunday holatda irlsiyanish qanday bo'lishini olimlar drozofila meva pashshasida tana rangini avloddan-avlodga berilishi misolda o'rganganlar.

Sariq tanali urg'ochi drozofila bilan kulrang tanali erkak drozofila chatishtirilsa, jinsiy xromosomalar meyoz jarayonida normal tarqalganda F_1 da barcha urg'ochi pashshalar kulrang tanali, erkak pashshalar esa sariq tanali bo'ladi.



28 - rasm. Drozofilada X xromosoma birikkanda tana rangining irlsiyanishi.

Ayrim holatlarda esa sariq tanali urg'ochi pashshaning ba'zilari kulrang tanali erkak drozofila bilan chatishtirilganda, F_1 da doimo urg'ochi pashshalar sariq tanali, erkak pashshalar esa kulrang tanali bo'lishi kuzatilgan. Mazkur hodisa faqat meyoz jarayonida ikkita X xromosoma o'zaro birikkan bo'lib, bir gametaga tarqalganda, ikkinchi gametada esa X xromosoma bo'limganda ro'y berishi aniqlangan.

Sitologik tekshirishlar sariq tanali urg'ochi pashshalarda ikkita X xromosoma uchlari bilan birlashgani, umumiyl sentromeraga ega ekanligini hamda ularda Y xromosoma borligini ko'rsatadi. Binobarin drozofila meva pashshasida sariq tana belgisini avloddan-avlodga yuqorida qayd etilgan usulda irlsiyanishi faqat X xromosomalar o'zaro qismlari bilan birikkan holatda yuz berishi kuzatiladi. Y xromosoma esa hamma vaqt drozofilada erkaklik jinsi uchun indikatorlik vazifasini o'tamasligini ko'rsatadi.

4.Jins bilan cheklangan belgilari

Jins bilan cheklangan belgilarni jinsga birikkan belgilardan farqlash lozim. Jins bilan cheklangan belgilari yo bir jins yoki ikkala jinsda mavjud bo'lsada, uning namoyon bo'lishi o'zaro tafovut qiladi. Chunki bunday belgilarni ifoda qiluvchi genlar jinsiy xromosomalarda ham, autosomalarda ham bo'ladi. Jins bilan cheklangan belgilarga misol qilib tovuqlarda tuxumni ko'p qo'yish, qoramollarda esa sutni ko'p berishni ko'rsatish mumkin. Ko'p tuxum qo'yish belgisi genlari tovuqda ham, xo'rozda ham, ko'p sut berish genlari sigirda ham, buqada ham bor. Mazkur belgi tovuq va sigirda namoyon bo'ladi ya'ni genotipik imkoniyatlar fenotipda ro'yogha chiqadi. Ushbu genlarning xo'rozlarda va buqalarda borligini bilish uchun bunday xo'roزلar ayrim tovuq zoti hamda bunday buqalar sigirning ayrim zoti bilan chatishtirish va olingan duragay parranda avlodlarida yoki shoxli qoramol avlodlarida chatishtirishda qatnashgan tovuqqa nisbatan tuxumni, sigirga nisbatan sutni qancha miqdorda bergenligiga qarab aniqlanadi.

Boshqa holatlarda jins bilan cheklangan belgilari har xil jinsda turli darajada namoyon bo'ladi. Masalan, erkak qo'yillarda odatda shox bo'lishi autosomaning dominant alleli H, shoxsizlik esa uning retsessiv alleli h ta'sirida rivojlanadi. Urg'ochi qo'yillarda aksincha h alleli H alleli ustidan dominantlik qiladi ya'ni urg'ochi qo'yarning geterozigotasi Hh shoxsiz, erkak qo'ylar esa shoxli bo'ladi. HH allellariga ega urg'ochi qo'yillarda shox rivojlanadi, lekin bu shox erkak qo'yarning shoxiga nisbatan kichikroq bo'ladi.


Odamlarda kallik — soch to'kilishi ham shunday usulda avloddan-avlodga beriladi. Ushbu belgining geni autosomada joylashgan. U erkaklarda

dominant holatda, ayollarda esa retsessiv holatda bo'ladi. Shunga ko'ra erkak organizmlar geterozigota bo'lgan taqdirda ham kallik namoyon bo'ladi, ayollarda esa u namoyon bo'lmaydi. Agar mazkur dominant gen gomozigota holatda bo'lsa kallikning ayollarda fenotipida namoyon bo'lishi kuchsiz, erkaklarda kuchli bo'ladi.

5.Jinsni erta aniqlashning genetik usuli

Belgilarning jinsga bog'liq ekanligini o'rghanish natijasida jinsni erta aniqlashda ushbu belgilardan nishon sifatida foydalananish imkonii tug'iladi. Parrandachilikda jins bir kunlik jo'jalarning tashqi belgisiga qarab aniqlanadi. Chunonchi, parrandalar patining chipor bo'lishi X xromosomaga birikkan dominant V geniga bog'liq. Shunga ko'ra bunday tovuqlarning hali pati chiqmagan jo'jalarning ensasida dog' ko'zga bilan chatishirishdan olingan jo'jalarning birinchi avlodida barcha erkak bunday dog'lar ko'zga tashlanmaydi. Chunki ular xo'rozning bitta X^b xromosomasiga ega bo'ladir. Buni tubandagicha izohlash mumkin:

Fen.	chipor	qora	
P _{Gen.}	Z ^b W	x	Z ^b Z ^b
gam	Z ^b	W	Z ^b
Fen.	qora	chipor	
F _{Gen.}	Z ^b W	Z ^b Z ^b	



29- rasm. Bir kunlik jo'jalarda (Legbar zoti) pat rangi. Chapda urg'ochi, o'ngda erkak jo'ja.

Keyingi yillarda O'zbekistonda ishlagan akademik V.A.Strunnikov tut ipak qurtining erkak jinsiy xromosomalarining turli qismilari joylashgan letal xususiyatiga ega genli I_1, I_2 liniyani yaratdi. Shunoday letal genga ega bir jinsiy xromosomaning boshqa jinsiy xromosomaani qarama-qarshi qismida normal gen bo'lgani sababli bunday erkak kapalaklar normal pushtli bo'ladir (tut ipakqurtida erkaklari gomogam etali). Bunday erkak kapalaklar urg'ochilar bilan chatishirilganda ulashning jinsiy xromosomalarida letal gen namoyon bo'ladi (urg'ochilar geterogametali bo'lganligi sababli X-xromosomadagi retsessiv letal gen fenotipda namoyon bo'lishi uchun sharoit tug'iladi) tufayli barzo'ha urg'ochi qurtlar olib, kelgusi nasida faqat erkak qurtlarga rivojlanib pilulla o'taydilar. Erkak ipak qurti urg'ochi ipak qurtiga nisbatan 25-30 foizde ipakko'p beradi. Ipakchilik sanoatida ipak mahsulotini ko'paytirish uchun mazkur genetik usulidan keng foydalilanildi.

Savol va topshiriqlar

- Urg'ochi organizm gomogametali bo'lganida jinsga birikkan irsiyanishni misollar bilan yozib tushuntiring.
- Urg'ochi organizm geterogametali bo'lganida jinsga birikkan irsiyanishni misollar bilan izohlang.
- X- xromosoma tarqalmaganda belgilarning irsiylanishi drosofila neva passhhasida qanday bo'ladi?
- X- xromosoma birikkan holatda bo'lganda belgilarning irsiyanishiga oid misollar keltiring.
- Jins bilan cheklangan belgililar qanday organizmlarda aniqlangan?
- Jinsni erta bilishning genetik usulini qanday al'maniyati bor.
- Geterogametali va gomogametali organizmlar yozuvda qanday ifodalanadi?
- Odamda belgilarning jinsga bog'liq holda irs iylanishiga misollar keltiring.
- Gemofiliya, daltonizm kasalliklarini irsiyanis hini masala usulida ishlab ko'rsating.
- Gemizigota deganda nimani tushunasiz?
- Tut ipak qurtida o'tkazilgan akademik V.A.Strunnikov tajriba tafsilotini tushuntiring.

Testlardan to'g'ri javobni aniqlashing

- Qanday belgilar jins bilan birikkan holda irs iylanadi?
 - Autosomalar orqali avlodlarga beriladigan belgilar
 - X xromosoma orqali avlodlarga beriladigan belgilar

- S. Y submetatsentrik xromosoma orqali avlodlarga beriladigan belgilar
D. Jinsiy xromosomalar orqali avlodlarga beriladigan belgilar
2. Hayvon va odamlarda jins bilan birikkan irsiylanish qoidasi
A. Ota organizm o'zini belgisini erkak organizmlarga beradi
B. Ona organizm o'zini belgisini urg'ochi organizmlarga beradi
C. Ota organizm o'z belgisini urg'ochiga, ona organizm o'z belgisini erkak organizmlarga beradi
D. Jins bilan bog'liq holda belgilarning irsiylanishi qoidasi yo'q
3. Gemizigota organizmni genotipini ko'rsating.
A. XY, ZW
B. XX, XO
C. XY, XX
D. ZW, XX
4. Quyida berilgan ota-onalar genotipini tahlil qilib qaysi oilada faqat daltonik o'g'il tug'ilish imkoniyatini aniqlang.
A. $X^D X^D \times X^D Y$
B. $X^D X^d \times X^D Y$
C. $X^d X^d \times X^d Y$
D. $X^D X^D \times X^d Y$
5. Kriss-kross nima?
A. Erkak organizm o'z belgisini qizi orqali uning o'g'illariga berishi
B. Urg'ochi pasha onani belgisini olishi
C. Erkak pashshalar otani belgisini olishi
D. Hamma pashshalar bir jinsli bo'lishi
6. Tovuq va xo'rozlarning patini chipor bo'lishi dominant, qora bo'lishi retsessiv genga bog'liq. Ular Z-xromosomaga bog'liq holda irsiylanadi. Agar qora patli tovuq bilan chipor patli xo'roz chatishirilsa F_1 , avlodda ular qanday patli bo'ladi.
A. Barchasi chipor patli
B. 50% chipor, 50% qora patli
C. Xo'rozlar chipor, tovuqlar 25% chipor, 25% qora patli
D. Barchasi qora patli
7. Tovuq va xo'rozlar pati chipor va qora bo'lib, Z-xromosomada joylashgan. Agar chipor rangli geterozigota xo'roz qora rangli tovuq bilan chatishirilsa F_1 avlod genotipi qanday bo'ladi?
A. $Z^B Z^h : Z^h Z^b : Z^BW : Z^bW$
B. $Z^B Z^B : Z^B Z^h : Z^BW : Z^bW$
C. $Z^B Z^h Z^BW$
D. $Z^B Z^h Z^B Z^h Z^BW Z^bW$

IV-BOB. BELGILARNING BIRIKKAN HOLDA IRSIYLANISHI

8§. Genlarning birikkan holda irsiylanishi. Krossingover

Tayanch tushunchalar: Belgilarning birikkan holda irsiylanishi, drozofila qulay obyekti sifatida, to'liq birikish, qisman birikish, krossingover, krossingover miqdori, lokus, santimorganid, krossingoverni sitologik isboti, qo'sh krossingover, interferensiya hodisasi, koinsidensiya koeffitsienti, birikish guruhi, genetik xarita, sitologik xarita, krossingover koeffitsienti, krossingoverga ta'sir etuvchi omillar, xromosoma nazariyasи.

1. Genlarning birikish guruhi

Mendelning irsiyat qonunlari ikkinchi marotaba qayta ixtiro qilinganidan biroz vaqt o'tgach Germaniyada T.Boveri, AQShda U.Setton bir-birdan mustasno holda o'z tadqiqot natijalarini xulosalab genlar xromosomalarda joylashgan degan taxminni ilgari surdilar. Olimlarning mazkur taxmini keyinchalik irsiyatning xromosoma nazariyasini yaratish uchun asos bo'ldi. 1906 yili inglez genetiklaridan U.Betson va R.Pennetlar hidli no'xat o'simligi ustida tajriba o'tkazib, ayrim belgilarni Mendel kashf etganidek avloddan-avlodga mustaqil holda emas, balki **birikkan holatda irsiyanishini** ta'kidladilar. Bu hodisa fanda **genlarning birikkan holda irsiyanishi nomini** oldi. Bunday holat boshqa organizm duragaylarida ham kuzatildi.



30 - rasm.
T.Morgan
(1866-1945).

Genlarning birikkan holda irsiyanish hodisasi AQSh olimi **Tomas Morgan** tomonidan atroflicha o'rGANildi. U birinchi marotaba drozofila meva pashshasida ko'z rangini ifoda qiluvchi gen X xromosoma bilan birikkan holda irsiyanishini amalda isbotlab berdi. Bu holat tufayli irsiyatning xromosoma nazariyasining asosi – **genlar xromosomalarda joylashgan** degan qoidani inkor qilib bo'lmaydigan darajada to'g'ri ekanligi isbotlandi.

Mabodo chatishirish uchun olingan organizmlar genlari har xil xromosomada joylashgan bo'lsa, ular avlodlarda mustaqil ravishda irsiylanadi. Buni diduragaylarning F_2 da fenotip bo'yicha 9:3:3:1 nisbatda, tahliliy chatishirishda esa 1:1:1:1 nisbatda xilma-xillik berishida ko'rish mumkin.

Tabiiyki har bir organizmda genlar soni xromosomalar soniga nisbatan bir necha marotaba ortiq. Bu o'z-o'zidan bir xromosomada bitta

gen emas, balki ko'p gen joylashganligidan dalolat beradi. Olib borilgan tadqiqotlarni ko'rsatishicha bir xromosomada joylashgan genlar tabijiy ravishda birikkan holda avlodda-avlodga beriladi.

2. Belgilarning birikkan holda irsiylanishi va krossingover


T.Morgan belgilarni birikkan holda irsiylanishini o'rganish uchun drozofila meva pashshasidan foydalandi. Chunki bu hasharot genetik tajribalarni o'tkazish uchun quyidagi afzallikkilarga ega:

1. Laboratoriya sharoitida ko'paytirish oson;
2. Tez ko'payadi, optimal temperatura 25-26° S da 10-15 kunda yangi avlod beradi;
3. Juda serpusht;
4. Xilma-xil va ko'p irlari belgilarga boy;
5. Xromosomalar soni nisbatan kam.

Morgan tajribalarining birida drozofilaning qora tanali (*b*), normal qanotli (*vg⁺*) urg'ochi formasini kulrang tanali (*b⁺*) rudiment qanotli (*vg*) forma bilan chatishirganda F_1 da barcha erkak va urg'ochi pashshalar tanasi kulrang, qanoti normal bo'lgan (31-rasm)*. Morgan F_1 dagi duragay kulrang tanali, normal qanotli erkak drozofilani qora tanali, rudiment qanotli urg'ochi forma bilan tahliliy chatishirganda F_2 da 50% drozofilalarda kulrang tana, rudiment qanot, 50% drozofilalarda qora tana normal qanot rivojlangan. Binobarin F_2 da xuddi ota-onaga o'xshash formalar teng miqdorda paydo bo'lgan. Agar, drozofiladagi ikki belgi genlari turli nogomologik xromosomalarda joylashganda F_2 da to'rt xil forma 25% dan hosil bo'lishi kerak edi. Lekin ikki xil belgi genlari bir xromosomada joylashgani sababli F_2 da ikki xil gameta hosil bo'ldi va F_2 da ota-onaga o'xshash ikki xil forma 50% dan olinadi. O'tkazilgan tajriba yakunlariga ko'ra Morgan belgilarni **to'liq birikishi** deb nom berdi.

F_1 dagi kulrang tanali, normal qanotli duragay urg'ochi drozofilani retsessiv belgili erkak drozofila bilan chatishirilganda, F_2 da 83% chatishirishda qatnashgan ota va onaga o'xshash drozofilalar olingan. Ularning 41,5% drozofilalarda kulrang tana, rudiment qanot 41,5% da qora tana, normal qanot rivojlangan. 17% drozofila duragaylarda esa ota-onaga organizmlar belgilari kombinatsiyalangan formalar, ya'ni 8,5% qora tanali, rudiment qanotli, 8,5% da kulrang tanali normal qanotlilar bo'lgan. Vaholanki bu ikki belgi bir biridan mustasno holda irsiylanganda hosil bo'lgan to'rt xil organizm 25% dan bo'lishi, agar belgilarning to'liq birikish bo'lganida edi bunda ikkita ota-onaga o'xshash organizmlar 50% dan xosil bo'lishi lozim edi. Shuning uchun bu hodisaga Morgan belgilarni **qisman birikishi** deb nom berdi.

* Birikkan holda irsiylanishga doir chatishirishni yozishda belgilarni bir biridan mustasno holda irsiylanishidan farqlash uchun genlar joylashgan xromosomalarni ko'rsatish lozim.




31 - rasm. Drozofilada jins bilan birikkan holda belgilarning irsiylanishi va krossingover. 1 - krossingover yuz bermaganda (F_1 geterozigotali erkak); 2 - geterozigota bo'lgan holatda (F_2 , urg'ochi geterozigota holatda); b^+ - kulrang, b - qora tana, vg^+ - normal qanot, vg - rudiment qanot.

Ikkinchchi tahliliy chatishirishdan olingan 17% drozofilalar F_2 dagi urg'ochi pashshalarda jinsiy hujayralar hosil bo'lish davridagi heyoz bo'linishda gomologik xromosomalarning kon'yugatsiya va krossingoveri tufayli genlarning ayirboshlanishi natijasi deb baholash kerak. Gomologik

xromosomalarda genlarning ayirboshlanish hodisasiga krossingover deyiladi. Krossingover natijasida ota-onaning ayrim belgilarini o'zlarida mujassamlashtirgan individlarni crossover organizmlar deyiladi. Krossingover tufayli xosil bo'lgan organizmlarni umumiy rivojlangan organizmlarga nisbatan foizi **krossingover miqdori** deb nomlanadi. Yuqoridagi misolimizda jami rivojlangan organizmlarni 100 deb olsak, undan 17 tasi krossingover natijasida hosil bo'lgan, ya'ni krossingover miqdori 17% ni tashkil qiladi.

Morgan xromosomalada genlar chiziqli ravishda joylashganligi va xar pashhasining birikkan holda irlsylanuvchi tananing sariqligi *u*, ko'zning oq rangda bo'lishi *w*, qanotning vilkasimon shaklda bo'lishi *bi* genlari uchta retsessiv xromosomalda joylashgan geterozigota formasi bilan shu Avlodda hosil bo'lgan pashshalar ichida 1,2% crossover formalari *w* genlari; 3,5% crossover formalari *w* va *bi* genlari va 4,7% crossover bo'ldi.

Olingan natijani sxema holida yozamiz:




Sxemadan ko'rinish turibdiki *u* - *w* genlari va *w* - *bi* genlari orasidagi krossingover miqdori *u* - *bi* genlari orasidagi krossingover miqdoriga teng.

Shundan kelib chiqyaptiki genlar orasidagi krossingover miqdoriga qarab genlar orasidagi masofani ifodalash mumkin. 1 va 2, 2 va 3 genlar orasidagi masofa 1 va 3 genlar orasidagi masofaga $1,2\% + 3,5\% = 4,7\%$ teng. Shu va shunga o'xshash natijalarni e'tiborga olib genlar xromosomalada

turg'un va chiziqli joylashgan deb aytilish mumkin. Xromosomalda gennings joylashgan o'mini **lokus** deyiladi. Morganni genetika faniga qo'shgan xizmatini inobatga olib uni xotirasini abadiylashtirish uchun genlar orasidagi masofani o'chov birligi sifatida **santimorganid** atamasi genetik muomalaga kiritildi. 1 santimorganid 1 krossingover miqdoriga mos keladi. Belgilarning birikkan holda irlsylanish haqidagi hodisa **Morgan qonumi** deb ataladi.

3. Krossingoverning sitologik isboti

Yuqoridagi misollarda krossingover hodisasining mavjudligi genetik tajribalar asosida isbotlandi. Haqiqatdan ham gomologik xromosomalardan ayrim qismi bilan o'zaro almashinadi degan mulohaza sitologik jihatdan tasdiqlanishi kerak edi. Odatda ota va onaning gomologik xromosomalari morfologik jihatdan aynan o'xshash. Shunga ko'ra ota-onaning gomologik xromosomalari ayrim qismi — genlari almashinganligini morfologik jihatdan isbotlash nihoyatda qiyin. O'rganilayotgan belgilarni rivojlanishiga ta'sir etuvchi genlar bir-biridan biroz farqlanadigan gomologik xromosomalarda joylashgan taqdirdagina krossingoverni sitologik jihatdan isbotlash mumkin. 1931-yili **B.Mak-Klintok** va **G.Kreyton** makkajo'xori ustida tadqiqot ishlarini olib borish mobaynida IX gomologik xromosomalardan jufti morfologik va genetik jihatdan farq qiladigan formasini aniqlashdi. Bu formada gomologik xromosomalardan juftining biri normal ko'rinishda bo'lib donning oq rangda bo'lishini belgilovchi retsessiv gen — *c* hamda kraxmalsimon endospermni ifodalovchi dominant gen *wx⁺* ga ega. Gomologik xromosomaning boshqasi esa uzunroq bo'lib, bir el ka qismi yo'g'onlashgan. Unda makkajo'xori po'stining qizil rangda bo'lishiga ta'sir etuvchi gen — *c⁺* hamda endospermning shamsimon bo'lishini ta'minlovchi *wx* geni joylashgan. IX xromosoma jufti morfologik jihatdan farqlangan doni qizil, kraxmalsimon endospermali digeterozigota duragay IX xromosomalari normal ko'rinishda bo'lgan, oq donli shamsimon endospermli makkajo'xori bilan chatishirilganda *F₁* ota-onada makkajo'xori o'simliklari singari oq rangli kraxmalsimon, qizil rangli shamsimon makkajo'xorilar bilan bir qatorda po'sti qizil kraxmalsimon va po'sti oq shamsimon makkajo'xorilar olingan. Po'sti qizil, kraxmalsimon makkajo'xorini xromosomalari mikroskop ostida ko'rilmaganida bitta xromosomasini bir uchi yo'g'onlashganligi ma'lum bo'lgan. Oq shamsimon makkajo'xorida esa IX gomologik xromosomaning bitti uzun, ikkinchisi normal holatda bo'lgan.



32 - rasm. Makkojoxorida krossingoverning sitologik isboti. C+ - endospermi qizil, C - endospermi oq, WX+ - endospermi kraxmalsimon, WX - endospermi shamsimon.

32-rasmda ko'rini turibdiki uzun xromosomaning kraxmalsimon endospermani hosil etuvchi geni joylashgan yo'g'on qismi boshqa gomologik xromosomaga ko'chib o'tgan. Binobarin gomologik xromosomalarining chalkashuvi tufayli genlarning bir xromosomadan boshqa xromosomaga ko'chib o'tishi sitologik jihatdan o'z isbotini topgan. Keyinchalik krossingoverni sitologik isbotini K.Shtern tomonidan drozofila meva pashhasining jinsiy xromosomalarida ham aniqlangan.

4. Qo'sh krossingover va interferensiya
 Olib borilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha krossingover hodisasi xromosomaning bir, ikki yoki ko'p qismida ro'y berishi mumkin. Krossingover hodisasi bir vaqtning o'zida xromosomaning ikki qismida amalga oshganligi haqida tajriba yakunlari bilan tanishaylik. Xitoy primulasi o'simligida tajriba uchun olingan o'simlikning L alleli gul ustunchasining uzun bo'lishini, uning retsessivi r gul ustunchasining kalta bo'lishini, R alleli gultojibargining qizil, retsessiv s alleli esa to'q pushti. S alleli urug'chi tumshuqchasing yashil, s alleli qizil bo'lishini belgilaydi. Tajribada gul ustunchasi uzun (L), gultojibarglari qizil (R), urug'chi


tumshuqchasi yashil (S) bo'lgan primula bilan gul ustunchasi kalta (r), gultojibarglari to'q pushti (r), changchi tumshuqchasi qizil (s) bo'lgan primulalar o'zaro chatishirilgan. Olingen F₁ duragay o'simliklarning gul ustunchasi uzun, gultojibarglari qizil, urug'chi tumshuqchasi yashil bo'lgan. F₁ duragaylar retsessiv belgili ya'ni gul ustunchasi kalta, gultojibarglari to'q pushti, changchi tumshuqchasi qizil bo'lgan o'simlik bilan chatishirilganda F₂ da tubandagi natija olingan.

7-jadval

Geterozigota hosil qiladigan gametalar	F ₁ genotipi	F ₂ dagi o'simliklar soni	Jami	
			o'simliklar soni	foiz hisobida
Nokrossover o'simliklar	LRS/lrs	1063	2095	56,8
	lrs/lrs	1032		
Birinchi joydagи yakka krossingover. L va R allellar oralig'ida	Lrs/lrs	156	336	9,2
	lRS/lrs	180		
Ikkinchi joydagи yakka krossingover. R va S allellar oralig'ida.	LRs/lrs	634	1160	31,5
	lrs/lrs	526		
Qo'sh krossingover. Bir vaqtning o'zida L va R hamda R va S allellar oralig'ida.	L/S/lrs	39	93	2,5
	Rs/lrs	54		
Jami			3684	100

7-jadvaldan ko'rini turibdiki, gomologik xromosomalar orasida faqat yakka krossingover emas, balki qo'sh krossingover ham sodir bo'lgan.

Keltirilgan misolda yakka krossingoverlar: L-R - 9,2%, R-S - 31,5% tashkil etsa, qo'sh krossingover L-R va R-S-2,5% ga teng. L-R, R-S genlari orasidagi haqiqiy masofani bilish uchun yakka krossingoverni hisoblashda qo'sh krossingoverni ham miqdorini inobatga olish lozim, chunki qo'sh krossingover ikkita yakka krossingoverdan tashkil topadi. Shunda L-R - 9,2% + 2,5% = 11,7% masofa, R-S - 31,5% + 2,5% = 34,0% masofa bo'ladi. Genlar xromosomada chiziqli joylashgan bo'lganligi sababli L - S genlari orasidagi masofa L-R + R-S = 11,7% + 34,0% = 45,7% teng bo'ladi.



33-rasm. Xitoy primulasi o'simligida xromosomada birikkan genlarning rekombinatsiyasiga oid sxema. 1 – nokrossover xromosomalar; krossingover; 2 – L va R genlari orasidagi krossingover; 3 – R va S genlari orasidagi ifodalaydi.

Odatda qo'sh krossingover sodir bo'lganda xromosomaning bir joyida ro'y bergen krossingover ikkinchi joyida ro'y bergen krossingoverga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning tezligini kamaytiradi. Shuningdek xromosomaning ikkinchi joyidagi krossingover uning birinchji joyidagi krossingover tezligini kamaytiradi. Bu hodisaga **interferensiya** deyiladi. Nazariy jihatdan sodir bo'lshi lozim qo'sh krossingoverdan amalda hosil bo'lgan qo'sh krossingoverni miqdori kam bo'lshini asosiy sababi shu. Yuqoridagi krossingoverni aniqlash uchun ikkita yakka krosingoverni bir vaqida bo'lsh ehtimolidan keltirib chiqaramiz:

$$\frac{11,7}{100} \times \frac{34,0}{100} \times 100 = 4,0 \text{ ya'n}i \text{ nazariy jihatdan sodir bo'lshi kerak bo'lgan krossingover miqdori.}$$

Xitoy primulasi o'simligida nazariy olingan qo'sh krossingover miqdori bilan amaliyotda kuzatilgan qo'sh krossingoverning qanchalik bir-biriga to'g'ri kelishini bilsiz uchun amalda olingan qo'sh krossingover miqdorini nazariy olingan qo'sh krossingover miqdoriga bo'lamiz, ya'n'i 2,5:4,0 bu nisbatan 0,62 ga teng bo'ladi. Uni **ko'nsidensiya koefitsienti** deyiladi.

Bunda yakka genlar orasidagi krossingover L–R, R–S, hamda qo'sh krossingover L–R va R–S ko'rsatilgan. **Qo'sh krossingover** deb bir vaqtning o'zida xromosomaning ikki yerida yakka krossingover sodir bo'lshiga atiladi.


Shuni aytish kerakki interferensiya hodisasi faqat xromosomalarda genlar bir-biridan uzoq masofada joylashganda ro'y beradi. Agar xromosomada genlar yaqin joylashgan bo'lsa, u holda amaliy krossingover va nazariy krossingover foizi bir-biriga to'g'ri keladi.

5. Genetik xaritalar

Birikkan holda irlsiyanuvchi bir xromosomada joylashgan genlar majmuiga **birikish guruhi** deyiladi. Organizmdagi genlarning birikish guruhi shu organizm xromosomalarining gaploid to'plamiga teng bo'ladi. Jumladan makajo'xorida (*Zea mays*) xromosomaning gaploid to'plami va birikish guruhi 10 ga, no'xatda (*Pisum sativum*) 7 ga, drozofila meva pashshasida (*Drosophila melanogaster*) 4 ga, odamda (*Homo sapiens*) 23 ga teng.


Ma'lum birikish guruhga kirgan genlarning joylashish tasviri **genetik xarita** deyiladi. Birinchi marotaba genetik xarita 1911 yili A. Stertevant tomonidan X xromosomada tuzilgan. Genetik xarita tuzish niyoyatda murakkab jarayon bo'lib, hozircha drozofila, makkajo'xori, no'xat, pomidor, sichqon, neyrospora, ichak tayoqchasi bakteriyasi, odamning genetik xaritasi tuzilgan. Genetik xarita tuzish uchun niyoyatda ko'p genlarni irlsiyanish tipi o'r ganiladi. Chunonchi, drozofila 4 ta birikish guruhidagi 500, makkajo'xorida 10 ta guruhga birikkan 400 ta genlar, uy sichqonida 15 guruhga birikkan 200 ta genlarni irlsiyanish tiplari o'r ganilgan. Genetik xaritada organizmnning xar bir birikish guruhi alohida tasvirlanadi va ularda joylashgan genlarning qisqartirilgan nomi, genlar orasidagi masofa krossingover foizlari natijalariga qarab belgilanadi. Genlar orasidagi masofani ifodalashda xromosomaning bosh qismini lokusini nol deb olinib unga nisbatan genlarning krossingover foizlari hisoblanadi. Shuning uchun genetik xaritada genlarning lokusini krossingover miqdorida ifodalashda 50, 100 va undan ortiq raqamlar uchrashi mumkin.

Yuqorida qayd etilganidek genetik xarita tuzganda belgilarni ifoda etuvchi genlarning bosh harfi yoziladi. Masalan, drozofila tanasining sariq bo'lshi *yellow* – y, qanotining rudiment bo'lshi *rudimentary* – r, *vertigial* – v qanot, *black* – b tana, *echinus* – e ko'zning ingliz tilidagi oldingi harfi bilan ifodalanadi.



34 - rasm. Drosofila xromosomasining genetik xaritasi. Raqamlar genlar orasidagi masofani va xromosomadagi oxirgi raqam ularning chalkashuv birligini ifodalaydi. I. Y – sariq (kulrang) tana, w – ko'zning oq (qizil), ec – fasetkalar orasidagi tuklar (tuklarning bo'lmasligi), cv – qanotda tomirchalardan birining bo'lmasligi (bo'lishi), v – ko'zning kinovarligi (qizilligi), m – qanotning qisqa (normalligi), s – qoramit tana (kulrang), f – vilkasimon tuk (normal), B – ko'zning cho'zinchogligi (yumaloq), car – pushtirang ko'z (qizil), bb – kalta tuk (normal). II. al – qisqa mo'ylov (normal), dp – kalta qanot (normal), d – qisqa oynq (normal), b – qora tana (kulrang), pr – to'q qizil ko'z (qizil), vg – kichik qanot (normal), c – qayrilgan qanot (to'g'ri), a – gumbazsimon qanot (to'g'ri), sp – qanotda dog' bo'lishi (bo'lmasligi). III. ru – dag'al fasetkalar (normal), se – qo'ng'ir ko'z (qizil), D – tuklar miqdorining kam bo'lishi (normal), p – pushti ko'z (qizil), ss – kalta tuk (normal), e – qora tana (kulrang), ro – dag'al fasetkalar (normal). IV. bi – bukilgan qanot (normal), ey – ko'zning bo'lmasligi (bo'lishi).

Birinchi marotaba A. Stertevant genlar xromosomada birikkan holda bo'lganda X xromosomada turli mutatsiyali drozofilalarni chatishtirib F_1 da rekombinantlashgan duragay organizmlarning miqdoriga qarab xromosomadagi genlar joylashish izchilligini, bir gen bilan qo'shni gen orasidagi masofaga qarab bilish mumkin, degan xulosaga keldi. Odamning genetik xaritasini tuzish XX asming 70-yillarida boshlangan. Keyingi yillarda yangi tadqiqot metodlarini qo'llash natijasida deyarli barcha xromosomalardagi ko'pehilik genlarning joylanishi aniqlandi.



35-rasm. Odam xromosomasining genetik xaritasi

Bakteriyalarning genetik xaritasi eukariotlarni genetik xaritasidan tubdan farq qiladi. Ma'lumki mikroorganizmlarda genlar rekombinantlashuvi bir tomonlama bo'ladi. Jumladan oshqozon tayoqchasi (*Escherichia coli*) bakteriyasida irlsiy axborot almashinuvি bakteriyalar orasidagi kon'yugatsiya davrida bir tomonlama sodir bo'ladi. Bakteriyadagi xalqasimon yagona xromosoma kon'yugatsiya davrida ma'lum bir joydan uzilib ikkinchi bakteriyaga uzatiladi. Xromosomaning uzatilgan qismining masofasi kon'yugatsiya davrinining vaqt bilan belgilanadi. Kon'yugatsiya qanchalik uzoq

davom etsa shunchalik bir xromosomadan ikkinchi xromosomaga insiy axborot, ya'ni genlar ko'p o'tadi. Shu sababli bakteriya xalqasimon xromosomasidagi genlar orasidagi masofa vaqt birlifiklari bilan ifodalananadi.

6.Xromosomalarning genetik va sitologik xaritasini taqqoslash

Genetik xaritadan farqli ravishda sitologik xaritada genlarni xromosomadagi haqiqiy o'rni uzunlik birliliklarda ifodalauadi. Birinchi gigant xromosomalarida tuzilgan. Bu xromosomalarning genetik va sitologik xaritalari taqqoslanganda genlar joylanish izchilligi bir biriga mos ekanligi aniqlandi. Amerikalik olim K.Bridjes drozofila meva pashhasining uchta autosoma va X xromosomasining genetik va sitologik xaritasidagi genlar orasidagi masofani o'lehab taqqosladi. Bunda genetik xaritada umumiy masofa 279 krossingover foizini tashkil qilsa, mikroskop ostida mkmga teng bo'ldi. K.Bridjes xromosomalarning tabiiy uzunligini (1180 mkm) genetik xaritadagi krossingover foizlaridagi uzunligiga (279 krossingover) taqsimlab krossingover koefitsienti birligi 4,2 teng ekanligini xaritada 4,2 mkm birlik mos kelar ekan. Jumladan drozofilaning X xromosomasida y va ec genlari orasidagi masofa genetik xaritada 5,5% hisoblaganimizda ular o'rtasidagi tabiiy masofa sitologik xaritada $5.5 \times 4.2 = 23$ mkm tashkil qildi.

7.Krossingoverga ta'sir etuvchi omillar

Eukariotlarning yuksak organizmlarida krossingover ham gomogametalni ham geterogametalni organizmlarda, lekin drozofila meva pashhasi va tut ipak quritining gomogamet organizmida sodir bo'ladi. Xromosomalarning ayrim qismlarini ayrboshlanishi nihoyatda murakkab fiziologik, biokimyoviy, fizik jarayondir. Gomologik xromosomada genlar ayrboshlanishi xromosomaning geteroxromatin va euxromatin qismlariga ham bog'liq. Xromosomaning geteroxromatin genlar ayrboshlanishi kam bo'ladi.

Organizm funksiyali holati ham krossingoverga ta'sir qiladi. Chunonchi drozofila hayotining 10 kunida krossingover tez takrorlanadi. Hayotning keyingi 10 yilligida esa krossingover qaytalanishi past bo'ladi. Taxmin qilinishicha organizmning fiziologik holati meyzoning har xil stadiyalari, xususan xromosomalarning spiralizatsiyasi, stadiyalar o'tishini tezligi hujayra

fiziologik holatiga ta'sir ko'rsatadi. Krossingoverga organizm genoti pidagi ayrim genlar ham ta'sir qiladi. Ular krossingover qaytalanishini ko'paytirishi yoki kamaytirishi mumkin. Xromosomadagi inversiyalar, transkalatsiyalar xromosomalar konyugatsiyalanishiga qiyinchilik tug'diradi.

Organizm genotipi ham xromosomalar chalkashuvi (krossingover)ga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi paytda makkajo'xori o'simligida krossingover yoki meyzor jarayonining ma'lum bosqichini nazorat qiladigan genlarga ega mutant o'simliklar kolleksiysi yaratilgan. Krossingoverga tashqi muhit – harorat, ozuqa va suv rejimi, biologik faol moddalarning o'simlikka ta'siri nihoyatda muhimdir. Chunonchi, G.Plu va K.Shtern tajribalarida past ($9-13^{\circ} C$) va yuqori ($30-32^{\circ} C$) harorat drozofilada krossingoverni tezlashtirish mumkinligi aniqlangan. Rentgen nurlari ham xromosomalar chalkashuvini 25 marotaba kuchaytirishi ma'lum bo'lgan.

8.Irsiyatning xromosoma nazariyasи

Jins genetikasi, jins bilan bog'liq irsiylanish, hamda belgilarning birikkan holda irsiylanishi, krossingover hodisalariga asoslanib T.Morgan o'z shogirdlari bilan hamkorlikda irsiyatning xromosoma nazariyasini yaratdi. Uning mazmuni tubandagilardan iborat:

1. Organizmning har qanday belgi-xossasi irsiyatning boshlang'ich alohidashgan birligi – gen ta'sirida rivojlanadi.
2. Har bir gen bitta fenotipik belgi-xossasini hosil qiladi.
3. Genlar xromosomada muayyan turg'un tartibda joylashadi.
4. Har bir xromosoma genlarning alohida birikish guruhibi tashkil etadi.
5. Organizmdagi genlarning birikish guruhi xromosomalarning haploid to'plamiga teng.
6. Birikkan genlar guruhi gomologik xromosomalarning kon'yugatsiyasi va krossingoveri tufayli ayrim holatlarda bir-biridan mustaqil irsiylanishi mumkin.
7. Genlar mutatsiyasi ular tasarrufidagi belgilarning o'zgarishiga olib keladi.

Savol va topshiriqlar

- 1.Birikkan holda irsiylanish hodisasi dastlab kimlar tomonidan aniqlangan?
- 2.T.Morgan o'z tajribalarida qanday obyektdan foydalangan va nima uchun?
- 3.To'liq va qisman birikish deb nimaga aytiladi?
- 4.Krossingover nima? Uning isbotlovchi tajriba tafsilotini tushuntiring.

5. Krossover organizmlar deganda nimani tushunasiz?
6. Krossingover miqdori qanday hisoblanadi?
7. Genlarni xromosomada chiziqli joylashganligini T. Morgan qanday tajriba asosida isbotladi?
8. Lokus deb nimaga aytildi?
9. Santimorganid qanday birlik?
10. Krossingoverni sitologik jihatdan isbotlagan olimlarni ayting. Ular o'tkazgan tajriba tafsilotini jadval orqali tushuntiring.
11. Qo'sh krossingoverga misollar keltiring.
12. Interferensiya va koinsidensiyaga izoh bering.
13. Genlarning birikish guruhi bilan xromosomalarning gaploid to'plami orasida qanday bog'lanish bor?
14. Genetik xaritada nimalar ifodalanadi?
15. Genetik xarita qaysi organizmlar bo'yicha tuzilgan?
16. Genetik xarita qanday tuziladi?
17. Mikroorganizmlar genetik xaritasida genlar orasidagi masofa qanday birliklarda ifodalanadi?
18. Genetik va sitologik xaritani o'zaro taqqoslang.
19. Krossingoverga ta'sir etuvchi omillarni tushuntiring.
20. Irsiyatning xromosoma nazariyasi mazmunini yoriting.

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Irsiyatning xromosoma nazariyasi qaysi olim tomonidan yaratilgan?
- A. G. Mendel
B. G. Defriz
C. T. Morgan
D. Ch. Darwin
2. Genlarning birikish guruhlari soni nima bilan belgilanadi?
- A. Xromosomalarning umumiy to'plami bilan
B. Xromosomalarning gaploid to'plami bilan
C. Krossingoverga tortilmagan xromosomalar soni bilan
D. Krossingoverga tortilgan xromosomalar soni
3. Krossover nima?
- A. Gomologik xromosomalarning chalkashuvi
B. Gomologik xromosomalarning ayrim qismlarini ayriboshishlanishi
C. Gomologik xromosomalarda genlarning ko'chib yurishi
D. Gomologik xromosomalarda genlarning lokusini o'zgarishi
4. Krossingoverni sitologik jihatdan isbotlagan olimlar

- A. Mak Klintok, Kreyton, Shtern
B. T. Morgan, Stertevant, Meller
C. Astaurov, N.P. Dubinin, Mendel
D. Mak Klintok, T. Morgan, Meller

5. Genetik xaritani tuzish prinsiplari

- A. Chatish tirish orqali genlar birikish guruhi aniqlanadi
B. Uch belgili duragaylarda genlarning xromosomadagi joytanish tartibi aniqlanadi
C. Krossingover foiziga qarab genlar orasidagi masofa belgilanadi
D. A-C

6. Interferensiya hodisasi nima?

- A. Qo'sh krossingoverning bir qismining nazariy krossingoverdan kam bo'lishi
B. Qo'sh krossingoverning bir qismini nazariy krossingoverdan ortiq bo'lishi
C. Qo'sh krossingoverning ikkinchi qismining nazariy krossingoverda ortiq bo'lishi
D. Qo'sh krossingoverning bir qismining ikkinchi qismiga, ikkinchi qismini birinchi qismiga ta'siri

7. Genlari xromosomada birikkan digeterozigota erkak drozofila retsessiv belgili urg'ochi drozofila bilan chatishirildi. F_1 da nechta fenotipik sind hosil bo'ladi?

- A. Bitta
B. Ikkita
C. Uchta
D. To'rtta

8. Genlari xromosomada birikkan digeterozigota urg'ochi drozofila retsessiv belgili erkak drozofila chatishirilsa F_2 da nechta fenotipik sind kuzatiladi?

- A. Bitta
B. Ikkita
C. Uchta
D. To'rtta

V-BOB. ALLEL BO'L MAGAN GENLARNING O'ZARO TA'SIRIDA BELGILARNING IRSIYLANISHI

9§. Allel va allel bo'l magan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanishi

Tayanch tushunchalar: Allel genlarning o'zaro ta'siri, allel bo'l magan genlarning o'zaro ta'sir turlari, komplementar, F_1 belgilarning nisbatini 9:3:3:1 va 9:3:4, 9:7, 9:6:1 sxemada bo'lishi. Epistaz, ingibitor genlar, gipostatik genlar, dominant epistaz, F_2 dagi nisbatni 13:3 bo'lishi, 12:3:1 bo'lishi, retsessiv epistaz, bir tomonlama va ikki tomonlama retsessiv epistaz, kriptomeriya.

1. Allel genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning rivojlanishi

Gen allellarining o'zaro ta'siri avvalo ikki guruhga bo'linadi.


I. Allel genlarning o'zaro ta'siri.

II. Allel bo'l magan genlarning o'zaro ta'siri.

I. Allel genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning rivojlanishi. Bir ge allellarining o'zaro ta'siri o'z navbatida: a) genning dominant allelin retsessiv alleliga ta'siri; b) ko'p tomonlama allelizm; v) kodominantlikkajratiladi.

a) Genning dominant allelini retsessiv alleliga ko'rsatgan ta'siri to'liq yoki chala (oraliq) holda bo'lishi mumkin. Monoduragay va diduragaylarda belgilarning to'liq va oraliq holda irsiylanishi ko'rildi. Mazkur hodisalarda bir gen allelining ikki xil holati: dominant va retsessiv holati bilan tanishildi. (36-rasmdagi 1-holat)

b) Gen allellari faqat dominant va retsessiv holatda emas, ko'p xil holatda bo'lishi mumkin. A genining $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_n$, B genini b₁ > b₂ > b₃ > b₄ > b_n allellarining mayjudligi bunga yorqin misoldir. (36-rasmdagi 2-holat)



36-rasm. Genlarning o'zaro ta'sir turlari sxemasi

v) Kodominantlik hodisasida allellarning odadagi dominant va retsessiv holati kuzatilmaydi. Genotipdagi har bir alleli mustaqil ravishda

faoliyk ko'rsatadi. Natijada ularning har biri o'ziga xos belginining fenoti pd a namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Bu hodisa **genetik kodominantlik** deb nomlanadi.

P. Allel bo'l magan genlarning o'zaro ta'siri. 3 xil bo'ladi. Bular komplementar, epistaz, polimeriya.

2. Allel bo'l magan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarni irsiylanishining komplementar tipi

Komplementar so'zi inglizcha *complement* – to'ldirish degan ma'noni anglatadi. Allel bo'l magan genlarning o'zaro ta'siri komplementar xilining o'ziga xos jihat shundan iboratki, F_1 duragayda chatishirishda qatnashgan ota yoki ona belgisi emas, balki yangi belgi rivojlanadi. Belgining rivojlanishiga ta'sir etuvchi allel bo'l magan genlarning qimmati bir xil emasligi tufayli F_2 avlodida belgilarning rivojlanishi turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi.

F₁ da belgilarning nisbatini 9:3:3:1 sxemada bo'lishi. Bunga misol tariqasida xoldor to'tilarni chatishirish bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijasini keltiramiz. Qush boquvchilarga tanish bo'lgan xoldor to'tilarning pati 4 xil: havorang, sariq, yashil va oq rangda bo'ladi.

Agar havorang urg'ochi to'tilar oq patli erkak to'tilar bilan chatishirilsa, F_1 dagi erkak va urg'ochi to'tilarning pati havorang bo'ladi. Mabodo F_1 dagi erkak va urg'ochi to'tilar o'zaro chatishirilsa F_1 da 75% havorang, 25% oq rangli to'tilar rivojlanadi. Bundan ikki xil xulosaga kelish mumkin.

1-xulosa. To'tilarda pat rangini ifoda qiluvchi genlar jinsiy xromosomalarda emas, balki autosomalarda joylashgan.

2-xulosa. Patning ikki xil rangda bo'lishi bitta genning ikki xil allel holatiga bog'liq.

Xuddi shunday natija sariq rangli to'tilarni oq rangli to'tilar bilan chatishirganda ham olinadi. Yuqoridaq ikki xil chatishirish tafsiloti tubandagicha yoziladi.

1) P havorang x oq

F_1 havorang x havorang



F_2 havorang : havorang : oq

2) P sariq x oq

F_1 sariq x sariq


F_2 sariq : sariq : sariq : oq

Har ikki chatishirishdan olingan natija xuddi monoduragaylardagi belgilarning to'liq irsiylanishiga o'xshash ekanligini tushunish qiyin emas. Shunga asoslanib xoldor to'tilarda pat rangi bir genning ikki xil allel holatiga bog'liq degan taxminni ilgari suramiz va uning qanchalik to'g'ri ekanligini bilish uchun yuqorida ikki xil chatishirishda qatnashgan to'tilarning genotipi yozib chiqamiz.




Bu ikki chatishirish natijasida sariq patli to'tilarning genotipi aniqlash qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari agar ikki xil chatishirishda dominant bo'lgan belgi ya'ni havorang va sariq patli xoldor to'tilarning erkak va urg'ochisini o'zaro chatishirilsa, u holda F_1 avloddagi erkak va urg'ochi to'tilarning pat rangi yashil bo'ladi. Yashil patli urg'ochi va erkak to'tilarni o'zaro chatishirilsa F_2 avlodida 9/16 yashil, 3/16 havorang patli, 3/16 sariq patli, 1/16 oq patli to'tilar paydo bo'ladi. Bunday natija ilgari qayd qilinganidek, diduragaylarda belgilarning to'liq irsiylanishiha fenotip bo'yicha namoyon bo'lgan edi. Lekin unda ota-onha o'zaro ikki belgisi bilan farqlangan edi. Vaholanki, xoldor to'tilarda esa ota-onha to'tilar bir belgisi – pat rangi bilan farqlanadilar xolos. Shunga ko'ra pat rangining rivoji ikki xil allel bo'lmagan genga bog'liq degan xulosaga kelamiz.

U holda havorang patli to'tilarning genotipi $AAbb$, sariq patli to'tilar genotipi $aaBB$, oq patlilarники $aabb$ va yashil patlilarники $AaBb$ holatda bo'ladi deb taxmin qilamiz. Taxminimiz qanchalik to'g'ri ekanligini to'tilarni chatishirib, birinchi va ikkinchi avlod duragaylar genotipini va fenotipi aniqlashimiz zarur. (37-rasm)



37 - rasm. To'tilarda pat rangining komplementar holda irsiylanishi. A – havorang pat. B – sariq pat. a va b oq pat.



♀	AB	Ab	aB	ab
AB	ya. A ABB	ya. AABb	ya. AaBB	ya. AaBb
Ab	ya. AABb	h. AAbb	ya. AaBb	h. Aabb
aB	ya. AaBB	ya. AaBb	s. aaBB	s. aaBb
ab	ya. AaBb	h. Aabb	s. aaBb	oq. aabb

Izoh: ya. – yashil; h. – havorang; s. – sariq;

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar to'tilarni genotiplari to'g'risida ilgari surgan taxminimiz to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Demak, xoldor to'tilarning jinsidan qat'iy nazar A va B gen allellari gomozigota yoki geterozigota holatda pat rangining yashil, A-bb allellari havorang, aaB-allellari sariq, retsessiv aabb genlar oq rang bo'lishini ta'minlaydi.

1. AABB – 1
 1. AAbb – 2
 2. AaBB – 2
 3. AaBb – 4
 4. AAbb – 1
 5. Aabb – 2
 6. aaBB – 1
 7. aaBb – 2
 8. aabb – 1
- yashil patli
- havorang patli
- sariq patli
- oq patli

Shunday qilib, xoldor to'tilarning pat rangi belgisini irsiylanishi misolida biz:

- 1) ota-onha to'tilarda yo'q bo'lgan yashil va oq pat belgilarini duragay to'tilarda rivojlanishi;

2) to'li pat rangi birinchi tajribadagi kabi havorang, sariq va oq patli to'tilarni chatishirgan holatdagi bitta geni allellari emas, balki ikki allel bo'lmanan gen bilan bog'liq ekanligining shohidi bo'lamiz.

Xuddi shunday tipdagi irlisylanishni tovuqlarning gulsimon tojli zoj bilan no'xatsimon tojli zotini yoki drozofila meva pashshasida ko'zlar qo'ng'ir va och qizil rangli formalarini chatishirganda ham ko'rsish mumkin.


F₂ da belgilarning nisbatini 9:7 sxemada bo'lishi. Komplementar irlisylanishning bu xilida ham dominant allel bo'lmanan genlар alohida mustaqil ravishda belgiga ta'sir ko'rsata olmaydilar. Chunonchi, XX asrning boshida **Betson** va **Pennetlar** ipaksimon oq patli tovuqlarning xo'rozlarning pati rangli bo'lgan. Ular o'zaro chatishirganda F₁ tovuq va va xo'rozlarning 9/16 pati rangli, 7/16 oq patli bo'lgan. Shunga o'xshash natija hidli no'xat o'simligining fenotipi jihatdan o'xshash oq gulli lekin genotipi bo'yicha farq qiluvchi villardan chaushtirganda ham olingan. Buni tubandagicha izollash mumkin:

Fen.	oq.		oq.	
P _{gen.}	AAbb	x	aaBB	
gam	Ab		aB	
Fen.	t.q.		t.q.	
G _{1gen.}	AaBb	x	AaBb	
G ₂				

	AB	Ab	aB	ab
AB	t.q. AABB	t.q. AABb	t.q. AaBB	t.q. AaBb
Ab	t.q. AABb	oq. AAbb	t.q. AaBb	oq. Aabb
aB	t.q. AaBB	t.q. AaBb	oq. aaBB	oq. aaBb
ab	t.q. AaBb	oq. Aabb	oq. aaBb	oq. aabb

Izoh: t. q. - to'q qizil.

F₂ da belgilarning nisbatini 9:3:4 sxemada bo'lishi. Ayrim holatlarda chatishirishda qatnashayotgan individlarning bir dominant allel geni faol bo'lib belgiga ta'sir ko'rsatishi, ikkinchi allel bo'lmanan dominant gen esa gomozigota holatdagi retsessiv allel bilan birga belgiga ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Bunga misol tariqasida sichqonlarda yung rangini irlisylanishini olamiz. Sichqonlar yungi oq, qora va aguti holatda bo'ladi. Aguti rangli sichqonlarda har bir yung tolasi bo'ylab sariq rangli halqlar ko'zga tashlanadi. Yung asosi va uchida esa qora pigment bo'ladi. Yung tolalarida pigmentlarning bunday zonar bo'lishi quyonlarda ham kuzatiladi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha aguti sichqonlarda rangni bo'lishi bir genga, pigmentni yung tolasi bo'ylab taqsimlanishi boshqa allel bo'lmanan genga bog'liq. Qora yungli sichqonlarda pigment zonar tipda taqsimlanishi uchramaydi. Pigment tola uzunligi bo'yicha bir xil taqsimlangan bo'ladi. Oq sichqonlar yungida esa pigment bo'lmaydi.




38 - rasm. Sichqonlarda yung rangining genlarning o'zaro ta'siri tufayli irlisylanish tiplari. A - yungning qora rangi; a - albinos; B - aguti; bb - qora.

Qora yungli sichqonlar yungi oq rangdagi sichqonlar bilan chatishirilganda F₁ avlodda sichqonlarning yungi aguti bo'ladi. F₁ aguti sichqonlarning erkak va urg'ochi formalari o'zaro chatishirilganda F₂ sichqonlarning 9/16 yungi aguti tipda, 3/16 sichqonlarning yungi qora, 4/16 sichqonlar yungi oq rangda bo'ladi. Chatishirish uchun olingan sichqonlar qora yunglisining genotipi AAbb, oq yunglisiniki aaBB. F₁ avlod duragaylarining genotipi AaBb. F₁ avlod erkak va urg'ochi aguti

sichqonlarni chatishirishdan olingen F_2 avlod sichqonlarning genotipi A-B- genlari bo'lgan taqdirda ular yungi aguti tipida ($9/16$), qora ($3/16$) sichqonlarning genotipi A-bb, oq sichqonlarning $4/16$ genotipi esa aab. yoki aabb holatda bo'ladi.

F_2 da belgilarning nisbatini 9:6:1 sxemada bo'lishi. Ba'zi holatlarda komplementar genlar mustaqil ravishda qo'shimcha genlarsiz u yoki bu belgini hosil qilishi mumkin. Masalan, qovoqlarda (*Sucurbita*) meva shakli yumaloq, gardishsimon va uzunchoq ko'rinishda bo'ladi. Har bir dominant allel bo'lmagan gen retsessiv allel gensiz yumaloq shakldagi qovoqlarni rivojlanadir. Genotipi har xil bo'lgan yumaloq qovoqlar o'zaro chatishirilsa, dominant komplementar genlar G-D- ta'sirida F_2 da gardishsimon qovoqlar hosil bo'ladi. F_2 duragay qovoq o'zaro chatishirilsa F_2 da $9/16$ gardishsimon, $6/16$ yumaloq, $1/16$ uzunchoq shakldagi mevalar hosil bo'ladi.



39 - rasm. Komplementar irlsylanishda dominant allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sirini va retsessiv allel bo'lmagan genlarning gomozigora holatda bo'lganda yangi belgilarni hosil qilishi.

Bunda G-D- genlar o'zaro ta'siri natijasida gardishsimon, G-dd, ggD- genotipli qovoqlar yumaloq, ggdd genotipli qovoqlar uzunchoq mevaga ega bo'ladir.

Binobarin, allel bo'lmagan genlarning o'zaro komplementar ta'sirida birinchidan F_1 , F_2 avlodda ota-onal individlarda kuzatilmagan yangi

belgilarni rivojlanadi. Ikkinchidan allel bo'lmagan genlarning dominant va retsessiv allellarini o'zaro ta'sir xiliga qarab fenotipik sinflar F_2 da tubandagicha xilma-xillik beradi:

Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sir xili	F_2 dagi fenotipik sinflar			
	1	2	3	4
A-B	9	9	9	9
A-bb	3	3	7	6
aaB-	3	4		
aabb	1			1

3. Epistaz. Uning dominant va retsessiv tipi


Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sirini yana bir tipi epistazdir. Epistazda bir gen alleli ikkinchi allel bo'lmagan genning fenotipik namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Epistaz genlarni o'zaro ta'sir turi belgilarning to'liq dominantligiga o'xshash sodir bo'ladi. Lekin dominantlikda bir genning ikki alleli, bir-birini ustidan masalan, A>a ustidan dominantlik qilsa, epistazda esa allel bo'lmagan ya'ni A>B yoki B>A, a>e yoki b>A ta'siri kuzatiladi. Ustunlik qiluvchi genlar **epistatik genlar** nomini olgan. Ular **ingibitor** yoki **supressorlar** deb ataladi hamda I va S harflari bilan ifoda qilinadi. «Bo'g'ilgan» genlar **gipostatik genlar** deb ataladi.

Epistaz genlarni o'zaro ta'siri ikki turga bo'linadi:

1. Dominant epistaz;
2. Retsessiv epistaz.

Dominant epistazda ingibitor genlar sifatida dominant genlar qatnashadi. Dominant epistazda F_2 da belgilarning fenotip bo'yicha 13:3 va 12:3:1 nisbatda ajralishi kuzatiladi.

F_2 da belgilarning nisbatini 13:3 sxemada bo'lishi. Misol qilib tovuq va xo'rozlardagi pat rangini olish mumkin. Tovuqning *Leggorn* zotida patlar oq rangdadir. Ularni genotipi CCh. Bunda C geni belgini namoyon qiladi, I dominant geni bo'lsa, C geni ta'sirini «bo'g'adi». Natijada C genini fenotipda namoyon bo'lishi ro'y bermaydi. *Viandot* tovuq zotida ham patlar oq rangda bo'lib, genotipi iicc. *Leggorn* tovuqlarini *Viandot* xo'rozlari bilan chatishirishdan olingen F_1 avlodida tovuq va xo'roz oq rangda bo'ladi. F_2 avlodidagi tovuq va xo'rozlar o'zaro chatishirishda F_2 duragay avlodida 13/16 oq patli, 3/16 rangli patli tovuq va xo'rozlar rivojlanadi. Buni shunday izohlash kerak: (40-rasm)




40 - rasm. Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sirida tovuqlarda pat rangining irsiylanishi (epistaz). I - rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatadi, i - rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatmaydi, C - rang hosil qiluvchi gen, c - rang hosil qilmaydigan gen.

	Leggorn	Viandot
Fen.	oq	oq
R _{Gen}	CCII	x ccii
gam	CI	ci
Fen.	oq	oq
F ₁ _{Gen}	CcIi	x Ccii
F ₂		

	CI	Ci	cl	ci
CI	oq CCII	oq CCiI	oq CcII	oq CcIi
Ci	oq CCiI	rangli CCii	oq CcII	rangli Ccii
cl	oq CcII	oq CcIi	oq ccII	oq ccIi
ci	oq CcIi	rangli Ccii	oq CcII	oq Ccii

Mazkur misolda bir belgiga ikkita gen ya'ni I va C genlar ta'sir ko'rsatadi. Dominant ingibitor bir vaqtning o'zida belgiga ta'sir etuvchi ham dominant ham retsessiv genlarning faoliyatini to'xtatishi mumkin. Demak, mazkur misolda tovuq duragaylari genotipida I bo'lgan taqdirda C geni faoliyati to'xtagini sababli pat rangli bo'lmaydi, i retsessiv geni gomozigota holatda bo'lgandagina C geni patda rang hosil qiladi. Shunday qilib, C geni belgiga bevosita, I geni esa bilvosita, ya'ni C geni faoliyatini bo'g'ish orqali ta'sir ko'rsatadi.


F₂ da belgilarning nisbatini 12:3:1 sxemada bo'lishi. Agar chatishirish uchun tanlangan ota-onalarni formalar ham fenotip, ham genotip jihatidan farq qilsalar, u holda F₂ da fenotipler bo'yicha 12:3:1 nisbatda xilmashilik hosil bo'ladi. Misol uchun yung rangi oq va qo'ng'ir, urg'ochi va erkak itlarning chatishishidagi birinchi va ikkinchi avlodini otsak. Birinchi avlodda erkak va urg'ochi itlar yungi oq rangda bo'ladi. Mabodo F₁ dagi erkak va urg'ochi itlar o'zaro chatishirilsa, u holda F₂ dagi itlarning 12/16 oq yungli, 3/16 qora yungli, 1/16 qo'ng'ir yungli bo'ladi. Bu misolda dominant ingibitor gen bir vaqtning o'zida yungdagagi qora rangni hosil etuvchi (A), hamda qo'ng'ir rangni hosil qiluvchi (a) gen ta'sirini bo'g'adi (41-rasm).



41 - rasm. Itlarda yung rangining irsiylanishi (epistaz). A - qora, a - qo'ng'irrang, I - rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatuvchi, i - rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatmaydigan gen.

Retsessiv epistazda retsessiv genlar gomozigota holatda belgini bevosita rivojlantiruvchi dominant genlar faoliyatini bo'g'adi. Retsessiv epistaz bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'ladi. Bir tomonlama

epistazda chatishtirishda qatnashgan bir organizmning retsessiv ingibitorli genlari gomozigota holatda boshqa allel bo'lmagan dominant gen ta'siri o'xtatadi. Chunonchi genotip jihatdan farqlanuvchi fenotipi o'zaro o'xshash oq rangli piyozboshlarni chatishtirsak F_1 da oq piyozbosh, ularning o'zaro chatishishidan F_2 da $13/16$ oq, $3/16$ rangli piyozbosh hosil bo'ladi (42-rasm).



42 - rasm. Piyozboshlarda kriptomeriya tufayli belgining irsiylanishi.

Retsessiv genlar gomozigota holatda chatishtirishda qatnashayotgan ham changchi ham urug'chi organizmdagi allel bo'lmagan dominant gen faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Bu hodisa **ikki tomonloma retsessiv epistaz** deb nomlanadi. Komplementar irsiylanishdagi ko'rib chiqilgan ikkita genotipi har xil, lekin fenotip jihatdan o'xshash yumaloq misolda yumaloq qovoqning bir xilida genotip $AAbb$, ikkinchisida esa $aaBB$ edi. Ularni chatishtirish natijasida hosil bo'lgan birinchi avlodda qovoq mevasi gardishsimon shakldadir. Binobarin A- geni bb geni, B-geni aa geni bilan genotipda birgalikda bo'lgan taqdirda gomozigota retsessiv genlarning dominant genlarga ta'siri tufayli yumaloq mevaga ega qovoqlari rivojlanadi. Retsessiv genlar geterozigota holatda bo'lganda mevasi rivojlanadi.

Retsessiv epistazga tabiatda uchraydigan ba'zi bir g'ayri tabiiy hodisalarni ham misol sifatida olish mumkin. Birinchi misol odam terisining qon rangi P_1, P_2, P_3, P_4 genlar faoliyati tufayli rivojlanishi. Lekin

bu poligenlar genotipda retsessiv "aa" genlar gomozigota holatda bo'lganda fenotip o'z ta'sirini namoyon eta olmaydi. Chunki aa genlar ingibitorlik rolini o'taydilar. Ikkinchisi misol. Odamlarda 4 xil qon guruhi bo'lib, uning antigenlar OO-I, AA AO-II, BB BO-III, AB-IV hisoblanadi. Lekin A-B dominant genlar o'z faoliyatini genotipda hh ingibitor genlar bo'lmaganada ochiq bajaradilar. Aks holda hh gomozigota holatda yuqoridagi A-B genlar faoliyatini bo'g'adilar, oqibatda II, III, IV qon guruhlari o'rniiga odamlarda birinchi qon guruhi rivojlanadi. Mazkur hodisani Hh ingibitorli IV qon guruhiga ega odamlar nikohidan tug'ilgan farzandlar misolda ko'rish mumkin.

8-jadval

$\Sigma \backslash \Sigma$	HIA	hIA	HIB	hIB
HIA	I HHIA ^A	II HhIA ^A	IV HHIB ^B	IV HhIB ^B
hIA	II HhIA ^A	I hhIA ^A	IV HhIB ^B	I hhIB ^B
HIB	IV HHIB ^B	IV HhIB ^B	III HHIB ^B	III HhIB ^B
hIB	IV HhIB ^B	I hhIB ^B	III HhIB ^B	I hhIB ^B

Jadvaldan ko'rinish turibdiki, $I^{A/A}$, $I^{B/B}$, $I^{A/B}$ antigenlarga ega farzandlarda ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qon guruhi emas, balki retsessiv hh genlarning gomozigot holati tufayli birinchi qon guruhi rivojlangan.

4. Kriptometriya

Kriptometriyaga misol qilib piyozboshning sariq va oq bo'lgan navlarini chatishtirishdagi natijani olish mumkin. Piyozboshning retsessiv c geni piyozboshning oq rangda bo'lishini ifodalaydi. Uning dominanti esa C geni sariq rangni hosil qiladi. R va r allellari esa C geni bilan birlashib yo piyozboshning sariq, yo piyozboshning qizil rangda bo'lishini ta'minlaydi. Sariq piyozboshli piyoz bilan oq piyozboshli piyoz o'simligi chatishtirilsa

F_1 da qizil piyozboshli o'simliklar olinadi. Ular o'zaro chat 9/16 qizil piyozboshli (C-R), 3/16 sariq piyozboshli (C-rr) va 4/16 oq piyozboshli (ccR-) o'simliklar hosil bo'ladi. Buni tubandagicha izohlang mumkin.

Fen. $R_{\text{Gen.}}$	cariq CCrr	x	oq CCRR
gam	Cr		
Fen. $F_{1 \text{ Gen.}}$	qizil CCRr	x	qizil CCRr

Σ	CR	Cr	cR	cr
CR	qizil CCRR	qizil CCRr	qizil CcRR	qizil CcRr
Cr	qizil CCRr	sariq CCrr	qizil CcRr	sariq Cerr
cR	qizil CcRR	qizil CcRr	oq ccRR	oq ccRr
cr	qizil CcRr	sariq Cerr	oq ccRr	oq ccrr

Savol va topshiriqlar

- Allel genlarning o'zaro ta'sir xillarini tushuntiring.
- Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sir xillariga nimalar kiradi?
- Komplementar atamasining lug'aviy ma'nosini yoriting.
- Belgilarning komplementar usulda irsiylanishi deganda nimani tushunasz?
- Komplementar irsiylanishning F_2 da fenotip bo'yicha xilma-xillik 9:3:3:1 nisbatda bo'lishini misollar bilan tushuntiring. Ularni diduragaylardagi belgilarning to'liq irsiylanishi bilan taqqoslang, o'xshashlik va farqini aniqlang.
- F_2 da belgilarning 9:6:1 nisbatda bo'lishini misollar bilan tushuntiring.
- F_2 da belgilarning 9:3:4 nisbatda bo'lishiga oid misollar keltiring.
- F_2 da belgilarning 9:7 nisbatda bo'lishini izohlang.

- Allel bo'lmagan genlarning epistaz ta'sirini o'ziga xos tomonlarini tushuntiring.
- Epistatik, gipostatik genlarga ta'rif bering.
- Dominant va retsessiv epistazga misol keltiring.
- Kriptometriyanima? Piyoz boshli o'simlik misolida tushuntiring.
- Itlarda yung rangining irsiylanishini rasmga qarab izohlang.
- Itlarda yung rangining irsiylanishini rasmga qarab izohlang.
- Allel bo'lmagan genlarni o'zaro ta'siri necha xil bo'ladi?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

- Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'siri qanday tiplarga bo'linadi?
 - Komplementar, modifikator, epistaz
 - Polimeriya, allelizm, komplementar
 - Komplementar, epistaz, kriptomeriya, polimeriya
 - Kodominantlik, modifikator, polimeriya.
- Komplementar irsiylanishni F_2 da belgilarning xilma-xilligi
 - 9:3:3:1, 9:7, 9:6:1, 9:3:4
 - 9:3:3:1, 12:3:1, 9:6:1, 15:1
 - 13:3, 9:3:3:1, 9:7, 12:3:1
 - 9:7, 15:1, 13:3, 9:3:3:1
- Komplementar irsiylanishning o'ziga xos jihatlari
 - F_1 va F_2 ota-onasi o'xshash formalar rivojlanadi
 - F_1 va F_2 yangi belgililar hosil bo'ladi
 - F_1 ota-onasi o'xshash belgililar hosil bo'ladi
 - F_2 yangi belgililar hosil bo'ladi
- Allel bo'lmagan genlarning epistaz ta'sirida F_2 da belgilarning nisbati qanday bo'ladi?
 - 15:1, 13:3
 - 12:3:1, 9:3:4
 - 13:3, 12:3:1
 - 15:1, 9:6:1
- Allel bo'lmagan genlarning epistaz ta'sirida belgilarning F_2 dagi nisbati qanday bo'ladi?
 - 15:1, 9:3:3:1
 - 9:7, 13:3
 - 15:1, 1:4:6:4:1
 - 13:1, 9:3:3:1
- Gomozigota havo rang patli va sariq patli to'tilarni chatishtirish

natijsida hosil bo'lgan F_1 duragaylarini o'zaro chatishirilsa F_2 da genotip bo'yicha qanday xilma-xillik vujudga keladi?

- A. 1:2:2:4:1:2:1:2:1
- B. 1:4:6:4:1
- C. 9:3:3:1
- D. 12:3:1

7. Sichqonlar yungi pigment ta'sirida uch xil bo'ladi. Yungida pigmentlarni bo'lmasligi qaysi rangni hosil bo'tishiga olib keladi?

- A. Yo'l-yo'l
- B. Aguti
- C. Qora
- D. Oq

8. Tajribada $CcII$ genotipli tovuq $ccII$ xo'roz bilan chatishirildi. F_1 da qanday fenotipik xilma-xillik vujudga kelishini aniqlang.

- A. 50% oq, 50% qora
- B. 75% oq, 25% qora
- C. 25% oq, 75% qora
- D. Hammasi oq

10. § Polimeriya, Pleyotropiya va modifikator genlar
Tayanch tushunchalar: Polimeriya, kumulyativ polimeriya, nokomulyativ polimeriya, transgressiya, pleyotropiya, modifikator genlar ta'siri, ekspressivlik, penetrantlik.


1. Polimeriya va uning xillari

Allel bo'Imagan genlarning polimeriya tipi dastlab 1909-yili shved genetigi Nilson Ele tomonidan aniqlangan. Polimeriya irsiylanishning o'ziga xos jihat shundan iboratki, allel bo'Imagan dominant genlarning o'zaro ta'siri bir yo'nalishli bo'ladi. Allel bo'Imagan genlarning polimer irsiylanishi ikkiga: **kumulyativ** va **nokumulyativ** polimeriya xilga ajraladi.

Kumulyativ polimeriya ko'proq miqdor belgilarning irsiylanishida namoyon bo'ladi. G'o'za o'simligida tupdag'i ko'saklar soni, chigitining og'irtigi, poyaning uzunligi polimer irsiylanishga misoldir. Polimeriyada allel bo'Imagan genlar bir yo'nalishda ta'sir ko'rsatganligi uchun ularni bir xil harflar bilan belgilanadi va ularni allel bo'Imagan genlar indeksida ko'rsatiladi. Masalan $A_1, A_2 \dots a_1, a_2$ bu misolda A_1 va A_2 genlari bir-biriga allel bo'Imagan genlardir.

Nilson Ele tajribalarida bug'doy doni po'stlog'ining qizil rangi bitta, ikkita, uchta allel bo'Imagan genlar ta'sirida rivojlanishi ma'lum bo'lgan.

Agar bitta dominant gen bug'doy doni po'stlog'iga ta'sir ko'rsatsa F_2 da 3:1, ikkita dominant allel bo'Imagan gen ta'sir etsa 15:1, uchta dominant allel bo'Imagan gen ta'sir etsa 63:1 nisbatda qizil donli va oq donli formalar kuzatiladi. Bug'doy doni po'stlog'ining qizil rangi 2 ta allel bo'Imagan dominant genlarga bog'liq deb faraz qilsak, u holda qizil donli bug'doy bilan oq donli bug'doy chatishirilganda quyidagi natija olinadi.



43 - rasm. Bug'doy donining rangini irsiylanishi (kumulyativ polimeriya).

Agar genotipda $A_1A_1A_2A_2$ bo'lsa don qizil, uchta dominant gen bo'lsa och qizil, ikkita dominant gen bo'lsa pushti, bitta dominant gen bo'lsa och pushti, genotipda dominant gen bo'Imasa $a_1a_1a_2a_2$ bug'doy oq rangda bo'ladi. Genotipda dominant genlar qanchalik soni ko'p bo'lsa, rang shunchalik ko'proq namoyon bo'ladi, ya'ni dominant genlar soni ko'paygan

sari ularni belgini namoyon bo'lishiga ulushlari qo'shilib boradi.

Bug'doy doni po'stlog'ining rangini F_2 da namoyon bo'lishi fenotipik jihatdan 1:4:6:4:1 sxemada bo'ladi. Agar belgining rivojlanishi uch xil dominant allel bo'lmagan genlarning ta'sirida amalga oshsa F_2 da fenotip 1:6:15:20:15:6:1 sxemada xilma-xillik beradi.

Kumulyativ polimeriyada **transgressiya** hodisasi kuzatilishi mumkin. Transgressiya deyilganda ota-onadagi belgiga nisbatan duragaylarda biror bir belgini o'ta rivojlanib yoki susayib ketishi tushuniladi. Masalan:

$$\begin{array}{c} R \quad A_1A_1a_1a_2A_2A_3 \\ F_1 \quad A_1a_1A_2a_2A_3a_3 \\ F_2 \quad A_1A_2A_3A_4A_5 \end{array} \times \quad a_1a_2A_2A_3a_3$$

Ijobiy transgressiya Salbiy transgressiya


F_2 dagi hosil bo'lgan xilma-xil formalarni ichida barcha dominant genli $A_1A_1A_2A_2A_3A_4$ formada ijobjiy transgressiya, barcha retsessiv genli $a_1a_2a_3a_4a_5$ formada salbiy transgressiya namoyon bo'ladi.

Nokumulyativ polimeriyada esa bunday holat kuzatilmaydi. Genotipdagagi dominant allel bo'lmagan genlarning soni nechta bo'lishiga qaramay, ular bir fenotipli va F_2 da ikki just allel bo'lmagan dominant genlar belgini keltirib chiqarganda xilma-xillik 15:1, uchta allel bo'lmagan dominant genlar ta'sirida belgining rivojlanishida 63:1 sxemada bo'ladi. Masalan, achambiti (*Capsella bursa pastoris*) o'simligida qo'zoq meva uchburchak va tuxumsimon shaklda uchraydi. Agar qo'zoq mevasi achambiti chatishitirlisa, F_1 avlodida qo'zoq mevasining uchburchak shakldagi dominantlik qiladi. F_1 duragaylari o'zaro chatishitirlgan taqdirda F_2 duragay 15/16 qo'zoq mevasi uchburchak, 1/16 esa tuxumsimon shaklda bo'ladi. Binobarin belgi ikki just allel bo'lmagan genlar ta'sirida rivojlansa, nokumulyativ polimeriya F_2 avlodida ikkita fenotipik sindf hosil bo'ladi.

2. Pleiotropiya

Pleyotropiya allel bo'lmagan genlarni o'zaro ta'sirining teskari hodisasidir. Agar allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sirida ularning ikki, uchta bir belgining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatsa, **pleiotropiyada** aksincha, bir gen bir vaqtning o'zida bir necha belgining rivojlanishini ta'minlaydi. Masalan, sherozi qo'y zotida A dominant geni yungning kulrang, a geni esa qora rangda bo'lishiga ta'sir qiladi. A geni gomozigota, AA holatda bo'lsa qo'zichoqlar o'lik tug'iladi. Binobarin, AA geni qo'zichoqlar yungi kulrang bo'lishini ta'minlab, ayni vaqtida ularning yashab qolishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, boshqacha aytganda letallik funksiyasini ham bajaradi. Boshqa misol. Sichqonlarda yungning sariq rangini

A^y dominant gen, qora rangini a retsessiv geni belgilaydi. Agar dominant gen genotipda gomozigota holatida A^yA^y bo'lsa, bunda sichqonning xayotchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatib o'limga olib keladi.



44 - rasm. Sichqonlarda yungning sariq rangini ifoda qiluvchi genning gomozigota holatda letal xususiyatiga ega ekanligiga oid.

3. Modifikator genlar ta'siri

Allel bo'lmagan genlarni o'zaro ta'siriga oid misollarda bir belgini rivojlanishi ba'zan bitta, ba'zan esa ikki yoki uchta gen faoliyati tufayli amalga oshishini ko'rdik. Shuni qayd etish kerakki organizm genotipi amalga oshishini ko'rsatadi. Binobarin belgi ikki just allel bo'lmagan genlar ta'siridan tashqari ushbu genlarning faoliyatini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi genlar ham borligi aniqlangan. Bunday genlarni **modifikator genlar** deb nomlanadi.



45 - rasm. Modifikator genlar ta'sirida qoramollarda qora va oq yungning har xil miqdorda irsylanishi.

Chunonchi, shoxli qoramol yungi ba'zan ola bula rangda bo'ladi. Lek, qora dog'lar ba'zi qoramollarda kattaroq, ba'zilarida esa kichikro, ko'tinishda bo'ladi. Bu modifikator genlarning qora rangini hosil etuvchi genlar faoliyatiga ko'rsatgan ta'siri natijasidir. Agar qora dog'lar kattaroq, bo'lsa modifikator genlar yungning qora rangini ifodalovchi genlar faoliyatini kuchaytirgan, agar qora dog'lar kichikroq bo'lsa, modifikator genlar qora rangga ta'sir etuvchi genlar faoliyatini susaytirgan holda bo'ladi.

4. Ekspressivlik va penetrantlik

Bir genning belgiga har xil darajada ko'rsatgan ta'sirini olimlardan N.V.Timofeev-Resovskiy ekspressivlik deb nomlashni tavsya etdi. Ma'lumki hasharotlarning har bir ko'zi mayda ko'zchalar – fasetkalardan tashkij topgan. Drozofilada mutant gen ta'sirida ko'zdagi fasetkalar soni mutatsiyaga uchramagan mutant drozofilaga qaraganda ba'zi drozofilalarda ikki hissa kam bo'lsa, ba'zilarida tamomila bo'lmaydi. Drozofila meva pashshasida *vg* (*vestigial*) geni qanotning nihoyatda kichik bo'lishiga sababchidir. Mazkur gen bo'yicha gomozigota drozofilalarda ushbu belgi past haroratda aniq ko'zga tashlanadi. Harorat o'zgarishi bilan qanot kichikligi turli drozofilalarda turlicha namoyon bo'ladi. Demak ekspressiyonost – bu belgining har xil darajada fenotipda namoyon bo'lishidir.

Penetrantlik deganda bir xil genotipga ega organizmlarda gen ta'sirida ayrim belgining ba'zi organizmlarda rivojlanishi, boshqa organizmlarda rivojlanmay qolishi tushuniladi. Penetrantlik bir xil genotipdagi organizmlarning necha foizida tekshirilayotgan gen ta'sirida belgi namoyon bo'iganlik foizi bilan aniqlanadi. Tovuqlarda retsessiv mutatsiya-titplash titplash sezilarsiz, aksincha boshqalarida kuchli namoyon bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bu belgi ayrim tovuqlarda uchrab, boshqalarida ko'zga tashlanmaydi. Demak titplash mutatsiyaga uchragan tovuqlarda ham penetrantlik ham ekspressivlik kuzatiladi.

Savol va topshiriqlar

1. Belgilarning polimer irlsiyanihini izohlang.
2. Belgilarning polimeriya irlsiyanihini qanday xillarini bilasiz?
3. Kumulyativ polimeriya F_2 avlodida nisbat qanday sxemada namoyon bo'ladi? Nokumulyativ polimeriyadachi?
4. Transgressiya hodisasini tushuntiring.

5. Pleyotropiyani izohlang va misollar bilan tushuntiring.
6. Modifikator genlar boshqa genlardan nimasi bilan farqlanadi?
7. Ekspressivlik va penetrantlik hodisasini misollar orqali izoxlang.

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Allel bo'lmagan genlarning polimer ta'sirida belgilarning F_2 dagi nisbati qanday bo'ladi?

- A. 15:1 9:3:3:1
B. 1:4:6:4:1 13:3
S. 15:1 1:4:6:4:1
D. 13:1 9:3:3:1

2. Allel bo'lmagan genlarning polimer ta'sirini o'ziga xos jihatlari.

- A. Bir gen ikkinchi allel bo'lmagan genlar belgiga bir yo'nalishda ta'sir qiladi
B. Allel va allel bo'lmagan genlar belgiga bir yo'nalishda ta'sir qiladi
S. Allel va allel bo'lmagan genlar bir-biriga ta'sir etib yangi belgini hosil qiladi
D. Mustaqil allel va allel bo'lmagan genlar har-xil yo'nalishida belgiga ta'sir qiladi

3. Modifikator genlar bu:

- A. Bir dominant genning ikkinchi allel bo'lmagan dominant genda ustunlik qilishi
B. Genotipda allel bo'lmagan genlarni birgalikda yangi belgining rivojlanishiga ta'siri
S. Allel va allel bo'lmagan genlarning bir yo'nalishdagi ta'siri
D. Belgiga ta'sir etuvchi asosiy genlar faoliyatini kuchaytiruvchi yoki susaytitiruvchi genlar

4. Ikkita allel bo'lmagan dominant gen ta'siridagi Kumulyativ polimeriyaning F_2 salu fenotip bo'yicha nisbati qanday bo'ladi?

- A. 1:4:6:4:1
B. 1:6:15:20:15:6:1
S. 15:1
D. 63:1

5. Uchta dominant allel bo'lmagan genlar ta'sirida polimeriyaning F_2 avlodida belgining rivojlanishi qanday nisbatda bo'ladi?

- A. 15:1
B. 63:1
S. 36:6

6. R geni dominant bo'lib, bug'doy donida qizil rangni, r geni retsessiv bo'lib oq rangni yuzaga chiqaradi. Quyida berilgan genotiplardan och pushi rangli bug'doy donini ko'rsating.

- A. R,r,R₂R₂, r,r,R₂R₂
- B. R,r,R₂r₂, R,R,r₂r₂
- C. r,r,R₂R₂, R,r,r₂r₂
- D. R,R,R₂R₂, R,R,R₂r₂

7. Penetrantlik bu ...

- A. Dominant genning yuzaga chiqish chastotasi.
- B. Genning fenotipik nomoyon bo'lishi.
- C. Retsessiv genning yuzaga chiqish chastotasi.
- D. Genlarning tarqalish darajasi

8. Ekspresivlik bu ...

- A. Genning irlsiyanish darajasi.
- B. Bir genning belgiga har xil darajada ko'rsatgan ta'siri.
- C. Ikki, uch allel bo'lmagan gen bir belgining rivojlanishga ko'rsatgan ta'siri.
- D. Organizmdagi genlarning faoliyatini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi genlar yig'indisi.

VI-BOB. SITOPLAZMATIK IRSIYLANISH

11§. Sitoplazmatik irlsiyanish

Tayanch tushunchalar: Sitoplazmatik irlsiyanish haqida umumiyl tushuncha, plastida bilan bog'liq irlsiyanish, mitokondriyalar bilan bog'liq irlsiyanish, sitoplazmatik predeterminatsiya, sitoplazmatik erkak pushtsizligi, hujayrada mayda zarrachalar va simbiontlarning irlsiyanishi, sitoplazmatik irlsiyanishning molekular asoslari.

1. Sitoplazmatik irlsiyanish haqida umumiyl tushuncha

Xromosomalardan tashqarida ro'y beradigan irlsiyanishi nemis botaniklari K. Korrens va E. Baurlar tomonidan 1908-yilda ixtiro qilindi. Dastlabki vaqtida irlsiyanishning bu xili **ona organizm orqali irlsiyanish** degan nom olgan. Aksariyat ko'pchilik belgilarni irlsiyanishida ham ota ham ona organizm qatnashsa, ona organizm orqali irlsiyanishda faqat ona organizm qatnashib, ota organizmning ishtiroti ko'zga tashlanmaydi. Odatdu onalik gametasi sitoplazmaga boy bo'lib, otalik gametasi xromosomalardan tashkil topadi. Shunga ko'ra zigota sitoplazmasi asosan ona gametasidagi sitoplazma hisobiga hosil bo'ladi. Bu esa o'z-o'zidan ba'zi bir irlsiy omillar ona organizm gametasining sitoplazmasida joylashgan, degan xulosa uchun asos bo'ldi. Natijada ona organizm orqali irlsiyanish o'rniiga **sitoplazmatik irlsiyanish** tushunchasi ko'pchilik tomonidan e'tirof qilina boshlandi.

Sitoplazmatik irlsiyanish faqat gulli o'simliklarda emas, balki bakteriyalar, zamburug'lar, suv o'tlari, hasharotlar, mollyuskalar, sutevizuvchi hayvonlar hamda boshqa organizmlarga xos xususiyat ekanligi keyinchalik ma'lum bo'ldi.

Genetika fanining hozirgi bosqichida ta'kidlanishicha hujayrada ikki xil genetik sistema ya'ni yadroviy va sitoplazmatik irlsiyanish sistemasi mavjud bo'lib, ular funktsiyalish jihatidan o'zaro bog'liq.

Sitoplazmatik irlsiyanish kashf etilganiga ancha muddat o'tgan bo'lsada, XX asrning 60-yillariga qadar u irlsiyatning xromosoma nazariyasiga qaraganda sekin rivojlandi. Buning uch xil sababi bor:

1) Fenotipda namoyon bo'ladigan hamda sitoplazma orqali irlsiyanadigan nishonli belgilarni topish qiyinligi;


2) Mutatsiyaga uchraydigan nishonli belgili organoid bitta bo'imasligi, aks holda u boshqa organoidlar tomonidan hujayra bo'linishida siqb chiqarilishi;

3) Meyoz bo'linishda xromosomalarni qiz hujayralarga tarqalish mehanizmiga o'xshash mehanizmning sitoplazma organoidlarida hozirgacha topilmaganligi.

Hozirda sitoplazmatik irsiylanish plastidalar, mitoxondriyalar va erkak sitoplazmatik pushtsizligida aniqlangan.

2. Plastidalar bilan bog'liq irsiylanish

Plastida bilan bog'liq irsiylanish 1909-yilda K.Korrens va E.Baur tomonidan aniqlangan. Ularning tadqiqotlarida nomozshomgul hamda itog'iz o'simligida chipor bargli va yashil bargli formalari chatishirilganda tubandagicha natija olingan: birinchi tajribada urug'chi sifatida yashil bargli, changchi sifatida chipor bargli o'simlik olinganda F_1 , dagi barcha bargli o'simlik changchi sifatida olinsa F_2 , da oq bargli, chipor bargli, yashil bargli o'simliklar rivojlangan. F_1 duragaylardagi oq, chipor va yashil bargli o'simliklar rivojlanishi siri bunday o'simliklarning chipor bargli o'simliklarda xloroplastlarning ikki tipi: normal xlorofil pigmentiga ega hamda o'zgargan ya'ni xlorofil pigmentiga ega bo'limgan plastidalar uchrasr ekan. Meyoz bo'linishda odatda yadroda xromosomalar, genlar gametalarga teng taqsimlansa, sitoplazmadagi plastidalar, mitoxondriya gametatarga notejis taqsimlangani sababli F_1 naslda oq, chipor, yashil bargli o'simliklar hosil bo'ladi.




46 - rasm. *Mirabilis jalapa*da bargning chipor rangini irsiylanishi.

Nomozshomgulning oq bargli shoxlarida yetilgan gul urug'chi, yashil bargli o'simliklar changchi qilib olingan tajriba variantida esa F_1 dagi

barcha duragaylar urug'idan oq bargli maysalar rivojlangan, ammo ularda fotosintez jarayoni ketmaganligi sababli nobud bo'lgan.

3. Mitoxondriyalar bilan bog'liq irsiylanish

Mitoxondriyalarning irsiylanishini birinchi marotaba XX asrning 50-yillarida B.Efrussi tomonidan o'r ganilgan. U achitqi zamburug'larda normal formalar bilan birga kichik hajmli mitti mutant achitqilar borligini aniqlagan. Bunday mutant formalar vegetativ urchish mobaynida hosil bo'lishini e'tiborga olib, ular "vegetativ mitti" achitqilar deb nomlangan. Vegetativ mitti achitqilardan tashqari boshqa fenotip bo'yicha o'xshash mutant zamburug' yadro genlarini o'zgarishi tusayli hosil bo'lgan mutant zamburug'lar mavjud bo'lib ular "ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug'lar" deb nomlandi. Odatda achitqi zamburug'lar chatishirilganda ikkita organizm sitoplazmasi va yadrosi zigota hosil bo'lishida to'liq qatnashadi. Shunga qaramay mutant va normal achitqi zamburug'lar mavjud bo'lib ular sitoplazmaning rolini alohidaholash mumkin. 47-rasmida mitti vegetativ hamda ajralish beruvchi achitqi zamburug'larining normal formali zamburug'lar bilan chatishirish natijalari berilgan. Bu mitti achitqi zamburug'i normal kattalikdagi achitqi zamburug'i bilan chatishirilsa hosil bo'lgan diploid to'plamli zigitada normal formali zamburug'larni mitoxondriyalar bo'lganligi sababli ularning askosporalardan normal formali zamburug'lar paydo bo'lgan. Bu holat normal va vegetativ mitti achitqi zamburug'lar sitoplazmasi farqlansa ham ularning genomlari o'xshash ekanligini ko'rsatadi.



47 - rasm. Achitqi zamburug'larda vegetativ mitti va xilma-xillik beruvchi shtammlarning genetik tahibili. 1 - normal, 2 - xilma-xillik beruvchi, 3 - vegetativ mitti zamburug'lar.


"Ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug'lar" normal forma zamburug'lar bilan chatishirilganda hosil bo'lgan zigotadan ikki xaploid sporalar rivojlanib, ularni 50% normal achitqi zamburug'lariga 50% mutant mitti achitqi zamburug'lariga o'xshash bo'ladi.

Bu o'z-o'zidan "ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug'lar" da yadning mitoxondriyaga ta'sir etishi tufayli mitti achitqi zamburug'lariga qo'shil bo'lganligini isbotlaydi.

Yadro genini o'zgarganligi tufayli hosil bo'lgan "ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug'lar" sitoplazmadagi mitoxondriyalarda yuz bergan mutatsiya natijasida paydo bo'lgan "vegetativ mitti achitqi zamburug'lar" bilan chatishtilriganda ham zigotalar normal bo'ladi. Ulardan hosil bo'lgan sporalar ikki xil bo'ladi. "Vegetativ mitti achitqi zamburug'lar" o'zgarish sitoplazmadagi mitoxondriyalarni faoliyati bilan bog'liq bo'lsa, "ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug'lar"da bunday o'zgarish yadro genlari bilan belgilanadi.

4. Sitoplazmatik predeterminatsiya

Sitoplazmatik ırsiyanışığa qorinoyoqli mollyuskalarda (*Limnea*, *chig'anog'i* o'ng tomonga va *chig'anog'i* chap tomonga buralgan formalarini chatishirishdan olingan duragaylarni misol qilib ko'sheti mumkin.



48 - rasm. Limnea mollyuskalarida chig'anoq yo'nalishini
irsiylanishida sitoplazmaning roli. D - chig'anoqning o'ng tomonga
yo'nalganini, d - chig'anoqning chap tomonga yo'nalganligini ifodalaydi.

Chig'anoqning chapga va o'ngga buralishi bitta gen allellariga bog'liq bo'lib, o'ng tomonga buralishi D alleli, chap tomonga buralishi d alleli bilan ifodalananadi. Qayd etilgan qorinoyoqli mollyuska germofrodit va'ni

o'z-o'zini urug'lantiradigan, shu bilan birgalikda o'zaro chatishib nasl beruvchi organizm sanaladi. Odatda to'g'ri va retsi prok chatishtirishda organizmlar genotipi Dd bo'lsa ham ularning fenoti pi bir-biridan tafovut qiladi. $Dd \times dd$ chatishtirishdan hosil bo'lgan qorinoyoqli mollyuskaning chig'anog'i o'ng tomonga, $dd \times DD$ dan olingan individniki esa chap tomonga buralgan bo'ladi. F_1 duragay qorinoyoqli mollyuskalar o'z-o'zi bilan urug'langan bo'lsa, F_2 dagi hamma individlar chig'anog'i o'ng tomonga buralgan bo'ladi. Mabodo F_2 duragay qorinoyoqli mollyuskalar o'z-o'zini urug'lantirsalar, u holda F_3 da 75% individlarning chig'anog'i o'ng tomonga, 25% individlarning chig'anog'i esa chap tomonga buralgan bo'ladi. Irsiyylanishning bu tipi F_3 individlarning fenoti pini ular rivojlangan zigota genotipi emas, balki boshlang'ich ona organizm (R) genoti piga bog'liq bo'lishidan dalo'lat beradi va u **sitoplazmatik predeterminatsiya** deb nomlanadi.

5. Sitoplazmatik erkak pushtsizligi

5. Sitoplazmatik erkak pushtsizligi
Sitoplazmatik irlaylanishga doir yana bir misol sitoplazmatik erkaklik pushtsizligidir. Sitoplazmatik erkak pushtsizlik hodisasi makkajo'xori, piyoz, lavlagi, sorgo, zig'ir, g'o'za va boshqa 100 turdan ortiq o'simliklarda aniqlangan.

Makkajo'xori o'simligida sitoplazmatik erkak pushtsizlik geni irlsiyanishi XX asrning 30-yillarda Rossiyada **M.I.Xadjinov**, AQShda **M.Rods** tomonidan ixtiro qilingan. Makkajo'xori ro'vagining pushtsiz bo'lishi changchining pushtsizligi bilan izohlanadi. U sit^s bilan ifodalananadi. Ro'vakdag'i changchilar pushtli bo'lgan taqdirda u sitⁿ bilan belgilanadi. Sitoplazmatik pushtsizlik yadro xromosomaning retsessiv rf genining gomozigota holatiga bog'liq. Agar genotipiida Rf genlari gomozigota yoki geterozigota holatda bo'lsa, u holda ro'vakdag'i changchi donachalari urug'lanish davrida yangi naslni hosil qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Mabodo sitoplazmasi pushtsiz va sitoplazmasi pushtli bo'lgan, lekin yadro genlari retsessiv bo'lgan makkajo'xorilar o'zaro chatishtirilsa F₁ duragay pushtsiz bo'ladi. Buni tubandagicha izohtash kerak:

Fen.	pushsiz	pushtlı
P Gen.	sit ^s rsif	x sit ^N rsif
	gam	rf
	sit ^s rf	rf
Fen.	pushsiz	
F. Gen.		sit ^s rsif

Mabodo sitoplazması pushtsiz urug'chi o'simligi sit^SRfRf chan
o'simlik bilan chatıştırılısa F₁ duragaylar normal nasıl beradi, ya'nı pushtılı
bo'ladılar. Chunki yadro xromosomadagi dominant RfRf geni

sitoplazmaning pushtsizlik gen ta'sirini bartaraf etadi. Buni shunday tushunish kerak:

Fen.	pushtsiz	pushtli
P Gen.	sit ^s Rfrf	x sit ^s RfRf
gam	sit ^s rf	Rf
Fen.	pushtli	
F ₁ Gen.		sit ^s Rfrf

Changchi o'simlik sitoplazmasi pushtsiz yoki normal bo'lishidan qat'iy nazar yadro geni plazmogenlar faoliyatini boshqaradi. Shunga ko'ra sitoplazmatik pushtsizlik F₁ duragaylarda namoyon bo'lmaydi. Sitoplazma bunday makkajo'xori sitoplazmasi pushtli yadro gentari gomozigota retsessiv bo'lgan makkajo'xori bilan chatishirilsa F₂ 50% pushtli, 50% pushtsiz bo'ladi. Buni tubandagicha izoxlash mumkin:

Fen.	pushtli	pushtli
R _{Gen}	sit ^s Rfrf	x sit ^s rfrf
gam	sit ^s Rf	sit ^s rf
Fen.	pushtli	pushtsiz
F ₁ _{Gen}		sit ^s rfrf

Rf geni sit^s ning tuzilishini va o'ziga xosligini o'zgartirmaydi, balki uning ta'sir faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Hozirgi vaqtida sitoplazma pushtsizligiga ta'sir etuvchi bir qator genlar borligi aniqlangan.

6. Hujayradagi mayda zarrachalar va simbiontlarining irlsiyanishi


Hujayra sitoplazmasida mitokondriya, plastida, ribosoma, Golji apparati, lizosoma va boshqa organellalardan tashqari o'z-o'zini ko'paytira oladigan mayda zarrachalar hamda simbiontlar uchraydi. Bunday zarrachalar va simbiontlar sitoplazma orqali avloddan-avlodga beriladi.

Masalan, sichqonlarning ba'zi liniyalarining sut bezlari xavfli o'sma kasalligiga beriluvchan bo'ladir. Sut bezlari xavfli o'sma kasalligiga beriluvchan sichqonlarda bu xossa avloddan-avlodga ona organizmi orqali o'tadi. Agar normal tug'ilgan sichqon bolalarini sut bezlari xavfli o'sma kasaliga moyil bo'lgan ona sichqon emizsa, sichqon bolalari xavfli o'sma kasali bilan kasallananadilar. Mabodo xavfli o'sma kasali bor sichqondan tug'ilgan sichqonlarni normal ona sichqon emizsa, ular xavfli o'sma kasali bilan og'rimay sog' holatda voyaga yetadilar. Ushbu misolda xavfli o'sma kasali ona suti orqali sichqonlarga berilishini ko'rish mumkin.

Ba'zi bir parazitlar ham sitoplazma orqali avloddan-avlodga o'tishi to'g'risida ayrim dalillar mavjud. Masalan, drozofilaning ayrim xilida erkak pashshalar bo'lmaydi. Ona drozofila qo'ygan tuxunidan faqat

ung'ochi pashshalar rivojlanadi. Bu hodisa jinsiy xromosomadagi retsessiv allelga emas, balki jinsiy hujayradagi spiroxetaga bog'liq. Ma'lum bo'lishicha spiroxetalar urg'ochi drozofila jinsiy hujayralarini tanlab ko'payadilar. Erkak drozofilalarga XY xromosomali hujayralarning nobud bo'lishi sababchisi spiroxeta ekanligi aniqlandi.

Endosimbiontlarni sitoplazma orqali avloddan-avlodga berilishiga yana bir misol tufelkani *Paramecium aurelia* turining ayrim xilida boshqa mayda organizmlar uchun o'ta zararli – o'ldiruvchi zahar parametsin ishlab chiqarilishi hisoblanadi. U kappa zarrachalari deb ataladi. Agar kappa zarrachalari bor tufelka bilan kappa zarrachalariga ega bo'lman tufelka orasida qisqa muddatlari kon'yugatsiya ro'y bersa, bunday kappa zarrachalari bir tufelkadan boshqa tufelkaga o'tmaydi. (49-rasm) Mabodo, kappa zarrachalari bor tufelka bilan bunday zarrachalarga ega bo'lman tufelkalar orasidagi kon'yugatsiya uzoq muddatlari bo'lsa, u holda ana shu kappa zarrachalar qo'shni tufelkaga berilishi va u o'z navbatida «o'ldiruvchi» tufelkaga aylanishi mumkin. Aniqlanishicha tufelkada kappa zarrachalarning bo'lishi yadrodagini uchta dominant gen faoliyatiga bog'liq. Tekshirishlar kappa zarrachalar *Saudobacter tacniospiralis* bakteriyasi bo'lib, tufelka bilan birga hayot kechiruvchi endosimbiont ekanligini ko'rsatdi. Bu bakteriyalarni hujayradan tashqarida sun'iy ozuqada ko'paytirish va u bilan kappa zarrachasi bo'lman *Paramecium aurelia* bakteriyasiga yuqtirish mumkin.



49 - rasm. Infuzoriyalarda K alleli va kappa zarrachalarining irlsiyanish sxemasi. Kappa zarrachalar qora nuqta bilan ifodalangan.

8. Sitoplazmatik irlsiyanishning molekular asoslari

Bioximik, molekular genetik tadqiqotar natijasida plastidalar, mitoxondriilar hamda hujayraning endoplazmatik to'rida DNA borchigi ma'lum bo'ldi. Plastidalar hamda mitoxondriyalardagi ribosoma, transport, informatsion RNKlar DNA da joylashgan genetik axborotning replikatsiyasi va transkripsiysi, translatsiyasi hamda oqsil molekulunasini sintezi uchun zarur fermentlar mavjudligi aniqlandi.

Ma'lum bo'lishicha o'simliklarda plastidalar fotosintezdan boshqa funksiyalarni ham bajaradilar. Bunday funksiyalar qatoriga aminokislotalarni, lipidlarni, xlorofillarni sintez qilish kabilalar kiradi. Xloroplast DNA-sida genetik axborotning ozgina bo'lagi bo'lib, u plastidalarni funksiyasi uchun zarur. Ular atiga 120 gendan iborat.


Xloroplast genom: 70-217 ming nukleotidlardan juftligidan tashkil topgan. Ularning o'rtachasi 100-120 ming nukleotidlardan juftligiga teng. Faqat jigar moxining mitoxondriya genomi to'liq tadqiq qilingan. O'simlik mitoxondriya genomiga nisbatan kam o'r ganligan. O'simliklarning mitoxondriyalarda 200-2500 minggacha nukleotidlardan juftligi bor. Hayvonlarda, shu jumladan odamlarda mitoxondriyaning halqasimon DNA molekulasi genomi 16 ming nukleotidlardan juftligi uchraydi. O'simliklarning mitoxondriya genomi hayvonlarning mitoxondriya genomiga nisbatan 150 marta kattadir.

Ba'zi o'simlik mitoxondriyalarda mt DNA dan tashqari DNA ning 1-30000 nukleotidlardan juftligidan iborat halqasimon molekulalari ham bor bo'lib, mustaqil irlsiyanish xususiyatiga ega.

Tamaki o'simligida xromosomadan tashqari 868 juft nukleotiddan tashkil topgan halqa topilgan. Bakteriyalarda xromosoma DNA sidan tashqari DNA elementlari – plazmidalar bor bo'lib, ularning ayrimlari antibiotik, zaharli toksinlarga chidamli. Rekombinatsiyalanuvchi plazmidlar-transmissib: bakteriya konyugatsiyalashganda masalan, F va R plazmidlar bir bakteriyadan ikkinchi bakteriyaga beriladi. Boshqa avtonom ravishda replikatsiyalanish xossasiga ega. Ayrim plazmidalar avtonom ravishda replikatsiyalanish xossasiga ega.

Xulosa qilib aytganda, hujayraning genetik apparat tuzilishi quyidagicha ekanligini ta'kidlash kerak.

Hujayra genetik apparatining tuzilishi



Savol va topshiriqlar

1. Sitoplazmatik irlsiyanish bilan yadro orqali irlsiyanishni taqqoslang. Ular o'rtasidagi tafovutni aniqlang.
2. Plastida bilan bog'liq irlsiyanishni misollar orqali tushuntiring.
3. Mitoxondriya bilan bog'liq irlsiyanishni misollar bilan izohlang.
4. Sitoplazmatik predeterminatsiya nima? Unga misol keltiring.
5. Makkajo'xoridagi erkaklik pushtsizligini irlsiyanish tafsiloti qanday?
6. Infuzoriyalarda kappa zarrachalarning irlsiyanishini tushuntiring.
7. Xloroplast va mitoxondriya genominining o'ziga xos tuzilishini yoriting.
8. Sitoplazmatik irlsiyanishning molekular asoslarini izohlang.
9. Nima sababdan sitoplazmatik irlsiyanish 60-yillarga qadar kam o'r ganligan?
10. Halqasimon DNA bilan plazmidalar orasida qanday o'xshashlik va tafovut bor?
11. Sichqonlarning ayrim xilida xavfli o'sma turlari sut bezlari orqali avloddan-avlodga ona organizm orqali o'tadi. Buni qanday izohlasa bo'ladi?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Sitoplazmatik irlsiyanishning yadroviy irlsiyanishdan farqi nimada?*
 - A. Sitoplazmatik irlsiyanish avlodlarga notebris beriladi
 - B. Sitoplazmatik irlsiyanish nuklein kislotalar orqali avlodlarga o'tadi
 - C. Sitoplazmatik irlsiyanish avlodlarga plastida va mitoxondriylar orqali beriladi
 - D. A-S

2. Sitoplazmatik irlsiyanish amalga oshadi
- Plastidalar orqali
 - Mitochondriyalar orqali
 - Plazmidalar orqali
 - Hamma javoblar to'g'ri

3. Sitoplazmatik irlsiyanish dastlab qaysi o'simliklarda aniqlangan?
- Namozshomgul, xlamidomonada
 - G'o'za, bug'doyda
 - Kungaboqar, sulida
 - Javdari, makkajo'xorida

4. Mitochondriyal irlsiyanish qaysi organizmlarda ma'lum bo'lgan?
- Tufelkada
 - Achitqi zamburug'da
 - Mollyuskalarda
 - Makkajo'xorida

5. Kappa zarrachalarining irlsiyanishi qaysi hayvonlarda kuzatilgan?
- Amebada
 - Infuzoriyada
 - Gidroda
 - Yassi chuvalchangda

6. Erkaklik pushtizligini sitoplazma orqali irlsiyanishi qaysi o'simliklarda aniqlangan?
- Loviyada
 - Bug'doyda
 - Makkajo'xorida
 - Arpa

7. Xavfli o'sma kasalligi bor sichqondan tug'ilgan sichqonlarni normal ona sichqon emiza, ularga bu kasallik o'tadimi?
- Ular kasal bo'ladi
 - Ular sog'lom bo'ladi.
 - Kasallik sut orqali o'tmaydi.
 - Bunday tajriba qilinmagan.

8. Plazmidalar qo'shimcha xromosomalar bo'lib ular bir-biridan nima bilan farqlanadi?
- Xromosomaga birikishi yoki birikmasligi bilan
 - Antibiotik xossaga ega bo'lishi yoki bo'lmasisligi
 - Xujayradagi o'rni.
 - A-B

VII-BOB. O'ZGARUVCHANLIK

12§. O'zgaruvchanlik

Tayanch tushunchalar: O'zgaruvchanlik va uning xillari, modifikatsion o'zgaruvchanlik, kombinativ o'zgaruvchanlik, tekombinativ o'zgaruvchanlik, mutatsion o'zgaruvchanlik; mutatsiya to'g'risidagi nazariya, spontan va indutsirlangan mutatsiya, generativ va somatik mutatsiya, morfologik, fiziologik, biokimyoiy mutatsiyalar, letal, yarim letal, neytral va foydali mutatsiyalar, gen mutatsiyalar, xromosoma mutatsiyalar, genom mutatsiyalar, tranzitsiya, transversiya, deletsiya, duplikatsiya, inversiya, translokatsiya, transpozitsiya, transpozon, poliploidiya, geteroplodiya, avtopoliploidiyava allopoliplodiya, retsessiv mutatsiyalarni aniqlash metodlari CIB va CuL Pm.

1. O'zgaruvchanlik va uning xillari

Organizmlarning belgi va xossalari bo'yicha o'zaro farq qilishi **o'zgaruvchanlik** deb ataladi. O'zgaruvchanlik – irlsiyanmaydigan va irlsiyanadigan xillarga bo'linadi. Irlsiyanmaydigan o'zgaruvchanlik modifikatsion o'zgaruvchanlik deb nomlanadi. Irlsiy o'zgaruvchanlik esa **kombinativ, rekombinativ va mutatsion o'zgaruvchanlikka** ajraladi.

Kombinativ o'zgaruvchanlik chatishtirishda qatnashgan ota-onalik organizm genotiplaridagi genlarning qayta kombinatsiyalanishi, ularning o'zaro ta'siri tusayli paydo bo'ladi.


Rekombinativ o'zgaruvchanlik meyoz bo'linishida ota-onalik xromosomalarining gametalarga mustaqil taqsimlanishi va ularning urug'lanish paytida tasodifli kombinatsiyasi natijasida yuzaga keladi. Ayrim holatlarda nogomologik xromosomalar chalkashuvi oqibatida ro'yobga chiqadi. Rekombinativ o'zgaruvchanlik krossingover natijasida DNKdagi genlarning qayta birikishi tusayli ham sodir bo'ladi.

2. Mutatsion o'zgaruvchanlik


Mutatsion o'zgaruvchanlik deganda organizm genotipi – xromosomalar, nukleim kislota:ur, genlar o'zgarishi bilan bog'liq o'zgarishlar tushuniladi. **Mutatsiya to'g'risidagi nazariya** dastlab gollandiyalik olim **Gugo de Friz** tomonidan ishlab chiqilgan. Uning qisqacha mazmuni: 1) Mutatsiya to'satdan ro'y beradigan o'zgaruvchanlik; 2) Sifat jihatdan farqlanuvchi o'zgaruvchanlik; 3) Turg'un, shu bilan birga turli yo'nalishdagi o'zgaruvchanlik; 4) Mutatsion o'zgaruvchanlik foydali va zararli bo'ladi; 5) O'xhash mutatsiyalar takrorlanishi mumkin.

Mutatsion o'zgaruvchanlikni sinflashning bir necha xillari bor. Kelib chiqishiga ko'ra mutatsiyalar **spontan** va **indutsirlangan** xillarga bo'linadi. Spontan mutatsiya tabiatda to'satdan paydo bo'ladigan, indutsirlangan

mutatsiya esa sun'iy sharoitda turli fizikaviy yoki kimyoviy omillar ta'sirida hosil qilinadigan mutatsiyadir. Paydo bo'lgan joyiga ko'ra mutatsiya **generativ** va **somatik** mutatsiyaga ajratiladi. Generativ mutatsiya jinsiy hujayralarda, somatik mutatsiya esa tana hujayralarda ro'yobga chiqadi. Somatik hujayralardagi mutatsiya jinsiy yo'l bilan ko'payadigan hayvonlarning kelgusi avlodlariga berilmaydi. Bunga asosiy sabab rivojlanmaydi. Lekin somatik mutatsiya sodir bo'lgan o'simlik o'zgargan organlari vegetativ yoki parxish yo'li bilan ko'paytirilganda kelgusi avlodlarga o'tadi. Jinsiy hujayralardagi ro'y bergan mutatsiyalar kelgusi avlodlarda namoyon bo'ladi. Fenotipda namoyon bo'lishiga ko'ra mutatsiya **morfologik**, **fiziologik**, **biokimoviy** xillarga bo'linadi. Mutatsiyani hayotchanlikka ko'rsatgan ta'siriga qarab **letal**, **yarim letal**, **neytral** va **foydali** xillarga bo'linadi. Irsiyatning moddiy asostarini o'zgarishiga qarab mutatsiyalar **gen**, **xromosoma** va **genom** mutatsiya xillariga, ularning har biri o'z navbatida mutatsiya sinflari va turlariga bo'linadi.




50-rasm. Parrandalarda mutatsiya tufayli mutatsiya patning bo'lmashigi, qo'yillarda esa oyoqning qisqaligi.



51 - rasm. Somatik mutatsiya (Qorako'l qo'yilda yungida qora dog'lar bo'lishi).

Genotipga ko'ra mutatsiyalarini sxematik ravishda izohlash:



Yuqorida ko'rsatilgan genotip bo'yicha mutatsiya xillari organizmning somatik va jinsiy hujayra, organlerida ro'y berishi mumkin.

3. Gen mutatsiyalari

Gen mutatsiyasi molekulyar darajada ro'y beradi. Bunday mutatsiyani hatto elektron mikroskop yordamida ham ko'rib bo'lmaydi. Gen mutatsiyasi ko'p hollarda fenotipda yangi belgini rivojlantiradi. Gen mutatsiyalari ikki turga bo'linadi. Uning bir turi DNKdagi nukleotidlar o'rinni ayirboshlanishi bilan tavsiflanadi. DNKdagi nukleotidlarning o'rinni almashishi ikki xil:

a)bir purin azotli asosini ikkinchi purin azotli asosi yoki bir pirimidin azotli asosini ikkinchi pirimidin azotli asosi bilan almashishi ya'ni $A \rightleftharpoons G$, $T \rightleftharpoons C$ almashishiga **tranzitsiya** deyiladi.

v) Purin asosini pirimidin asosi bilan yoki aksincha pirimidin asosini purin bilan almashishiga, ya'ni $A \rightleftharpoons T$, $A \rightleftharpoons C$, $G \rightleftharpoons T$ **transversiya** deb nomlanadi.

Spontan tranzitsiyada vodorod bog'larni hosil bo'lishi o'zgaradi. Natijada adenin guanin xossasiga, guanin adeninning, sitozin timinining, 5-timin esa sitozininning xossasiga ega bo'ladi. Bunday o'zgarishlar 5-bromuratsil, 2 aminopurin, nitrat kislotasi kabi mutagenlar ta'sirida ro'y beradi. Transversiya esa ultrabinafsha nurlar ta'sirida amalga oshadi.

Gen mutatsiyasining ikkinchi turida DNKdagi nukleotidlarning joylashgan o'rni o'zgaradi. DNK spiralidagi nukleotidlarning joylashgan o'rnnini o'zgarishi ham mutagen omillar masalan, proflovin ta'sirida sodir bo'ladi. Bu mutagen ta'sirida DNK zanjiridan bir-ikkita nukleotidlarn tushib qolishi yoki uning orasiga kirishi kuzatiladi. Oqibatda DNK ko'pchilik gen mutatsiyalari shunday yo'l bilan paydo bo'ladi. Qayd qilingan usulda oqsil molekulasi tarkibidagi aminokislotalarning kodи va antikodonida o'zgarish ro'y beradi. Chunonchi, lizin aminokislotalarning kodи AAA dan UAA ga o'zgarishi, glutamin kodи SAG dan UAG ga o'zgarishi mumkin. Har qanday aminokislota kodini mutatsiya tufayli terminator UAG kodiga o'zgarishi polipeptid zanjiri sintezini ertaroq bo'lsa terminatsiya hodisasi ro'y bermaydi va oqsil molekulasi dагi gen mutatsiyasi DNK molekulasi dагi nukleotidlarn izchilligini o'zgarishi bitan aloqador bo'lib, u ko'p hollarda oqsil molekula tuzilishini o'zgarishiga olib keladi. Mabodo iRNK antikodonida mutatsiya sodir aminokislotalar miqdori o'zgarmasa ham uning tuzilishi o'zgaradi. Demak, bitan aloqador bo'lib, u ko'p hollarda oqsil molekula tuzilishini o'zgarishiga olib keladi.

Gen mutatsiyalari retsessiv va dominant xillarga ajraladi. Retsessiv mutatsiya xromosomalari diploid to'plamli organizmlarda geterozigota holatda fenotipda namoyon bo'lmaydi. Lekin kelgusi avlodlarda ana shunday geterozigotali $Aa : Aa$ organizmlar o'zaro chatishsa retsessiv mutatsiya gomozigota (aa) holatga o'tib, fenotipda ko'zga tashlanadi. Ulardan farqli ravishda dominant mutatsiyalar geterozigota holatda namoyon bo'ladi.

Gen allelini o'zgarishiga ko'ra mutatsiya ikki xil: to'g'ri va teskari mutatsiyalarga bo'linadi. To'g'ri mutatsiyada dominant allel mutatsiya tufayli retsessiv allelga ya'ni $A \rightarrow a$ ga aylanadi. Teskari mutatsiyada esa aksinchalik retsessiv allel (a) dominant allel (A) ga o'zgaradi ($a \rightarrow A$). Ayrim holatlarda mutatsiya tufayli bir genning ko'p xil holati yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaqtarda A geni $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$ allellarini hosil qiladi, ya'ni ko'p tomonlama allelizm amalga oshadi. Lekin, diploid to'plamli gomologik xromosomalarda ana shu allellarning faqat ikkitasigina uchraydi.

4. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni


Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni mashhur rus olimi N.I. Vavilov tomonidan g'allaguldoshlar oilasida kashf qilingan. Bu qonunga ko'ra agar g'allaguldoshlar oilasiga kiruvchi bir avlodda biror bir irsiy o'zgaruvchanlik kuzatilsa, shunday irsiy o'zgaruvchanlik uning boshqa avlodlarida ham uchrashi mumkin. G'allaguldoshlarning bug'doy, arpa, suli, tariq, makkajo'xori, sholi avlodlarida ayrim belgilari

masalan, don rangining oq, qizil, qora, gunafsha, don shaklining yumaloq, cho'zinchoq, hayot kechirish tarziga ko'ra kuzgi, bahorgi, yarim kuzgi, etrangi, kechki formalarida takrorlanishini ko'rish mumkin. Xuddi shuningdek Gossipium (g'o'za) avlodiga kiruvchi g'o'za turlarida tolanning oq, malla, chigitning tolasiz, tolali, yoki gultoji barglarning qaymoq, sariq rangdaglari kuzatiladi. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni hayvonlarda ham o'z tasdig'ini topadi. Xususan, tonaning oq rangda bo'lishi umurtqali xayvonlarning barcha sinflari-baliglar, suvda va quruqda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sutemizuvchilarga mansub avlod, turlarda kuzatiladi. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuniga asoslanib selektsionerlar madaniy o'simliklarning boy kollektisyasini to'plashga va undan yangi navlarni chiqarishda foydalanoqmoqdalar.

5. Xromosoma mutatsiyalari

Har bir biologik tur boshqa turdan xromosomalarning soni, shakli, hajmi bilan farqlanadi.

Evolyutsion jarayonda xromosomalarning faqat soni, hajmi bilan bir qatorda tuzilishi ham o'zgargan. Xromosomalar soni, shakli, hajmi va tuzilishi bilan bog'liq mutatsiya **xromosoma mutatsiyasi** yoki **abberatsiyasi** deb nomlanadi.




52 - rasm. Xromosomalarning qayta tiklanishi. 1 – dastlabki gomologik xromosomalar jufti. 2 – DEFH qismining uzilishi. 3 – C qismining duplikatsiyasi. 4 – BCD qismining inversiyasi. 5 – DE qismining inversiyasi. 6 – insersiya DE qismining qayta joylashishi.

Xromosoma tuzilishining o'zgarishi to'rt xilga bo'linadi. Bular deletsiya, duplikatsiya, inversiya va translokatsiyadir. **Deletsiya** – xromosomaning ayrim qismini uzilishi. Deletsiya birinchi marotaba 1917-yili amerikalik olim **Bridges** tomonidan X xromosomaning genetik taxibili orqali aniqlangan. Deletsiya gomozigota holatda odatda letal xossaga ega bo'ladi.

Xromosomaning juda kichik qismini yo'qolishi letal bo'lmasligi mumkin. Lekin xromosomaning bir munkha kattaroq bo'lagini ajrab ketishi ayanchli oqibatlarga olib keladi. Masalan, odamlarda 5 xromosomaning kalla yelkasidagi deletsiya tufayli kalla suyagining kichik bo'lishi, bolanling rivojlanishining sekinlashishi va aqliy zaiflik ro'y beradi. Shuningdek odamlarda 4, 13, 18 xromosomalardagi deletsiya ham nuqsontarga, chunonchi, aqli pastlikka sababchi bo'ladi.

Duplikatsiya xromosomalarning ba'zi bir qismlari ikki marotaba ortadi. Duplikatsiyaga yo'liqqan qismlar xromosomalarda yonma-yon joylashishi va fenotipda namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, drozofila meva pashshasi ko'zidagi Bar mutatsiya X xromosomadagi duplikatsiya oqibatida paydo bo'lgan. Bar mutatsiyada ko'zidagi fasetkalar kamayib ketadi. Bir necha nukleotidlardan iborat DNAning unchalik katta bo'Imagan qismi gen tarkibiga qo'shilishi va u bir necha marotaba takrorlanishi mumkin. Sichqonlar genomining 10% ga yaqini tez takrorlanadigan nukleotidlар izchilligidan iborat. Ularning takrorlanishi ikki nusxadan iborat bo'ladi.



5.3 – rasm. Xromosoma tuzilishining o'zgarish turlari.

Inversiya ham xromosoma mutatsiyasining bir xili. U sodir bo'lgan taqdirda xromosomadagi genlar soni ortmaydi hamda kamaymaydi, lekin ayrim qismi o'z o'mini 180° ga o'zgartiradi. Inversiya ikki xil bo'ladi. 180° ga o'zgargan xromosomaning bir qismida sentromera bo'ladi, ikkinchi qismida esa sentromera bo'lmaydi. Inversyaning birinchi xilini **peritsentrik** inversiya, ikkinchi xilini **paratsentrik** inversiya deyiladi.

Translokatsiya deganda ikkita nogomologik xromosomalarning o'zarbo'yin bo'laklari bilan o'rinn almaslishi tushuniлади. Translokatsiya hayvon hujayralarida ham o'simlik hujayralarida ham kuzatiladi. Nogomologik xromosomalari translokatsiyaga uchragan organizmlarda nasl qoldirish kamroq bo'ladi. Gomozigota retsi prok translokatsiyaga uchragan xromosomalarda genlarning birikish guruhi o'zgaradi. Dastlab xromosomaga birikmagan genlar endilikda xromosomaga birikkan bo'ladi yoki aksincha hodisa ro'y beradi.

Transpozitsiya. Ko'chib yuruvchi elementlar organizmlar evolyusiyasida muhim o'rinn tutadigan genetik birliklar bo'lib, ular xromosomalarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuruvchi fragmentlaridir. Bunday elementlar o'tgan asrning 40-yillarda AQSh olimasi **B.Mak Klintok** tomonidan kashf qilingan va bu ishi uchun olma 1984-yil Xalqaro Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Ko'chib yuruvechi elementlarning uch xil tipi mavjud va ular bir-biridan tuzilishi, ko'chib yurish tipi va viruslarga o'xshash yoki o'xshashmasligi bilan farqlanadi. Shulardan birinchisi **transpozonlar** bo'lib, ular DNA ning bir joydan ajralib chiqib, ikkinchi joyga borib o'mashadi. Bunda DNA miqdor jihatdan o'zgarmaydi. Buning aksicha, ikkinchi tip ko'chib yuruvchi elementlar, **retrotranspozonlar** – DNA ning bir bo'lagi bo'lib, ular tuzilishi jihatidan RNA-tutuvchi viruslarni eslatadi. Bunday elementlar o'zlaridan teskari transkriptaza yordamida DNA holidagi o'z nusxasini sintezlab, bu nusxalarni DNA ning boshqa joyga ko'chib o'tishini (insersiyalanishini) ta'minlaydi. Ko'chish davomida retrotranspozonlarni eski nusxasi o'z joyida qoladi va faqat ularning nusxasigina ko'chiriladi. Natijada DNA miqdor jihatdan ko'payadi. Uehinchi turdag'i ko'chib yuruvchi elementlar – retropozonlar deb atalib, ko'chish mexanizmi bo'yicha yuqoridaq retrotranspozonlarga o'xshaydi, ya'ni ularni nusxalari sintezlanib, boshqa joyga ko'chadi. Biroq asosiy farq ular tuzilishi jihatidan viruslarga nunaqo o'xshamaydi va nusxa ko'chish uchun o'zlarida teskari transkriptaza fermentiga ega emas. Bu uch turdag'i ko'chib yuruvchi elementlar organizmlar genomining ko'p miqdorini tashkil qiladi. O'simliklar genomining qarib 50% transpozon, retrotranspozon va retropozonlardan tashkil topgan. Masalan, makkajo'xori so'tasida donlarni

antotsian (qizil) pigmentlarni paydo bo'lib yo'qolishi antotsian rang beruvchi genni ichidagi transpozonnini ko'chishi bilan izohlanadi. Buna sariq rangli dondan transpozonnini chiqib ketishi antotsian rang beringen tiklanishiga olib keladi.

Aniqlanishicha transpozonlar va retrotranspozonlarda bu elementlarni ko'chib yurishini belgilovchi transpoaza fermenti yoki nusxa ko'chiruvchi teskari transkriptaza fermenti genlarini o'zida tutadi va ko'chishga o'tish uchun samarali bo'lgan yopishqoq uchlarga ega. Biroq bunday birliklarni fenoti pik namoyon bo'lishi, ular biror funksional genlarni ichiga tushqolganda yaqqol ko'rinishi.


"Sakrovchi" genetik elementlar keyinchalik ko'pchilik eukariot va prokariot organizmlarda ham aniqlandi. Hanuzgacha mazkur genetik elementlar organizm uchun foydali funksiyaga egami degan masala haq etilmag'an. Ba'zi olimlar "sakrovchi" genetik elementlar "xudbin gen" bo'lib, faqat o'z-o'zini ko'paytirish funksiyasini bajaradi, organizm uchun hech qanday foyda keltirmaydi degan fikrni quvvatlaydilar. Bunga qarama-qarshi o'laroq "sakrovchi" genetik elementlar xromosomada har xil mutatsiyalarni hosil etish qobiliyatiga ega bo'lib, xromosomalarning ichki tuzilishini o'zgarishiga olib keladi, degan mulohazalar ham bor.

6. Genom mutatsiyaları

Genom mutatsiyasi genotipining barcha sistemasini qamrab oladi. U poliploidiya, geteroplodiya ajraladi. **Poliploidiya** deganda xromosoma to'plamini karra ortishi, **geteroplodiya** atamasi ostida esa xromosoma sonini ortishi yoki kamayishi tushuniladi. Dastlab 1889-yilda **I.I.Gerasimov** spirogira suv o'tiga yuqori harorat bilan ta'sir etib yadro moddasini ikki hissa ko'payishiga erishgan. Poli ploidiya atamasini birinchi bo'lib fanga 1916-yilda **G.Vinkier** kiritgan. U yunoncha *poly* - ko'p marotaba va *plooseidos* - tur degan ma'noni anglaradi. Poli ploidiya doirno olimilar diqqat markazida bo'lgan. Oqibatda 1909-yili **R.Geyts** G.de Frizing mutatsion nazariyasi uchun asos bo'lgan *enotera* o'simligi tabiiy tetraploid ($2p=24$) ekanligini ma'lum qildi. Poli ploidiyalarga qiziqish XX asrning 40-yillaridagi birmuncha ortdi. Bunga asosiy sahab Amerika tadqiqotchilaridan **A. Bleksli** va **A.Everi** o'simlik urug'latiga kolxitsin alkoloidi bilan ta'sir qilib ko'plab poliploid formalarni oldilar. Aniqlanishicha kolxitsin alkaloidi hujayralar bo'linayotganda bo'linish urchug'ini hosil etmasligi va oqibatda mitozning metafazasida xromosomalar ikki qutbga tarqalmay ona hujaya markazida golishi ma'lum bo'ldi.

Poli ploidiya tabiatda keng tarqalgan hodisadir. Eukariot organizmlardan zamburug'larda, suvo'larda, gulli o'simliklarda poliploid formalar ko'piab topilgan. Infuzoriyalarning makronukleusi ham yuqori darajadagi poliploid.

hisoblanadi. Hayvonlar orasida poliploid organizmlar nihoyatda kam. Lekin ayrim ixtisoslashgan organlar, chunonchi, sute Mizuvchi hayvonlarning jigar, ichak to'qimasi, so'lakbezi xromosomalari poliploid ekanligi aniqlangan.



54 - rasm. G'o'zaning tetraploid (*A*) va diploid (*B*) turlari:
G.hirsutum L. va *G.herbaceum* L. 1 - guli, 2 - gultojibargi, 3 -
gulgo'rg'oni, 4 - bargi, 5 - ochilmagan ko'sagi, 6 - ochilgan ko'sak.

O'simliklarda sun'iy ravishda poliploid formalarni hosil etishda kolxitsin alkolojididan tashqari vinblastin, achitqi zamburug'larda kamforadan foydalaniladi.

Poliploidiya ikki xil bo'ladi: **avtopoliploidiya** va **allopoliploidiya**. Avtopoliplioidiya bir turga mansub organizm xromosomalarni karra ortishi tufayli sodir bo'ladi. Avtopolipliodlar muvozanatli ($4n$, $6n$, $8n$ va hokazo) va muvozanatsiz ($3n$, $5n$, $7n$ va hokazo) ga ajraladi. Muvozanatli avtopolipliodlar xromosomasi diplloid bo'lgan organizmlarga qaraganda yirik poyali, bargli, gulli, urug'li bo'ladi. Poliploid hujayralarda diplolidli hujayralarga nisbatan yadroları yirikroq bo'ladi. Ko'pgina o'simliklarda poliploid qatorlar bo'lib ularda xromosoma soni $2n$, ... $10n$ gacha boradi. Gulli o'simliklarda ko'p avlodlar poliploid qatorlardan iborat.

Allopoliploidlar har xil turga mansub xromosomalarning birlashishidan hosil bo'ladilar. Ular odatda turlararo duragay organizmlardagi xromosoma to'plamini karra ortishi tufayli hosil bo'ladilar. Bunday formalarni tabiatda paydo bo'lishi mumkinligi tajriba yo'li bilan isbotlanilgan. Masalan, XX asrning 20-yillarida **G.D.Karpechenko** karam (*Brassica oleraceae*) bilan turp (*Raphanus sativus*)ni chatishtirib duragay olgan. Bunday avlodlararo duragaylarning vegetativ organlari kuchli rivojlansa ham ular pushtsiz bo'lgan. Chuqur avlodlararo duragaylarda xromosomalar soni 18 bo'lsa ham, ularning 9 tasi karamga 9 tasi turga tegishli bo'lgani sababli ularning univalentlari

bir-biri bilan kon'yugatsiyalananmaydi va oqibatda gametalarni hosil bo'lishi normal bormaydi. G.D.Karpechenko urug'chi va changchi gametalarning ayrimlari ikki avlodning xromosomalar yig'indisiga ($9R+9B$) ega ekanligini aniqladi. Bunday diploid to'plamli xromosomaga ega urug'chi va changchi gametalarni o'zaro chatishishidan 36 xromosomalni tetraploid nasl beruvchi o'simliklar olindi. Tabiatda turlararo duragaylanish oqibarda har xil tur xromosomalarini bir organizmda mujassam bo'lish imkoniyati tug'iladi. Bug'doyning tetraploid va geksoploid, 28, 42 xromosomalni g'o'zaning tetraploid xromosomalni turlari mavjudligi bunga yorqin misoldir. (52-rasm)

Akademik A.Abdullayev fikriga ko'ra g'o'zaning 52 xromosomalni turlari eski va yangi dunyo g'o'zalarining $2p=26$ xromosomalni turlarini o'zaro chatishishidan hosil bo'lgan F_1 duragaylarning xromosomalarini ikki marotaba ortishi hisobiga ro'y bergen bo'lishi mumkin.

Aneuploidiya yoki heteroplaidiya hodisasi xromosomalar karra ortishi emas, aksincha, son jihatdan ortishi yoki kamayishi bilan aloqador. Ayrim holatlarda meyoz jarayonida xromosomalar ikki qiz hujayraga teng taqsimlanmasligi mumkin. Bunday holat natijasida bir gametaga bitta, ikkita yoki uchta xromosoma ortiqcha, ikkinchi gametaga shuncha xromosoma kam taqsimlanadi. Agar zigitada 1 xromosoma ortiqcha bo'lsa trisomik, bir juft kam bo'lsa nullisomik deb ataladi. Xromosomalarning son jihatdan ortiqcha yoki kam bo'lishi fenotipda bir qancha o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. U ayniqsa odamlarda va hayvonlarda kamomatlikga sababchi bo'ladi. Odamlarda 13, 18 xromosomalarini bittaga ortib ketishi oqibatida Patau, Edvards sindromi kuzatiladi. Bunday xromosoma to'plamiga ega bolalar tana tuzilishi, organlar sistemasida juda ko'p g'ayritabiyy o'zgarishlar sodir bo'lgani uchun ular o'lik holda tug'iladi yoki tug'ilalar ham tezda o'ladir.

Agar o'simlik changida bitta ortiqcha xromosoma bo'lsa, u changchini hosil etmaydi, urug'chi hujayrasida bitta ortiqcha xromosoma bo'lgan taqdirda u hayotchan bo'ladi.

Odatda, hujayrada yadrodagisi asosiy xromosomalar (A tipidagi) dan tashqari qo'shimcha (B tipidagi) xromosomalar ham uchraydi. B tipidagi qo'shimcha xromosomalar ikki urug'pallali o'simliklarning 510 turida, bir urug'pallali o'simliklarning 1007 turida, hasharotlarning 40% turida topigan. B tipidagi xromosomalar to'liq geteroxromatindan tashkil topgan bo'sib organizm rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. B xromosomaning qanday vazifa bajarishi hali aniqlanmagani.

7. Tabiiy va sun'iy mutatsiyalar

Tabiiy muhitda paydo bo'lgan mutatsiyalar tabiiy yoki spontan, sun'iy sharoitda olingan mutatsiyalar sun'iy mutatsiyalar deb ataladi.

Tabiiy mutatsiyalar: genning yangi holati bo'lib, u kabi turg'undir. Tabiiy mutatsiyalarning paydo bo'lishi sababları turli. Odatda mutatsiya

organizmlarga tashqi muhit omillari radiatsiya, yuqori yoki past harorat kimoviy moddalar ta'sirida paydo bo'ladi. Mutatsiyaning hosil bo'lishida ichki sabablar, chunonchi, gen mutatorlar, metabolitlar ta'siri, autoreproduksiyadagi xatoliklar, shuningdek krossingover muhim rol o'ynaydi.

Tabiiy mutatsiyalar to'g'risidagi tasavvurlar XX asrning 60 yillarda gentarning o'z-o'zini hosil etishi, reparatsiya va genlarning rekombinatsiyasi, shuningdek ularga sababchi ferment sistemasi ochilgandan so'ng shakllandi. Dastlabki paytda gen mutatsiyalar DNK sintezida qatnashadigan fermentlar faoliyatidagi xatoliklar sababchi degan faraz mavjud edi. Hozirgi davrga kelib mazkur faraz deyarli barcha olimlar tomonidan e'tirof qilindi. Insonlar tabiiy mutatsiyalardan seleksiya ishlariда foydalaniib kelganlar. Bunga misol tariqasida ankon qo'y zotini chiqarish tarixini olish mumkin. 1791 yil AQShning Massachusetts shtatida ona qo'ydan kalta, qiyshiq oyoqli qo'zichoq tug'ilgan. U boqilgandan so'ng yirik qo'yga aylangan. Bu erkak qo'y ona qo'y bilan chatishtilganda qisqa, qiyshiq oyoqlilik belgisi avlodga berilgan. Fermerlar ana shu qo'ylni boqish osonligini e'tiborga olib ko'paytirganlar va shu tariqa kalta oyoqli ankon qo'y zoti yaratilgan. Bunday tabiiy mutatsiyalar o'simlik va hayvonlar, odamlarda ko'plab uchraydi. Masalani, bug'doy rangli yoki qora tanli odamlar orasida oq tanli – albinos bolalarni tug'ilishi yoki qon ivimasligi – gemofiliya kasali paydo bo'lishi bunga yorqin misoldir.

XX asrning 30-yillariga kelib olimlar sun'iy mutatsiyalarni olishga muvaffaq bo'ldilar. 1925 yili **G.A.Nadson** va **G.S.Filippovlar** achitqi zambarug'larida rentgen nurlari yordamida mutatsion jarayonni ko'p marotaba tezlashtirish mumkinligini tajriba orqali isbotladilar.


55 - rasm. Biologik obyektlarni nurlantirish uchun gamma-qurilma.

1 - ko'tarish mexanizmi.

2 - nurlantiriladigan obyekt joylashiriladigan kamera. 3 - avtomatik boshqarish pulti:

4 - suv bilan to'ldirilgan bak.

5 - radioaktiv kobalt (^{60}Co) dan iborat olita o'zak. 6 - avariymiy otsek probkasi. 7 - avariyniy otsek.




1927-yili esa Amerika genetigi **G.Myoller** rentgen nurlari drozofila meva pashshasida ham mutatsiyalar hosil qilishini isbotladi. Keyinchalik kimyoviy, fizikaviy omillar ta'sir ettirish natijasida boshqa o'simliklar zamburug', hayvonlarda ham ko'plab sun'iy mutatsiyalar olindii. Xususan, respublika olimlaridan akademik **Sh.Ibragimov** va **R.I.Kovalchuk**, akademik **N.Nazirov**, akademik **O.Jalilov**, professor **F.Djanikulov**larning bu sohadagi yutuqlari diqqatga sazovor. **O.Jalilov** radiatsion selektsiya asosida g'o'zaning serhosil, tezpishar *AN-402*, *Oq oltin*, *Farhod*, *Samarqand-3*, *Yulduz* navlarini yaratdi. Sun'iy mutatsiyalarni hosil etishda rentgen, kobalt (⁶⁰Co) yoki nurlari kabi fizik omillardan, etilenamin, etilmetsulfat, dimetsulfat, nitrozoetilmochevina, nitrozometilmochevina kabi kimyoviy moddalardan foydalanildi.

8.Retsessiv mutatsiyalarni aniqlash metodlari

Retsessiv mutatsiyalarni aniqlash mumkinligi drozofila tanasining sariq rangini irlaylanishi misolida oldinroq ko'rib o'tilgan edi. Keyinchalik mashhur genetik T. Morganning shogirdi G.Meller gomozigota holatda letallik xossaga ega retsessiv mutatsiyani drozofilalarda aniqlash uchun maxsus CIB (si-el-bi) metodini joriy etdi. Mabundo metodning afzalligi shundan iboratki, urg'ochi drozofilaning ikkita jinsiy X xromosomasining birida ko'zda dog' hosil etuvchi dominant gen B (Bar) bor bo'lib, yana inversiya geni-C ham mavjud. Y X jinsiy xromosomalar o'rtasida ro'y xossasiga ega. Agar CIB mutatsiya zigotaning xar ikki X xromosomasida bo'lsa, bunday urg'ochi drozofila letal gen gomozigota holatda bo'lganligi sababli o'ladi. Mabundo ikkita X jinsiy xromosomasining birida CIB, bo'lsa, urg'ochi organizm o'lmaydi. Chunki boshqa X xromosomada genlar normal holatda bo'lib, uning ustidan dominantlik qiladi. Mabundo erkak drozofilada X xromosomada letal mutatsiya kuzatilmasa, u holda SIB mutatsiyaga ega urg'ochi drozofila normal erkak drozofila bilan chatishirilganda F_1 da $2\text{♀} : 1\text{♂}$ kuzatiladi chunki, 50 duragay erkak drozofilalarning CIB li letal mutatsiyali genga ega bo'lgani sababli halok bo'ladi. Agar chatishirishda qatnashgan erkak drozofilaning X xromosomasida letal mutatsiya sodir bo'lsa, u holda 56-rasmida ko'rsatilgandek F_2 da barcha erkak drozofilalar o'ladi. Ularning yarmi CIB dagi retsessiv letal mutatsiya, qolgan yarmi esa chatishirishda qatnashgan erkak drozofilaning X xromosomasidagi retsessiv mutatsiya tusayli sodir bo'ladi.

G.Meller autosomalarda uchragan retsessiv mutatsiyalarni aniqlash uchun boshqa metodni ixtiro qildi. Y CyL Pm (ku-el-piem) metodi deb ataladi. 57- rasmda ko'rib turganingizdek chap tomonda Cu-qanotni

qayrilganligi bilan ko'zning kichrayishini ifoda qiluvchi **L geni** bor. Isteletalligi gomozigota holatda fenotipda namoyon bo'ladi. Autosomali ikkinchi gomologiyasida Pm geni joylashib u ko'zning qo'ng'ir rangini ifoda qiladi. Shunday autosomali urg'ochi drozofila mutatsiyasi uchramagan erkak drozofila bilan chatishirilsa F_1 da erkak va urg'ochi drozofilalar yashovchan bo'ladilar.



56 - rasm. Jins bilan birikkan retsessiv mutatsiyalarni drozofilada aniqlash usuli.

1 – erkak organizm X xromosomasida letal mutatsiya bo'lganligi holatda chatishirish usulasi.


2 – erkak organizm X xromosomasida letal mutatsiya bo'lganligi holat. C – inversiya. L – letal mutatsiya. B – ko'zda dog'ning bezishi.

Agar CyL Pm genlari bor urg'ochi drozofilaning birinchi avlodagi CyL xromosomali urg'ochi erkak drozofila bilan o'zaro chatishirilsa olingan ikkinchi avlodning 25% drozofilalarda CyL retsessiv geni ega autosomalar gomozigota holatda bo'lgani sababli o'ladi. Bunday holida duragay drozofilalarning uchinchi avlodida ham kuzatiladi.

Mabundo chatishirishda qatnashgan erkak drozofilaning ikki juft autosomalarning birida letal mutatsiya amalga oshgudek bo'lsa, u holda uchinchi avlodda drozofilalarning 50% o'ladi. O'lganlarning yarmi esa erkak genlarga ega autosomalarning gomozigota holati, yarmi esa erkak drozofilaning ikki juft autosomaning birida yuz bergan letal mutatsiyali autosomaning gomozigota holatda bo'lishi tusayli ro'y beradi.

Nishonlangan urg'ochi organizmning ikkinchi xromosomasida ham inversiya mavjud bo'lib fenotipda **Pm** – ko'zning qo'ng'ir rangini namo-

yon qiladi. *CyL/Pm* metodi orqali nishonlangan pashshalar bilan taxlij qilinuvchi pashshalarning chatishirishdan maqsad, keyingilarda retsessiv letal xususiyatga ega bo'lgan xromosomani gomozigota holatiga kelurish va uni fenoti pda namoyon bo'lishini aniqlashdan iboratdir. Buning uchun chatishirishni F_1 avlodgacha olib boriladi.



normalligi; *L* - ko'z hajmining kichrayganligini, gomozigota holatga letal xossaga ega. *Pm* - ko'zning jigar rang bo'lishligi, *Pm⁺* - ko'zning qizil rangini ifodalaydi.

Agar tahlil qilinuvchi organizm autosomasida retsessiv letal mutatsiya bo'limasa F_1 avlodda 1:1 *CyL* genlari mayjud va normal organizmlar, autosomasida retsessiv letal mutatsiyasi mavjud organizmlar bilan chatishirilsa faqat *CyL* genlari bo'lgan organizmlar paydo bo'ladi.

Savollar va topshiriqlar

- O'zgaruvchanlikka ta'rif bering. U necha xilga bo'linadi?
- Irsiy o'zgaruvchanlik qanday xillarga ajratiladi?
- Mutatsion o'zgaruvchanlikning qanday xillari bor?
- Gen mutatsiyalarini tushuntiring.
- Tranzitsiya, transversiya nima?
- Xromosoma mutatsiyalarini qanday xillarga ajratiladi?
- Genom mutatsiyalarining qanday xillari bor?
- Autopoliploidiya bilan allopoliploidiyanı taqqoslang. Ular orasidagi o'xhashlik va farqni tushuntiring.

- Gen mutatsiyalarini qanday xillarga bo'linadi?
- Translokatsiya bilan duplikatsiyani taqqoslang. Ularning fargini tushuntiring.
- Transpozitsiya nima?
- Sun'iy mutatsiyalar bilan tabiiy mutatsiyalarni taqqoslang. Ular o'rtaisdagi o'xhashlik va tafovutni yoriting.
- Retsessiv mutatsiyalarini aniqlash usuli deganda nimani tushunasiz?
- CLB (si-el-bi) usulini kim joriy etgan, uni izohlang.
- CyLPm* metod tafsilotini jadval orqali tushuntiring.

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

- Irsiylanmaydigan o'zgaruvchanlik qanday nomlanadi?
 - Kombinativ
 - Rekombinativ
 - Mutatsion
 - Modifikatsion
- Xromosom abberatsiyasi bu... bog'liq mutatsiyadir.
 - Xromosomalarning ayrim qismlarini uzulishi bilan
 - Xromosomalarning ba'zi bir qismlarini ikki marotaba ortishi bilan
 - Xromosomaning ayrim qismini 180°ga aylanib qolishi bilan
 - A-C
- Ikkita nogomologik xromosomalarning o'zaro ayrim bo'laklari bilan o'rin almashishi qanday nomlanadi?
 - Transpozitsiya
 - Translokatsiya
 - Transpoza
 - Inversiya
- Xromosomalar sonining karrali ortishi qanday nomlanadi?
 - Geteroploidiya
 - Poli ploidiya
 - Aneuploidiya
 - Pleyotropiya
- Xromosoma sonini kamayishi qanday ataladi?
 - Avtopoli ploidiya
 - Poli ploidiya
 - Aneuploidiya
 - Pleyotropiya

6. *Allopoliploidiya usulini tajriba yo'li bilan isbotlagan olim.*

- A. Barbara Mak Klintok
- B. G. Vinkler
- C. S. G.D.Karpechenko
- D. I.I.Gerasimov

7. *Achitqi zamburug'larida rentgen nurlari ta'sirida mutatsiya hosil qilgan omillar.*

- A. G.A.Nadson va G.S.Filippov
- B. G.Myoller va G.A.Nadson
- C. O.Jalilov va N.Nazirov
- D. Sh. Ibragimov va R.I.Kovalchuk

8. *G'o'zaning yangi navlarini yaratishda mutatsiya usullarini qo'llagan olim.*

- A. De Friz
- B. T.Morgan
- C. S. O.Jalilov
- D. G.D.Karpechenko

13§. Modifikatsion o'zgaruvchanlik
Tayanch tushunchalar: Modifikatsion o'zgaruvchanlik, morfozlar, reaksiya normasi, variatsiya qatorlar, poligon, o'rtacha arifmetik qiymati, taqsimot standarti, variatsiya koefitsienti, arifmetik qiymatning xatosi.

1. Modifikatsion o'zgaruvchanlik haqida tushuncha

Organizmlardagi o'zgaruvchanlik faqat irlisy omillarga bog'liq bo'lmaydi. Ko'pgina hollarda organizm yashash muhitni omillari ta'sirida ham o'zgaruvchanlik sodir bo'ladi.

Tashqi muhit omillari ta'sirida vujudga keladigan fenotipi tafovutlar modifikatsion o'zgaruvchanlik deb ataladi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik populyatsiyadagi ko'pchilik organizmlarga xos muhitning bunday ta'sir ogibati kelgusi avlodlarga berilmasligi bilan tavsiflanadi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik bo'yicha to'plangan ma'lumotlar nuklein kislotalardagi irlisy axborot qanday qilib fenotipda namoyon bo'lishini tushunishga yordam beradi. Shuni ta'kidlash lozimki har qanday tirik mavjudotning morfologik, fiziologik, biokimyoviy belgi-xossalari majmuasi ya'ni shu organizm rivojlanayotgan muhitning xilma-xil omillari ta'sirida ro'yobga chiqadi.



hosildorligi, sigirlarda sut miqdorining reaksiya normasi keng, g'o'zada ko'sakning hajmi, sigirlar sutidagi yog' miqdori belgilarining reaksiya normasi o'rtacha, g'o'zadagi tola rangining, shoxli qoramollarda yung rangi belgilarining reaksiya normasi niyoyatda tor hisoblanadi.

Modifikatsion o'zgaruvchanlik tabiatda keng tarqalganligi sababli u poligenlar ta'sirida irlashtirilishi yoki tashqi muhit ta'sirida hosil bo'ladimi degan masala munozaraga sababchi bo'ldi. Bu munozaraga XX asrning boshida V.Iogannsen tajribalari natijasida yakun topdi. U arpa, no'xat, loviya o'simliklarda kuzatish olib bordi. Olim tashqi muhit ta'sirida paydo bo'lgan modifikatsion o'zgaruvchanlik avloddan-avlodga berilmasligini isbotlab berdi. Vaholanki genlar ta'sirida paydo bo'ladigan o'zgarishlar avloddan-avlodga beriladi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik irlashtirilishi ham organizmning o'zgargan tashqi muhit sharoitida moslanishida, evolyutsion jarayonda har bir organizm turining saqlanib qolishida muhim ahamiyat kasb etadi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik qonuniyatları matematik - statistik usulda o'rGANILADI.

2. Modifikatsion o'zgaruvchanlikni matematik -statistik usulda o'rGANISH

O'simlik va hayvonlardagi har qanday belgi genotipga muhitning ta'siri tufayli vujudga keladi. Odatta, bir xil genotipga ega organizmlar turli sharoitda har xil fenotiplarni hosil qiladi. Muhit ta'sirida paydo bo'ladigan hamda avloddan-avlodga berilmaydigan o'zgaruvchanlik **modifikatsion o'zgaruvchanlik** deb ataladi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik qonunini ochish ochish faqat matematik-statistik usullar yordamida amalga oshiriladi. Biroq mazkur usulda ishlash uchun bir qancha sharoitlar mavjud bo'lishi shart.

1. O'rGANILAYOTGAN o'simlik va hayvon genotip bo'yicha o'xshash bo'lishi;

2. O'rGANILISHI lozim bo'lgan u yoki bu belgi o'lchanayotganda yoki sanalayotganda bir xil aniqlik bo'lishi;

3. Kuzatish bir necha marotaba takrorlanishi;

4. Tahlil uchun hamma o'simlik, hayvon emas, balki ularning ma'lum guruhini olish kerak.

Organizmlarda sisfat belgilaridan tashqari miqdor belgilar ham mavjud. Miqdor belgilar muhit sharoti ta'sirida u yoki bu tomonga o'zgarishi tabiiy bir hol. Shunga binoan matematik-statistik usul o'zgaruvchan belgining o'rtacha qiymatini topishga qaratiladi. Shundan keyingina belgining o'rtacha qiymati o'zgaradimi degan muammo hal etiladi. Odatta matematik-statistik usul yordamida avvalo variatsion

gator tuziladi va belgining minimum hamda maksimum qiymati aniqlanadi. Tajriba uchun olingan guruhlarning kengligi – ΔX barcha guruhlar uchun bir xil bo'jadi hamda u katta (X_{\max}) va kichik (X_{\min}) variantlar ayirmasining guruhlar soni (R) ga nisbati bilan aniqlanadi ya'ni

$$\Delta X = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{R}$$

Tabiiy ravishda guruhlar tarkibiga kiruvchi variant bir xilda uchrayvermaydi. Odatda variatsiya qatoridagi chekka variantlar kam, o'rtadagilari esa ko'p takrorlanadi. Buni bilish uchun har bir guruhga kiruvchi variantlarning takrorlanish soni (f)ni aniqlash kerak. Yuqoridagi nazariy mulohazalarni konkretlashtirish maqsadida g'o'zaning G.hirsutum turiga kiruvchi *Tizma-5* navining har bir ko'sagidan olingan paxtani o'chash natijasida tubandagi natija olingan (g. hisobida):

9-jadval

1. 5,43	21. 5,18	41. 5,36	61. 5,35	81. 5,63
2. 5,53	22. 5,46	42. 5,47	62. 5,31	82. 5,39
3. 5,38	23. 5,37	43. 5,26	63. 5,32	83. 5,40
4. 5,44	24. 5,46	44. 5,45	64. 5,28	84. 5,47
5. 5,39	25. 5,24	45. 5,25	65. 5,41	85. 5,42
6. 5,56	26. 5,39	46. 5,44	66. 5,39	86. 5,46
7. 5,40	27. 5,43	47. 5,45	67. 5,40	87. 5,49
8. 5,56	28. 5,44	48. 5,44	68. 5,42	88. 5,44
9. 5,39	29. 5,46	49. 5,45	69. 5,48	89. 5,52
10. 5,57	30. 5,45	50. 5,47	70. 5,52	90. 5,50
11. 5,53	31. 5,33	51. 5,37	71. 5,41	91. 5,50
12. 5,54	32. 5,35	52. 5,34	72. 5,62	92. 5,44
13. 5,33	33. 5,23	53. 5,29	73. 5,42	93. 5,57
14. 5,34	34. 5,46	54. 5,30	74. 5,38	94. 5,45
15. 5,36	35. 5,45	55. 5,31	75. 5,51	95. 5,59
16. 5,48	36. 5,46	56. 5,40	76. 5,52	96. 5,46
17. 5,49	37. 5,28	57. 5,32	77. 5,50	97. 5,58
18. 5,55	38. 5,47	58. 5,49	78. 5,66	98. 5,44
19. 5,47	39. 5,44	59. 5,50	79. 5,71	99. 5,60
20. 5,45	40. 5,43	60. 5,51	80. 5,68	100. 5,61

Olingan raqamlar orasida $X_{\max} = 5,68$ g, $X_{\min} = 5,18$ g dan iboratligi


ma'lum bo'ldi. Ular orasidagi farq, ya'ni $\Delta X = X_{\max} - X_{\min} = 5,68 - 5,18 = 0,50$ ga teng.

Shundan keyin har bir guruh orasidagi kenglikni 0,05 ga teng deb olib jadval tuziladi.

Guruhlarning chegarasi	Guruhlarning o'rtaşı (X)	Takrorlanish soni (f)
5,18 – 5,22	5,20	1
5,23 – 5,27	5,25	4
5,28 – 5,32	5,30	7
5,33 – 5,37	5,35	11
5,38 – 5,42	5,40	16
5,43 – 5,47	5,45	30
5,48 – 5,52	5,50	14
5,53 – 5,57	5,55	8
5,58 – 5,62	5,60	6
5,63 – 5,67	5,65	2
5,68 – 5,72	5,70	1
		$n = \sum f = 100$

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rinish turibdiki variatsiya qatorlar barcha guruhlarda bir xilda takrorlanmayapti. Bu hol ayniqsa variatsiya qatorining egri chizig'i yasalganda ko'zga yaqqol tashlanadi. Variatsiya

qatori egri chizig'ini yasash uchun koordinatalar sistemasidan foydalanish kerak. Bunda absissa o'qiga variatsiya qatoridagi guruhlarning qiymati, ordinatasiga esa shu guruhlarning takrorlanish soni yoziladi. So'ngra absissa va ordinata o'qlaridagi proporsional nuqtalar chiziq bilan tutashtiriladi. Hosil bo'lgan egri chiziq **poligon** deb ataladi.



58-paqm. Variatsiya qatorining egri chizig'i.

10-jadval

Grafikning qubba shaklidan ko'rinish turibdiki, uning yuqori cho'qqisiga eng ko'p takrorlanuvchi variantlar, ikki yon tomondagi pastki qismlariga kam takrorlanuvchi variantlar to'g'ri keladi. o'rganilayotgan belgining o'rtacha arifmetik qiymati $\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f}{n}$ formulasiga muvofiq aniqlanadi.

Bunda X_i – variantlar, f – ulardan har birining takrorlanish darajasi, n – tekshirilayotgan obyektlarning umumiy soni, \bar{X} – belgining o'rtacha arifmetik qiymatini bildiradi.

11-jadval

Guruhlarning chegarasi	Guruhlarning o'rtaşı (x)	Takrorlanish soni (f)	$X_i \cdot f$
5,18 – 5,22	5,20	1	2
5,23 – 5,27	5,25	4	21,00
5,28 – 5,32	5,30	7	37,10
5,33 – 5,37	5,35	11	58,85
5,38 – 5,42	5,40	16	86,40
5,43 – 5,47	5,45	30	163,50
5,48 – 5,52	5,50	14	77,00
5,53 – 5,57	5,55	8	44,40
5,58 – 5,62	5,60	6	33,60
5,63 – 5,67	5,65	2	11,30
5,68 – 5,72	5,70	1	5,70
			544,05

Agar guruhlar o'rtacha kvadratini ularning takrorlanish darajasiga ko'paytirib olingan raqamni o'rtacha arifmetik qiymatga taqsimlasak, u holda $\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f}{n} = \frac{544,05}{100} = 5,44$ ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi.

Binobarin o'rganilayotgan obyektning umumiy tasnididan tashqari belgining o'zgarishini ham baholash zarur. Belgining o'zgarishi ko'lami buni aks ettiradi. Lekin u unchalik ishonarli bo'lmaydi. Masalan, g'o'zaning Tizma-5 navidan olingan 100 ko'sak ichida maksimal vazndagisi 5,68 g, minimal vazndagisi 5,18 ga teng. Xuddi shu Tizma-5 dan yana 100 ko'sak olib o'chansa, yuqorida qayd etilgan chetki variantlardan tashqari maksimalroq va minimalroq variantlar uchrashi mumkin. Shu sababli

ikkinchi holda o'zgaruvchanlik ko'lami ko'paygandek bo'lib tuyuladi. o'zgaruvchanlik ko'laminan yanada to'g'ri ifodalash uchun variatsiya qatorining ikkinchi parametri - **taqsimot standartidan foydalilanadi**. Mazkur parametr σ (sigma) bilan ifodalanadi.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2 f}{n-1}}$$

σ ni aniqlash uchun har bir obyekt qiymatidan o'rtacha arifmetik qiymat ayirib tashlanadi va olingen farq kvadratga ko'tariladi. Kvadratlar yig'indisi ($n-1$) ga bo'linib ildizdan chiqariladi.

Shunday qilib y modifikatsion o'zgaruvchanlik vazifasini o'taydi. Obyektlar ichida bir xil qiymatli variantlar uchraganligi sababli taqsimotning standartini topish formulasiga o'zgartirish kiritish mumkin.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2 f}{n-1}}$$

formulaga asoslanib jadvalning 5-7 bo'limlari to'ldiriladi.

Guruhlarning chegarasi	Guruhlarning o'rtasi (X)	Takrorlanish soni (f)	Xf	$X-X$	$(X-X)^2$	$(X-X)^2 f$	12-jadval	
5,18 – 5,22	5,20	1	5,20	-0,240	0,058	0,058		
5,23 – 5,27	5,25	4	21,00	-0,191	0,036	0,145		
5,28 – 5,32	5,30	7	37,10	-0,141	0,020	0,138		
5,33 – 5,37	5,35	11	58,85	-0,091	0,088	0,090		
5,38 – 5,42	5,40	16	86,40	-0,041	0,002	0,026		
5,43 – 5,47	5,45	30	163,50	-0,009	0,001	0,003		
5,48 – 5,52	5,50	14	77,00	0,059	0,004	0,049		
5,53 – 5,57	5,55	8	44,40	0,110	0,012	0,096		
5,58 – 5,62	5,60	6	33,60	0,159	0,025	0,153		
5,63 – 5,67	5,65	2	11,30	0,210	0,044	0,088		
5,68 – 5,72	5,70	1	5,70	0,259	0,0767	0,067		
		$n=\sum f=100$	544,05			0,913		

Jadvalning 7 - bo'limida kvadrat ildiz ostidagi kasr suratining qiymati aniqlangan. Shunga binoan $\sigma = \sqrt{\frac{0,913}{100-1}} = 0,096$ ga teng.

Biroq yning o'zi o'rganilayotgan obyektlarning o'zgaruvchanligini to'liq tavsiflab bera olmaydi. Turli arifmetik qiymatli belgilarning o'zgaruvchanligini taqqoslash uchun nisbiy miqdor V – variatsiya koefitsienti degan miqdor ishlataladi va u tubandagi formula bilan topiladi:

$$V = \frac{\sigma}{\bar{X}} \cdot 100$$

Bunda V – variatsiya koefitsienti foizlar bilan ifodalanib, o'rtacha arifmetik qiymat X ning qanday qismini tashkil etishini ifodalaydi.

$$V = \frac{\sigma}{\bar{X}} \cdot 100 = \frac{0,096}{5,44} \cdot 100 = 1,77\%$$

O'rtacha arifmetik qiymat bir obyektdan olingen turli tanlamalarda har xil bo'lishi mumkin, ya'ni obyektni mutlaq holda tavsiflab bera olmaydi. Shu sababli arifmetik qiymat bilan birga o'rtacha arifmetik

qiymatning xatosi degan miqdor ishlataladi va u $m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ formula bilan topiladi.

O'rtacha arifmetik qiymatning xatosi (m) o'zgaruvchanlikka to'g'ri proportional, kuzatishlar soni (n) ga teskari proportionaldir. O'rtacha arifmetik qiymatning xatosi: $m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,096}{\sqrt{100}} = 0,096$ g.

Demak, g'o'zaning Tizma- 5 navida ko'sakning o'rtacha vazni $\bar{x} = 5,44$ g, $\sigma = 0,096$, $V = 1,77\%$, $m = 0,0096$ g ga teng ekan.

Savol va topshiriqlar

- Modifikatsion o'zgaruvchanlik mutatsiyadan nimasi bilan farq qiladi?
- Modifikatsion o'zgaruvchanlikning qanday ahamiyati bor?
- Belgini reaksiya normasi nima?
- Belgini variatsiya egri chizig'i qanday yasaladi?
- Variatsiya egri chizig'ida eng yuqori cho'qqi nimani anglatadi?
- Belgini o'rtacha arifmetik qiymati qanday aniqlanadi?
- Variatsiya koefitsienti nimani ifodalaydi?
- Arifmetik qiymatning xatosi qanday formula bilan aniqlanadi?
- Polygon nima? Undagi absissa va ordinata o'qlari nimani anglatadi?

3. Genetik kod

Genlarda oqsil molekulasining birlamchi tuzilishi to‘g‘risida 16 tasi chetda qolar deb degan g‘oya dastlab F.Krik tomonidan ilgari surilgan. Bu g‘oya qo‘sma aminokislotalar gendagi nukleotidlar izchilligiga ko‘ra oqsil tarkibida aminokislotalar joylanishi tartibi amalga oshadi. Oqsil tarkibida 20 xil aminokislota bor. Vaholanki, DНKdagи nukleotidlar atigi to‘rt xil. Mabodo bir nukleotid bir aminokislotani oqsil tarkibiga kiritishda qatnashadi deb faraz qilsak, unda oqsil tarkibi 4 xil aminokislotadan tashkil topib 16 tasi chetda qolar edi. Agar ikki nukleotid kombinatsiyasi aminokislotalarni oqsil tarkibiga kiritadi deb o‘ylasak, u holda oqsil molekulasi 16 xil aminokislotadan iborat bo‘lar, 4 aminokislota chetda qolar edi. Shunga ko‘ra bir aminokislota polipeptid zanjiriga uchta nukleotid kombinatsiyasi orqali kiritiladi deb o‘ylaylik. U holda $4^3 = 64$ aminokislota polipeptid tarkibidan o‘rin olgan bo‘lar edi. Lekin oqsil tarkibidagi aminokislotalar yugorida qayd etilganidek atigi 20 xil. Modomiki shunday ekan, u holda bir aminokislota bittadan ortiq triplet yordamida oqsil tarkibiga kiritiladi deb faraz qilamiz.

I3-jadval

Genetik kod		Triplettagi nukleotidlar izchilligi				Uchinchi nukleotid
Birinchи nukleotid	Ikkinchi nukleotid			Uchinchi nukleotid		
	U	S	A	G		
U	UUU fenilalanin	USU serin	UAU tirozin	UGU sistein	U	
	UUS alanin	USS	UAS	UGS	S	
	UUA leysin	USA	UAA *	UGA *	A	
	UUG	USG	UAG *	UGG triptofan	G	
S	SUU leysin	SSU prolin	SAU gistidin	SGU	U	
	SUS	SSS	SAS	SGS	S	
	SUA	SSA	SAA glutamin	SGA arginin	A	
	SUG	SSG	SAG	SGG	G	
A	AUU izoleysin	ASU treonin	AAU	AGU serin	U	
	AUS	ASS	AAS asparagin	AGS	S	
	AUA	ASA	AAA	AGA arginin	A	
	AUG metionin	ASG	AAG lizin	AGG	G	
G	GUU valin	GSU alanin	GAU asparagin	GGU	U	
	GUS	GSS	GAS kislota	GGS glitsin	S	
	GUA	GSA	GAA glutamin	GGA	A	
	GUG **	GSG kislota	GAG kislota	GGG	G	

Yugoridagi mulohazalarga suyangan bir guruh olimlar (X.Korana, M.Nirenberg, S.Ochoa)ning sayi-harakati tufayli 1965 yilga kelib barcha aminokislotalarni tripletlari aniqlandi va ularga asoslanib genetik kod jadvali tuzildi. Genetik koddagи nukleotidlar izchilligini aniqlash ikki xil metod asosida amalga oshirildi. G.Korana o‘z shogirdlari bilan genni laboratoriya da kimyoviy yo‘l bilan sintez qildi, so‘ngra polidezoksiribonukleotid asosida hujayradan, tashqarida qaysi triplet qanday aminokislotani polipeptid bog‘ tarkibiga kiritishini aniqladi.

M.Nirenberg va P.Leder esa qaysi tRNK qanday aminokislotani tanib ribosomaga tashishini kuzatdi va kuzatishlaridan xulosa chiqardi.

Olib borilgan tadqiqotlardan ma‘lum bo‘ladiki aminokislotalardan metionin, triptofan bittadan triplet orqali polipeptid zanjiriga qo‘shiladi. Tirozin, sistein, fenilalanin, gistidin, glutamin, asparagin, lizin ikkitadan, izoleytsin esa uchtdan triplet yordamida, prolin, treonin, alanin, glitsinlar to‘rtidan, leytsin, arginin, serinlarni olti xil tripletlari ishtirokida polipeptid tarkibidan o‘rin oladilar. 1981 yilga qadar Er yuzidagi barcha organizmlarda genetik kod bir xil degan fikr keng tarqalgan edi. Lekin keyinchalikodam hujayrasidagi mitoxondriyaDNK tripletlarining funksiyasi o‘rganilganda hujayra yadrosidagi genetikkoddan farqli ravishda AUA tripleti izoleytsin o‘rniga mitoxondriya genetik kodida metioninni sintezlashi, AGA va AGG tripletlari argininni emas, balki oqsil sintezini tugallanganligini bildiruvchi terminator kodon ekanligi isbotlandi.

4. Hujayrada oqsil biosintezi

Hujayralar tuzilishi va xossalari asosan undagi oqsillarga bog‘liq. Modomiki shunday ekan u holda ona hujayra qanday oqsillar sintezlasa, qiz hujayra ham shunday oqsillarni sintezlaydi. Oqsillar sintezi fan tarixida eng muhim muammolardan biri bo‘lib kelgan. Hozirgi vaqtga kelib bu muammo deyarli hal qilindi. Respublikaning mashhur olimi akademik Y.O.X.To‘raqulov qayd etishicha hujayradagi oqsillar sintezida yuzga yaqin fermentlar, maxsus oqsil faktorlar, 200 ga yaqin makromolekulalar qatnashadi. Makromolekulalarning ko‘pchiligini ribosomalar tashkil etadi. Oqsil molekulasi biopolimer bo‘lib, uning monomerlari aminokislotalar sanaladi. Har bir oqsil molekulasi aminokislotalar tarkibi izchilligi, soni shu oqsilga xos bo‘ladi. Oqsil strukturasini aniqlashda DНK asosiy rol o‘ynaydi. Oqsil molekulasiiga nisbatan DНK molekulasi bir necha o‘n, hatto yuz barobar uzun. DНKning har xil qismlari turli oqsillar

* - UAA, UAG, UGA tripletlari aminokislotalarni kodlamaydi, balki polipeptid zanjirni tugallanganini ifodalaydi.

** - GUG tripleti kod startini, ya‘ni polipeptid bog‘ sintezi boshlanganligini bildiradi.


sintezlanishida hal qiluvchi ro'li o'ynaydi. Lekin shuni qayd etish lozimki oqsil molekulasi sintezida DNKnинг о'зи bevosita ishtirot etmaydi, chunki u yadro tarkibida, oqsil esa sitoplazmadagi ribosomalarda sintezlanadi. Odadta oqsil strukturasi haqidagi axborot DNKda bo'ladi va saqlanadi. DNKdagi oqsil biosintezi to'g'risidagi axborotni RNK sintetaza fermenti iRNKga ko'chiradi, hosil bo'lgan iRNKlar esa ribosomalarga yo'naladi.

Hujayradagi oqsil biosintezi matriksali prinsipiغا asoslanadi. U transkripsiya hamda translyasiyadan iborat.

Transkripsiya - bu qo'sh zanjirli DNKdagi irliy axborotni bir qavay zanjirli RNKga ko'chirishdir.

Mazkur jarayon ferment orqali amalga oshiriladi. iRNK nusxa ko'chirishi DNK spiralining 5'-3' tomon yo'nalgan bo'ladi. Odadta organizm hayoti va rivojlanishi uchun zarur fermentlar va oqsillar interfazagacha ya'ni DNK sintezlanishi davrigacha ro'y beradi. Transkripsiya iRNK sintezi transkripsiyaning inititsatsiya qismidan boshlanadi. Bu sintezlanishi lozim bo'lgan gen oldidagi promotor qismdir. Promotor 80 nukleotidlardan juftligidan tashkil topgan. Virus va bakteriyalarda esa nukleotidlardan izchilligida AT juftligi tez-tez takrorlanganligi sababli u TATA izchilligi deb ham ataladi.

Transkripsiya tRNK polimeraza fermenti yordamida amalga oshadi. Eukariotlarda RNK polimerazani uch xil tipi mavjud. Ulardan biri iRNK, ikkinchisi RNK, uchinchisi tRNK sintez qilishda qatnashadi. iRNK sintezlanishi uchun RNK polimeraza fermenti promotorga mustahkam bog'lanadi.



62 - rasm.
Hujayrada oqsil
biosintezining sxemasi.


So'ngra bu ferment DNK molekulasi bo'ylab harakatlanib uning molekulasi ikkiga ajratadi. Ma'noli zanjir qismida komplementarlik prinsipiغا muvofiq adenin o'rniغا uratsil, guanin o'rniغا sitozin, timin o'rniغا adenin, sitozin o'rniغا guanin va boshqa nukleotidlardan sintezlana boshlaydi. iRNK sintezi yakunlanganini terminator tripletlar belgilaydi.

Terminator va promotordagi tripletlar izchilligi RNK polimeraza faoliyatini tartibga soluvchi maxsus oqsillar tomonidan bilinadi. iRNK bosh qismida metillashgan guanin joylashadi. U «qalpoq» deb nomlanadi.

Oqibatda polimeraza tomonidan sintezlangan iRNK DNK dan sekinkil bilan ajraladi (62-rasm).

Oqsil biosintezi to'g'risida mulohaza yuritilar ekan albatta prokariotlar bilan eukariotlar orasidagi DNK tuzilishidagi farqni bilish kerak. XX asrning 70 yillarigacha gen tuzilishi tuban organizmlar bakteriyalar va viruslarda o'rganilgan. So'ngra molekular genetika sohasida sutezemuvchilar, qushlar, yuksak o'simliklarning gen tuzilishiga qaratildi. Natijada bu organizmlarda gen tarkibi bir xil emastigi, unda aminokislotalarni kodlaydigan qismlar bilan bir qatorda aminokislotalarni kodlamaydigan qismlar borligi aniqlandi.

V.Djilbet taklifi bilan bunday qismlar ekzon va intron deb atala boshlandi. Tabiiyki bunday ekzon va intron qismi DNK qo'sh qavat zanjirida bo'lgani sababli transkripsiya paytida ular iRNK zanjiriga o'tadi. iRNK DNK qo'sh qavat zanjiridan ajralib yadro shirasiga tushgach, u yadro membranasi teshiklari orqali sitoplazmaga o'tish davrida eukariot hujayralarida DNKda sintezlangan pre-iRNK ko'p nukleotidlardan tashkil topgan bo'lsa, undan hosil bo'lgan iRNKda nukleotidlarni oz bo'ladi. Bunga sabab yetilmagan pre-iRNK tarkibidagi ekzon va intron qismlari bir-biridan ajraladi. So'ngra ekzon qismlari o'zarbo'lishib yetilgan pre-iRNK hosil etadi. pre-iRNKdan shunday yo'l bilan iRNK hosil bo'lishi splaysing deyiladi (63-rasm).



63 - rasm. Genning
kodlanuvchi va kodlanmovchi
qismlari.

Translyasiysi deganda to'rt xil nukleotiddan tashkil topgan iRNKdag irlsiy axborotni 20 xil aminokislotadan iborat polipeptid zanjiriga ko'chirish tushuniladi. Mazkur jarayon uch bosqichda amalga oshadi;

1. Aminokislotalarning faollashishi ya'ni aminokislotaning ATP ishtirokida adenozin monofosfat bilan birikib aminoatsil adenilat hosil qilish reaksiysi.

2. Faollashgan aminokislotalarni tRNKga birikishi. Bu maxsus aminoatsil sintetaza fermenti ishtirokida ro'y beradi.

Aminoatsil sintetaza fermenti har bir aminokislotu uchun o'ziga xos bo'ladi. tRNK yadroda sintezlansa ham sitoplazmada erkin holda bo'ladi. tRNKning bir molekulasi 76-85 nukleotiddan iborat. Uning tuzilishi beda bargiga o'xshash. tRNKning uch qismi nihoyatda ahamiyatlari sanaladi.

a) antikodon - bu uchta nukleotiddan tuzilgan bo'lib, u tRNKdagi triplet ketma-ketligini iRNKdagi tripletga komplementar mosligi. b) tRNK maxsus aminokislotaga birikkanligini aniqlovchi qismi. v) tRNKning aminokislotu joylashadigan akseptor qismi.

3. Translyatsiyani uchinchi bosqichi — faollashgan va tRNKga birikkan aminokislotalarni ribosomalarga tashib keltirish va iRNKdag nukleotildar izchilligi to'grisidagi irlsiy axborotning oqsil tarkibidagi aminokislotu izchilligiga ko'chirish ya'ni chin ma'nodagi translyasiyadir.

Translyasiyani **uchinchchi bosqichi** sitoplazmadagi ribosomalarda amalga oshadi. Ribosomani kattaligi prokariot va eukariot hujayralarida har xil. Prokariot hujayralarda uning kattaligi o'rtacha 30x30x20nm, eukariotlarda esa 40x40x20 nm ga teng. Ribosomalarning kattaligi sedimentatsiya birligi bilan o'chanadi. Sedimentatsiya maxsus ozuqa muhitida ribosomalarning sentrafugalashdagi cho'kish tezligini ifodalaydi.

Ichak tayoqchasi bakteriyasining ribosomasi ikki: katta va kichik qismidan tashkil topgan. Ular 64% ribosomal RNK, 36% oqsildan tuzilgan. Ichak tayoqchasi bakteriyasidan farqli o'laroq eukariotlar ribosoma subbirliklari birmuncha yirik.

Har bir ribosomada aminoatsil va peptidil markazlari bo'ladi. Birinchi aminokislotu (metionin) avvalo ribosomaning aminoatsil markaziga o'tashadi. Bu aminoatsil markazda metionin aminokislotasini ribosomaga olib kelgan tRNK antikodonini ribosomaning aminoatsil markazidan o'rinn olgan iRNK kodiga qarama qarshi joylashadi va kod bilan antikodon o'zaro birikadi. Shundan so'ng tRNK olib kelgan metionin aminokislotani ribosomaning katta bo'lagiga qoldiradi, o'zi esa aminoatsil markazdan peptidil markazga suriladi. Bo'shagan aminoatsil markazga keyingi iRNKning kodи joylashadi va u keyingi aminoatsil tRNK antikodonini bilan birikadi. Shu lahzadan boshlab translyasiyaning ikkinchi bosqichi elongatsiya amalga oshadi. Elangatsiya bu polinukleotid zanjirini uzayishi.

Oqibatda peptidil transferaza fermenti yordamida birinchi aminokislotaning karboksil guruhi (COON) ikkinchi aminokislotaning amino guruhi (NH_2) bilan birlashadi va ular o'rtasida peptid bog' (-CO-NH-) hosil bo'ladi. Natijada suv molekulasi ajraladi. Shunday usul bilan elongatsiya jarayonining keyingi bosqichlarida iRNK kodи tRNK antikodonini bilan ham ribosomaning aminoatsil markazidan peptidil markazga tRNK surilgan sari dipeptid, tripeptid, polipeptid sintezi davom etaveradi. Bunda albatta ribosomal translokaza fermenti elongatsiyani oqsil omili sifatida davom ettiradi. Ribosomaga tashib kelgan aminokislotadan ozod bo'lgan tRNK va u bilan aloqada bo'lgan iRNK kodoni ribosomaning tashqarisiga chiqadilar.

Ribosomaning aminoatsil va peptidil markazlarida oqsil sintezi aminoatsil markazga uchta terminator kodon UAA, UAG yoki UGA lardan biri kelib joylashgach to'xtaydi. Ribosomaning aminoatsil markaziga terminator kelib tushgach polipeptid sintezining uchinchi bosqichi terminatsiyasi boshlanadi. Terminatsiya bu translyasiyaning oxirgi bosqichi. Terminatsiya sintezlangan polipeptid zanjirini ribosomaning katta subbirligidan ajralishiga olib keladi. Natijada erkin holdagi ribosoma yangi polipeptid zanjirining sinteza qatnashishi mumkin bo'ladi. Barcha eukariot organizmlarda translyatsiya jarayoni umuman olganda shunday kechadi.

Oqsil biosintezida hosil bo'lgan polipeptid zanjir translyatsiyajarayonida o'ziga xos maxsus funksiyani o'taydi. Oqsilning birlamchi strukturasi polipeptid zanjirda aminokislotalarning izchilligi bilan belgilanadi. Biroq oqsil molekulasi hujayra ichida to'g'ri chiziqdagi tortilgan aminokislotalar zanjiridan iborat bo'imay, spiral shaklida buralgan, koptok shaklida o'ralgan, globulyar bo'ladi. Bu ularning ikkilamechi, uchlamechi strukturalaridir. Ikkilamechi, uchlamechi strukturalar hosil bo'lishida disulfid bog'lar, ionli bog'lar, hidrofob, qutblangan guruuhlar orasidagi aloqalar muhim rol o'ynaydi.

5. Genetik axborot ko'chirishning maxsus turlari

Hozirgi davrga kelib genetik axborot ko'chirishning uchta maxsus turi aniqlangan.

1. RNK dagi genetik axborotni RNKga ko'chirish, virus bilan zararlangan hujayralarda kuzatiladi. Bu tamaki mozaikasi va o'simliklarning boshqa viruslarida hamda RNKga ega bakteriofaglarda va hayvonlar polioviruslarida uchraydi. Aytilgan viruslarning genomi RNKdan tuzilgan bir zanjirli bo'ladi. RNK molekulasiidan RNK molékulasini sintezlanishi komplementar prinsipi asoslanadi.

2. Teskari transkripsiya. RNKdan genetik axborotni DNA molekulasiiga ko'chirish yoki teskari transkripsiya viruslarning ayrim tipi bilan zararlangan hayvon hujayralarida aniqlangan. Bunday RNKning

o'ziga xos tipi retrovirus deb ataluvchi viruslar genomida mavjud. Hozirgi vaqtida gepatit Bni qo'zgatuvchi virus genomidagi RNK ham DNKn sintez qilishi ma'lum bo'ldi. Retrovirusning RNKsi «xo'jayin» hujayrasiga kirkach virus genomida teskari transkripsiya hodisasi ro'y beradi. Odadga retroviruslar genomida RNK nusxasi 2 ta bo'ladi. Shunga ko'ra oldin RNK-DNK dupleksi hosil bo'ladi. So'ngra qo'shaloq zanjirli DNA molekulasi sintezlanadi. RNK komplementar asosda DNA sintezlanishi teskari transkriptaza ferment ishtirokida amalga oshadi. Bu ferment odadta retrovirus zarrachalari (varionlari) bo'lib, virus hujayraga kirkach faollashadi hamda uning lipidoglikoprotein qobig'ini parchalaydi.

3. DNA transkripsiysi va translyasiyasi. DNKdagi genetik axborotni to'g'ridan-to'g'ri oqsil molekulasiغا ko'chirish laboratoriyanadagi in vitroda aniqlangan. Bunday sharoitda ba'zi bir antibiotiklar, xususan, streptomitsin, neomitsin ribosomalar bilan o'zar oloqada bo'lib ularning xossasini shunday o'zgartirib yuboradiki, oqibatda ribosomalar oqsil molekulini hosil etuvchi axborot qolipi sifatida iRNK emas, aksincha bir zanjirli DNA dan foydalanadilar.

6. Molekular genetika

XX asrning boshlarida gen bo'linmaydigan yaxlit birlikdan iborat deb kelingan bo'lsa, keyinchalik u **muton, rekon va sistron** kabi tushunchalar bilan tavsiflangan. **Muton** bu genning mutatsiyaga uchragan eng kichik birligidir. Ana shu kichik birlik bir yoki bir necha nukleotidlardan iborat. **Rekon** bu genning rekombinatsiya hosil etuvchi eng kichik birligi. U ham kodlaydigan ketma-ketligini ifodalaydi. U ilgarigi gen haqidagi tushunchaning ma'lum funksiyani bajaruvchi ayrim qismi degan tushuncha barcha genetiklar tomonidan e'tirof etiladi. Har bir gen nukleotidlari izchilligidan tashkil topgan va oqsil kodlaydigan ekzonlardan va oqsil kodlamaydigan intron ketma-ketliklardan tashkil topgan. Bunday tashqari gen faoliyatini boshqaradigan qator elementlar ham mavjud.

Bu elementlar asosan genning promotr ketma-ketliklari, ba'zi yuqori organizmlarda promotr yonidagi sensor ketma-ketliklari bo'lib, birlgilikda gen funksiyasi boshqarilishida operatorlik vazifasini o'taydi. Genni faolligini oshiruvchi (enxanser) va susaytiruvchi (saylenser) ketma-ketliklari ham mavjud bo'lib, turli regulator oqsillar bilan hamkorlikda operator funksiyasiga ijobjiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday tashqari maxsus regulator gen va suppressor gen turlari mavjud bo'lib, ular sintez qilingan oqsillar operatorini boshqaradi.

Genetik nug'at nazardan oqsil sintezida ishtirok etuvchi strukturali genlar nihoyatda ahamiyatlidir. Bunday genlar oqsil molekulalari hamda

fermentlami sintez qilishda qatnashib hujayra metabolizmini o'zgartiradi va organizmlardagi belgi-xossalarni shakllanishida asosiy rol o'ynaydi.

Molekular genetikaning rivojlanishi bilan faqat ayrim genlarning tuzilishi emas, balki har bir organizm genomi yaxlit holda o'rganiladi va qiziqarli ma'lumotlar olinadi. **Genom** bu gaploid holatidagi xromosomalarning genlar majmuasidir. Genomni tadqiq qiluvchi molekular genetikaning shoxobchasi **genomika** deb nomlanadi. Genomika o'z tadqiqotlarini prokariot organizmlar genomini o'rganishdan boshlagan. Keyin esa eukariot organizmlar genomini tadqiq qilindi. Oqibatda prokariot va eukariot organizmlarda *Esherichia coli* misol uchun olsak uning genotipi 4639221 nukleotid juftligidan tashkil topgan. Genotipi 87,8 foizi aminokislotalarni kodlashda, 0,8 foizi tegishli genlar RNK genini har xil fraksiyalar (TRNK va RRNK) sintezi kodlashda ishtirok etadi. 0,7 foizi esa, kodlarda qatshanmaydi nukleotidlardan juftligi hisoblanadi. Shunday qilib bakteriyalarda genomning 88,6 foizi genlardan iborat bo'lib, 11 foizi atrofida nukleotidlardan juftlari kodlashda qatnashmaydigan genlar orasidagi takroriy qismlar sanaladi. Prokariotlarga nisbatan eukariotlarda nukleotidlardan genlar soni nihoyatda ko'p bo'ladi. Tubandagi jadvalda esa eukariot organizmlarni ba'zilarini genom kattaligi yoritilgan. (M.Singer, Berg 1998)

Nº	Organizmlar	Gaploid genomdagi nukleotidlardan juftlik soni	Xromosomalarning gaploid nabori
1.	Achitqi zamburug'i (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	1.35×10^7	16
2.	Yumaloq chuvalchang (<i>Caenoz habditis eleqans</i>)	8×10^7	11/12
3.	Tut ipak qurti (<i>Bombyx mori</i>)	5×10^8	28
4.	Meva pashshasi (<i>Drosophila melanogaster</i>)	1.65×10^9	4
5.	Tovuq (<i>Gallus domesticus</i>)	1.2×10^9	39
6.	Sichqon (<i>Mus musculus</i>)	3×10^9	20
7.	Sigir (<i>Bovis domesticus</i>)	3.1×10^9	60
8.	Odam (<i>Homo sapiens</i>)	2.9×10^9	23
9.	Makkajo'xori (<i>Zeo mays</i>)	5×10^9	10
10.	Piyoz (<i>Allium cepa</i>)	1.5×10^{10}	8
11.	Arabidopsis (<i>Arabidopsis thaliana</i>)	7×10^7	5

Prokariot organizm tarkibida atigi bir dona xromosoma — genofor, euakariot organizmlarda esa xromosomalr soni nihoyatda ko‘p. Masalan, odam genomini olsak, uning nomi 23 ta xromosomalda 3×10^9 nukleotidlar jutflari joylashgan. Odamning katta xromosomalda 29 mln, eng kichik xromosomalda esa 47 mln. nukleotidlar jutflari mavjud.

Har xil obyektlarda nukleotidlar izchilligi asosiy aniqlangan genlar soniga oid ma'lumotlar

Organizm xillari	Tur	Har xil mualliflar bo'yicha genlar soni		
		Levin 1994	Miklos, Rubin 1996	Boshqalar
Prokariot	Escherichia coli		4100	4909-4258
Zamburug'	Saccharomyces cerevistea	5200	5800	6200-6034
Infuzoriya	Oxutrina similis		12000	
Bo'g'imoyoqlilar	Drosophila melanogaster	8000	12000	8000, 20000
Yumaloq chuvalchanglar	Caenozhabditis elegans		14000	
Mollyuskalar	Loligo peali		35000	19009
Xordalilar	Mus musculus	125000	70000	
	Homo sapiens		70000	50000-120000
O'simliklar	Nicotiana tabacum		43000	
	Arabidopsis thaliana		16000-33000	

Prokariotlardan farqli ravishda euakariotlarda DNK sida kodlanuvchi va kodlanmaydigan qismilar bor. Kodlanuvchi DNK qismilar polipeptid yoki RNK sintezida qatnashadi. Kodlanmaydigan DNK qismilarini esa, intronlar, genlar orasida nukleotid jutfliklari, soxta genlar tashkil etadi. Odam genomini atigi bir foiz ekzonlar, 24 foizi interonlardan va 75 foizi genlar orasidagi nukleotidlar jutfligidan tuzilgan. Boshqacha aytganda odam genomini bir foizigina oqsil molekulalarini sintezi haqidagi axborotni o'zida saqlaydi.

XX asming 60-yillarini oxirida amerikalik olimlardan R.Britten va E.Devidson euakariot organizmlar genomida har xil darajada takrorlanadigan DNK qismilarini kashf etdilar. Bularga:

1. Noyob-nodir nukleotidlar izchilligi ya'ni bir nusxadagi nukleotidlar izchilligi.
2. O'rtacha takrorlanuvchi yoki oraliq nukleotidlar izchilligi.
3. Yuqori darajadagi genomda takrorlanadigan nukleotidlar izchilligi. Ularning takrorlanish darajasi 10^6 nusxalarga teng. Keyingi vaqtida olingan ma'lumotlarga ko'ra noyob nukleotidlar izchilligi oqsilni sintezida qatnashuvchi genlar sanaladi.

Savollar va topshiriqlar

1. Bakteriyalar transformatsiyasi haqidagi F.Griffits tajribalarini izohlang.
2. Transduksiya qanday amalga oshadi?
3. Transformatsiya va transduksiyadan qanday xulosaga kelindi?
4. Gen hujayrani qaysi qismlarida bo'ladi? U nimalardan tuzilgan?
5. Gen qanday funksiyani bajaradi?
6. Genning qanday xillarini bilasiz?
7. Genning intron, ekzon qismlarining fargini yoriting. Ekzon va intron qismlar qaysi organizmlar genlarida uchramaydi?
8. Genetik kod nima?
9. Transkripsiya nima?
10. Translyatsiya necha bosqichda amalga oshadi?
11. Hujayrada oqsil biosintezini jadval yordamida tushuntiring.
12. Oqsil biosintezi hujayraning qaysi organoidida ro'y beradi?
13. Splaysing nima?
14. Genetik axborotni ko'chirishning qanday maxsus turlarini bilasiz?
15. DNK va RNK replikatsiyasi orasidagi tasovutni izohlang.

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

I. Bakteriyalar transformatsiyasi bu:

- A Bir bakteriya irlsiy axborotini boshqa bakteriyaga ko'chishi
- B Bir bakteriya sitoplazmasining boshqa bakteriyaga ko'chishi
- C Avirulent bakteriyani virulent bakteriyaga aylanishi
- D Ikki bakteriyani bir-biri bilan konyugatsiyasi

2. Transduksiya

- A Bir bakteriya sitoplazmasini boshqa bakteriyaga ko'chishi
- B Bir bakteriya irlsiy axborotini boshqa bakteriyaga ko'chishi
- C Ikki bakteriyani bir-biri bilan konyugatsiyasi
- D Bir bakteriya irlsiy axborotini bakteriofaglar yordamida boshqa bakteriyaga o'tkazilishi

3. Gen bu:

- A. U yoki bu belgini rivojlanishini ta'minlovchi oqsil molekulasi
- B. Modda almashishi reaksiyasini tezlashtiruvchi ferment
- C. Birlamchi oqsil tuzilishi to'g'risidagi axborotni saqlovchi DNK molekulasini ayrim qismi
- D. ATP molekulasi

4. Genetik kod bu:

- A. DNK dagi nukleotidlari izchilligi
- B. Oqsil tarkibidagi aminokislotalarning izchilligi
- C. DNK yoki RNK dagi tripletlar izchilligini oqsil molekulasi dagi aminokislotalar izchilligiga mosligi
- D. iRNK dagi nukleotidlari izchilligi

5. Transkripsiya bu:

- A. DNK replikatsiyasi
- B. iRNK dagi nukleotidlari izchilligining DNK ko'chishi
- C. DNK dagi nukleotidlari izchilligini iRNK ko'chishi
- D. iRNK asosida polipeptidni sintezlovchi

6. Translyasiya bu:

- A. Oqsil molekulalarining aminokislotalarga ajralishi
- B. DNK asosida polipeptidni sintezlanishi
- C. iRNK asosida polipeptidni sintezlanishi
- D. DNK molekulasini ikki hissa ortishi

7. Genetik kodning aymiganligi:

- A. Barcha organizmlarda bir xil tripletlar bir xil aminokislotalarni kodlaydi
- B. Har xil organizmlarni aminokislotalarni, ularga xos tripletlar kodlaydi
- C. Yonma-yon turgan uchta nukleotid ma'lum aminokislotsasi kodlaydi
- D. Har bir aminokislota bittadan ortiq triplet bilan kodlanadi

8. Oqsil molekulasing sintezida qanday nuklein kislotalar qatnashadi?

- A. iRNK va tRNK
- B. iRNK va rRNK
- C. TRNK va rRNK
- D. iRNK, rRNK, tRNK

9. Qanday kimyoiy bog' orgali aminokislotalar o'zaro bog'lanib oqsilni birlamchi strukturasini hosil qiladi?

- A. Vodorod bog' orgali

- B. Peptid bog' orgali
- C. Disulfid bog' orgali
- D. Ion bog' orgali

10. Eukariotlarda RNK polimerazani qanday tiplari mayjud?

- A. RRNK sintezlovchi, iRNK sintezlovchi
- B. iRNK sintezlovchi, tRNK sintezlovchi
- C. rRNK sintezlovchi, tRNK sintezlovchi
- D. rRNK sintezlovchi, iRNK sintezlovchi, tRNK sintezlovchi

11. Hujayrada necha xil tRNK bor?

- A. 16
- B. 20
- C. 32
- D. 64

12. Splaysing bu:

- A. iRNK ni yadro shirasidan sitoplasmaga ko'chish
- B. iRNK ni DNK zanjiridan yadro shirasiga tushishi
- C. iRNK ni intron qismini ajralishi va ekzon qismlarni o'zaro qo'shilishi
- D. A,B,C

IX-BOB. ONTOGENEZ GENETIKASI

Tayanch tushunchalar: Ontogenez haqida tushuncha, ontogenenezning genetik dasturi, transplantatsiya, ontogenezni o'rganishda qo'llaniladigan genetik metodlar, morfogenetik davr, embrional induksiya, hujayrada oqsil biosintezini tartibga solish, operon tizimi.

158. Ontogenezning genetik asoslari

1.Ontogenez haqida umumiy tushuncha

Ontogenez – bu organizmlarning shaxsiy rivojlanishidir. Shaxsiy rivojlanish atamasi ostida zigotadan tortib organizmlarning tabiiy o'simligacha bo'lgan davri tushuniladi. Ko'p hujayrali o'simlik hayvonlarning shaxsiy rivojlanishida tubandagi o'xshashlik bor: 1) hujayralar sonining ortishi ya'ni o'sish; 2) rivojlanish davomida hujayralarning tabaqalanishi, ixtisoslashishi; 3) morfogenez to'qima va organlarning, belgi va xossalarning rivojlanishi.


Tuzilishi murakkab hayvonlar ontogenesi embrional va postembrional davrlarga bo'lindi. Ko'p hujayrali hayvonlarda to'qimalar va organlarning hosil bo'lishi odatda embrional davrda sodir bo'ladi. Yuksak o'simliklarda esa to'qima va organlarning rivojlanishi yashash davrida ro'y beradi. Bir qiz hujayraning hosil bo'lishi davriga to'g'ri keladi. O'simlik, hayvonlar to'qima organlarining hosil bo'lishini embriologiya fani o'rganadi. Ontogenezning genetik asoslarini tadqiq qiluvchi genetikaning shohobchasi **ontogenetika** deb ataladi.

2.Ontogenezning genetik dasturi

Har bir organizmning shaxsiy taraqqiyoti hujayradagi **genetik dastur** – **genom** asosida amalga oshadi. Shaxsiy taraqqiyotning genetik dasturi deganda otalangan tuxum hujayradan to' organizm to'liq voyaga yetishigacha bo'lgan taraqqiyotni belgilovchi genlar majmuasi tushuniladi. Prokariot va bir hujayrali eukariot organizmlarda gen bilan belgi o'rtafigi masofa qisqa. Ulardagi barcha belgi va xossalalar to'g'ridan-to'g'ri genlar faolligi, uni tartibga solish bilan belgilanadi. Yuksak o'simlik va hayvonlar, odamlarda esa gen bilan belgi orasidagi munosabat murakkab. Ulardagi morsobiologik belgi - xossalalar o'zaro mustahkam bevosita, bilvosita aloqada bo'lgan hujayralar va ulardagi genlar faolligi natijasida ro'yobga chiqadi. Ontogeneda sodir bo'ladijarayonlar zanjirining umumiy sxemasi 64 – rasmida tasvirlangan.

Bunday jarayonlar zanjiri o'zaro aralashib ketishiga qaramay, ulardagi barcha yo'nalishlar qat'yan muvofiq ravishda amalga oshishi sababli organizmning morfologik va funksional yaxlitligi ta'minlanadi. Ontogenetik navbatda hujayralar sonining ortishi bilan aloqador. Otalangan tuxum hujayra – zigota ontogenez taraqqiyot mobaynida son jihatdan

ortib u yangi tug'ilgan chaqaloqda 10^{11} , katta odamda esa $10^{15}-10^{16}$ ga etadi. Genetik dastur asosida yuksak hayvonlarning embrional, yopiq urug'li o'simliklarning yashash davrida hujayralar tuzilishi va funksional jihatdan ixtisoslasha boradilar. Rus olimi A.L.Zavarzin qayd etishicha embrional borgan sari o'zlarining murakkabligini yo'qotib, organizmning tarkibiy qismalarining biriga aylana boradilar. Urug'lanish davrida tuxum va urug' hujayraning zigotani hosil etishdag'i ulushi bir-biridan farq qiladi. Zigota hosil bo'lishiда tuxum hujayra yadrosi bilan birga har xil organoidli sitoplazma, gen mahsulotlariiga ega holatda bo'lisa, urug' hujayra urug'lanish paytida tuxum hujayraga saqat o'z yadrosini beradi xolos. Shunga ko'ra zigotani bo'linishi va dastlabki blastomeralarning rivojlanishi ona hujayra xromosomalarining diploid to'plamli chog'ida sintezlangan sitoplazmadagi gen mahsulotlari hisobiga amalga oshadi. Binobarin ontogenetik rivojlanishi dastlabki bosqichini ona hujayradagi diploid to'plamli xromosomada joylashgan genlar belgilab beradi. Shaxsiy taraqqiyotning keyingi bosqichlarida esa ona hujayra genlari bilan bir qatorda zigotadagi ota organizm genlari ham qatnashadi. Shaxsiy taraqqiyotda genetik nuqtai nazardan genlar ta'siri qanchalik erta bo'lisa, ularning pleyotrop samarasi shunchalik uzoq muddatli bo'ladidi.



64-rasm. Ko'p hujayrali organizmlarda ontogenetik jarayonlar zanjiridagi halqlarning o'zaro aloqalanishi umumiy sxemasi (Konyuoxov bo'yicha).


Modomiki shaxsiy taraqqiyot genlar faoliyatini tufayli amalga oshsa hamda ular barcha belgi va reaksiyalarni nazorat qilar ekan u holda; 1) Ontogenezning turli bosqichlarida bir xil genlar yoki har xil genlar faoliyat ko'rsatadimi? 2) Ularning faoliyatiga kirishganligini qanday aniqlash mumkin? 3) Gennenning o'ziga xos ta'siri qanday amalga oshadi? degan savollar tug'ilishi tabiti.

Ko'p hujayrali organizmlarda ontogenezning genlar tomonidan boshqarish mexanizmini bilish niroyatda mushkul. Bu muammoni hal etishda mutant va normal organizmlar ontogenezini tadqiq qilish va olingan natijalarini taqqoslash muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Ontogenezni o'rGANISHDA QO'llANILADIGAN GENETIK METODLAR

Ontogenezda genlar faoliyatini ya'nini genlarning organizm tuzilishi, ulardagagi belgi-xossalarning hosil bo'lishiga ko'rsatgan ta'sirini o'rGANISH har xil metodlar yordamida amalga oshiriladi. Bular: transplantatsiya, sitogenetik, biokimyoiy, immunologik, fiziologik metodlardir.

Transplantatsiya metodi yordamida bir hujayra yadrosini yoki bir to'qima qismini boshqa hujayra yoki to'qimaga ko'chirish orqali rivojlanishdagi o'zgarish kuzatiladi. Chunonchi, baqaning otalangan tuxum hujayralaridagi yadro mikrotomizg'ich orqali olib tashlanib, retsipient hujayralarning biriga itbaligning morula holatdagi, ikkinchisiga blastula holatdagi, uchinchisiga ertangi gastrula holatdagi, to'rtinchisiga kechki gastrula holatdagi blastomera yadrolari alohida-alohida ko'chirilsa, so'ng ana shu usul bilan olingan tuxum hujayralarning bosqichma-bosqich rivojlanishi kuzatib borilsa birinchi, ikkinchi, uchinchi tuxum hujayradan normal itbalig taraqqiyot qilgan holda, to'rtinchchi tuxum hujayradan normal itbalig rivojlanmaydi. O'tkazilgan tajribaga asoslanib tuxum hujayrasida onadan o'tgan genlar faoliyatini itbalig rivojlanishining kechki gastrula davridan boshlab ta'sir etar ekan, degan xulosaga kelinadi. Kechki gastrula rivojlanishiga qadar otalangan tuxum hujayradagi genlar baqa rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmay tuxum hujayra urug'languncha ona hujayra xromosomalari diploid to'plamli bo'lgan paytdagi genlar faoliyatini tufayli sitoplasmada sintezlangan iRNK va metabolitlar hisobiga murtak rivojlanishi morulla, blastula, ertangi gastrula bosqichlari ro'y beradi (65-rasm).



65 - rasm. Itbaligning ichagidan olingan yadroni baqaning otalannagan tuxum hujayrasiga ko'chirish sxemasi. Dj.Gerdon tajribasi.



Dj.Gerdon tomonidan baqalar ustida olib borilgan nozik kuzatishlar. tajribalar shundan dalolat beradiki: 1) Tuxum hujayraning voyaga yetish jarayonida barcha genlar nosaol holatda bo'ladi. 2) Tuxum hujayra urug'langach uning bo'linib, blastomeralarni hosil etishi dastlabki tuxum

hujayradagi irlsiy axborot zaminida amalga oshadi. DNK replikatsiyasi, oqsil sintezi dastlabki tuxum hujayra sitoplazmasining zahirasidagi 6 la blastula bosqichigacha RNK sintezi kuzatilmaydi (65 rasm). 3) Bir necha vaqt o'tgach (kechki blastula – ertangi gastrula) yangi rRNKlar sintezlana boshlaydi. 4) Chunki bu vaqtga kelib tRNK murtak genomida rRNK va tRNK sinteziga ma'sul genlar faollahashadi.

Sutemizuvchi hayvonlarda esa otalangan tuxum hujayra bo'linib 2 ta, 4 ta blastomeralarni hosil qilish mobaynidayoq murtak genomni faoliyat ko'rsata boshlaydi.

Blastomeralar soni 8 ta bo'lganda esa oqsil molekulalarini sintezlanishi to'liq murtak genlari faoliyat natijasida ro'y beradi. Bu qanday bilinadi? Ma'lumki hujayra oqsil molekulalarini sintezlanishi uchun avvalo transkripsiya ni DNKdagi irlsiy axborotni RNKga ko'chirish zarur.

DNKdagi u yoki bu oqsil molekulasi sintezlashda qatnashadigan ferment ta'sirida bir-biridan uzoqlashishi – shishishi kerak. Shundagina DNKnинг «ma'noli» zanjiridagi gendan iRNK sintetaza fermenti ishtirokida mRNA sintezlanadi. (66-rasm)



67 - rasm. Drozofilaning gigant xromosomasida rivojlanishning turli davrlarida shishlarning hosil bo'lish sxemasi.

67-rasmida drozofila meva pashhasi gigant (politen) xromosomani g'umbaklik davrdan oldingi (1) va g'umbak davrdagi (2) holati ko'rsatilgan. Rasmdan ko'rinish turibdiki drozofilaning g'umbaklikdan oldingi paytda gigant xromosomaning ikki joyida, g'umbaklik vaqtida uch joyida DNA zanjirining despirallashishi ro'y bergen. Xromosomaning bundav shishi zanjirining despirallashishi doimiy bo'lmay, lichinka hayotining turli bosqichlarida o'zgarib turadi.

Ontogenetiki biokimyoiy metod asosida o'rganish hidli no'xat o'simligi duragaylarining birinchi avlodida allel bo'lmagan dominant genlarning bir-biriga ta'siri tusayli qizil pigmentni sintezlanishi yoki oshqovoqlarda duragaylarning birinchi avlodida gardishsimon, ikkinchi avlodida gardishsimondan tashqari uzunchoq mevali duragaylarni hosil bo'lishi misoldida ko'rish mumkin.


Fiziologik metod yordamida faqat gen funksiyasi, uning o'zgarishi va boshqa genlar bilan munosabati o'rganiladi. Irsiyatning molekular assoslari bobida genlar tuzilishi, xilma-xil funksiyasi to'g'risida to'liq ma'lumot oldingiz. Allel va allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'siri yoritilganda allel bo'lmagan genlar orasidagi munosabat nihoyatda turli tuman ekanligi bilan tanishdingiz. Allel bo'lmagan genlarning o'zaro komplementar, epistaz, polimeriya, pleyotropiya, modifikator genlarning strukturali genlar faoliyatiga ko'rsatgan ta'siri bunga yorqin misoldir.

Gen qanday qilib biokimyoiy moddalar sintezi, almashinuvini, nihoyat fenotipni o'zgarishini boshqarishi mumkinligini tushunishda mikroorganizmlarni mutant formalari qulay obyekt sanaladi. Misolga neyrosporani olsak, uning normal formasi minimal muhitda ya'ni qand va vitamin B dan iborat ozuqa muhitida o'sadi. O'sish davrida normal neyrospora minimal ozuqadan protoplazmaning barcha zarur tarkibiy qismlari – aminokislotalar, polisaxaridlar, lipidlar va boshqa moddalarini sintezlaydi. Neyrosporaning mutatsiyaga uchragan formalari esa u yoki

bu genlari tuzilishi o'zgarganligi sababli hayot uchun zarur bo'lgan ba'zi moddalarni sintezlay olmaydilar va natijada nobud bo'ladi. Bunday mutant neyrosporalar yashashi uchun minimal ozuqa muhitiga ular sinet qila olmaydigan moddani qo'shib berish lozim.

Tirik organizmning har bir hujayrasida bir moddadan ikkinchi moddani hosil bo'lishi bir necha biokimyoiy reaksiyalardan iborat. Chunonchi, neyrospora hujayrasida fenilalanin aminokislotadan nikotin kislotani sintezlanishi 6 xil biokimyoiy reaksiyadan tashkil topadi. Bunda bir gen - ferment fenilalaninni antronil kislotaga aylantirsa, ikkinchi gen - ferment unga serinni qo'shib indolni hosil etadi, uchinchini gen - ferment indolni triptofan aminokislotaga aylantiradi. To'rtinchigi gen - ferment ishtirokida triptofan kinureninini hosil qidi. Beshinchigi gen - ferment uni oksiantronil kislotaga aylantiradi. Oltinchigi gen - ferment asosida nikotin kislotani sintezlaydi. Shunga cuib neyrospora hujayrasida teniialarin aminokislotadan nikotin kislotani hosil bo'lishi 6 ta gen ishtirokida ro'y beradi. Mabodo yuqorida reaksiyaarning birortasini ro'yobga chiqaruvchi gen mutatsiyaga uchrasa, u holda hujayrada oraliq moddalardan birortasi tanada to'plana boradi.

Masalan, reaksiyalarning to'rtinchigi bosqichini amalga oshiruvchi gen mutatsiyaga uchrasa neyrospora hujayrasida triptofan aminokislotasi to'planadi. Shunga ko'ra mutant neyrospora o'sish uchun kinurenin yoki oksiantronil kislotadan foydalananadi. Lekin undan oldingi metabolitalar - indol va antronil kislotasi hamda fenilalanindan foydalana olmaydi (68-rasm).



68 - rasm. Neyrosorda triptofan aminokislotasining biosintezi va nikotin kislotaning hosil bo'lish sxemasi.

Fenilalanining nikotin kislotaga aylanishiga yo'nalgan reaksiyalarni uchinchigi bosqichini amalga oshiruvchi gen mutatsiyaga uchragan taqdirda, neyrospora hujayrasida indol to'plana boradi va u o'sish uchun triptofan, kinurenin va oksiantronil kislotadan foydalananadi. Antronil va fenilalanindan esa o'sish uchun neyrospora foydalana olmaydi. U nikotin kislotani sintez qilishiga qodir emas. Ikkita mutant neyrosporaning metabolik reaksiyalari taqqoslash orgali ularning qaysi birida yuqorida sanab o'tilgan metabolit qaysi birini erta bosqichda sintezlanmaganligini bilish mumkin. Bayon etilganlar gen ta'sirini biokimyoiy genetik metod orqali o'rganishga doir misollardan biridir. Shunga o'xshash misollarni eukariot organizmlardan ham keltirish mumkin. Masalan, odam organizmidagi mudda aminokislotalarga, xususan, fenilalanin va tirozinga bog'liq. Mazkur aminokislotalarni odam organizmi iste'mol qilinadigan ozuqadan oladi. Tirozin, shuningdek ortiqcha fenilalanin ham ferment yordamida hosil bo'ladi. Biosintez vaqtida tirozin, oqsillar ba'zi gormonlar tiroksin va melanin va hokazolarni sintezlash uchun zarur. Agar tirozin ko'payib melanin va boshqa fermentlar orqali karbonat angidrid, suv molekulalariga ketsa u boshqa fermentlar orqali karbonat angidrid, suv molekulalariga parchalanadi. Fenilalanindan melaninini hosil bo'lishi bir necha parchalanadi. Fenilalanindan melaninini hosil bo'lib, har bir bosqichdagi oraliq moddalar alohida-alohida gen - fermentlar ta'sirida sintezlanadi.

Mabodo fenilalanindan melaninini hosil bo'lishida qatnashadigan biror fermentni sintezlovchi gen mutatsiyaga uchrasa, u holda fenilalanin hujayrada to'planib qoladi va oqibatda u boshqa ferment ta'sirida feniluzum kislotaga aylanadi. Feniluzum, oksi pirouzum kislotalarini hujayrada to'planishi esa albinizm, alkeptonuriya va fenilketonuriya kabi kasalliklarini kelib chiqishiga olib keladi.

Tirik mavjudotlardagi organlar sistemasi ularning har birini o'ziga xos tuzilishi va funksiyasi hujayralardagi boshqa organlar sistemasi va oqsillarga bog'liq. Embrional rivojlanish paytida iste'mol qilinadigan ozuqa hisobiga nuklein kislotalardagi genlar har xil oqsillar, rRNK, tRNK, gormonlarni, fermentlarni sintezlashda qatnashadilar.

Murtak hosil bo'lishi oldingi va ertangi bosqichida RNKlar sintezini dinamikasi, ularning transkripsiysi yagona mexanizm tomonidan boshqariladi. Lekin bu mexanizm nima ekanligi hali aniqlanmagan.

Ontogenetik ilk bosqichlarini molekular asoslarni tadqiq qilishda u yoki bu RNK, oqsillar rivojlanishning qaysi bosqichida sintezlanadi, qaysi bosqichda ular o'z vazifasini o'taydi, degan muammo nihoyatda muhim sanaladi. Ontogenetik ilk bosqichlari ustida olib boriladigan molekular biologiya tadqiqotlarining ikkinchi maqsadi har xil blastomerlarda, murtak qismalarida, hujayralardagi va hokazolardagi RNK va oqsillarning sifat jihatdan tafovutini o'rganishdan iborat. Bu sohada

Shunday qilib organizmning turli bosqichlarida ya'ni turli to'qimalar organlarning shakllanish jarayonida shu to'qima yoki organning tuzilishi, funksiyasini ta'minlaydigan strukturali genlar faoliyat ko'satadi.

Strukturali genlar faoliyatini yuqorida aytilgan usulda boshqarish faqat bakteriyalar ontogeneziga emas, balki eukariot organizmlar ontogeneziga ham xosdir.

5. Immunitetning genetik asosi

Immunitet organizm hujayralariga kirgan viruslar, bakteriyalar, parazitlar va boshqa yot narsalarni bartaraf qilishga qaratilgan tirik mavjudotning himoya reaksiyasidir. Yot narsalar-antigenlarga nisbatan organizmning himoyalanish reaksiyasi tug'ma va yashash davrida orttirilgan bo'ladi. Tug'ma immunitetda organizm o'zidagi mavjud immun sistemasidan foydalananadi. Immunitet umurtqali hayvonlarning barcha sinfi yuruvchilar, qushlar, sutevizuvchilar va odamlarda rivojlangan. Immunitetning mohiyati shundan iboratki, organizmga biror bir yot yo'qotish uchun maxsus immun reaksiya hosil bo'ladi. Boshqacha aytganda reaksiyasi paydo bo'ladi. Immun reaksiya antitana sintezi maxsus limfatsit hujayralar membranasiga yot narsa-antigen ta'sir qilishi bilan boshlanadi. Limfatsit hujayra suyak iligidan va ko'migidan embrional o'zak hujayralarining ketma-ket bo'linishi tufayli hosil bo'ladi. Limfatsit ikki xil T(Te) va B(Bi) limfatsitlarga bo'linadi. Antigen ta'sirida T limfatsitlardan limfoblast, B limfatsitlardan esa plazmatik hujayralar rivojlanadi. Limfoblast hujayralarda sintez qilingan antitana molekulasi hujayra ichida qolib, hujayra immunitetini ta'minlaydi. Plazmatik hujayralarda sintez bo'lgan antitana molekulalari hujayra tashqarisiga chiqariladi va ular qon tarkibida bo'lgan antigen molekulalarga bog'lanib ularni neytrallashtiradi.

Limfatsit hujayralarda sintezlangan antitanalar-immunoglobulin oqsil molekulalardir. Ajablanarlisi shuki, qonda organizmga kirgan har qanday yot narsa-antigenga mos bo'lgan immunoglobulin sintez qilinadi. Antitana - immunoglobulinlar ikkita og'ir va yengil polipeptid zanjirlardan tashkil topgan. Ular o'zaro kimyovity yo'l bilan birikkan. Polipeptidni og'ir zanjiri yengil zanjiriga nisbatan uzun va uning molekula massasi ham katta. Har bir polipeptid zanjir turg'un va o'zgaruvchan qismlardan iborat. Antitananing antigenga mosligini polipeptid molekulasini o'zgaruv zanjiri belgilab beradi. Immunoglobulinlar sintezlanish jarayoni murakkab bo'lib, ikki bosqichdan tashkil topgan. Birinchi bosqich murtak

hujayralarning tabaqalanishi va ulardan limfatsitlarning dastlabki formalarini sintezlashga to'g'ri keladi. Mazkur bosqichda immunoglobulin molekulasini og'ir va yengil zanjirlarini sintezlovchi genlarni rejash boshlanadi. Bu genlar xali tabaqalashmagan zigotada tarqoq holatda bo'ladi. Bu genlarning bo'laklari bir xromosomada bo'lsada, bir-biridan uzoqda joylashgan. Burdan qismlarni soni "yetilgan" genlarga nisbatan ortiqchadir. Bundan tashqari ba'zi gen qismlari tuzilishi jihatdan farqlanadilar. Bu qismlar "yetilgan" genga to'planishida har xil kombinatsiyalar hosil qiladi. Bo'lajak genning og'ir va yengil zanjirlari kombinatsiyalari bir-biridan mustasno ro'y beradi, oqibatda genlarning turli kombinatsiyalari, variantlari yuzaga keladi. Natijada har xil tuzilishga ega limfatsitlar nihoyat antitanalar kelib chiqadi.

Ikkinci bosqich organizmga antigen tushishi bilan bog'liq. Organizmga tushgan yot antigenga mos antitanalarni ishlab beradigan hujayralar jadal ko'payadilar. Bir vaqtning o'zida immunoglobulinlarni og'ir va yengil zanjirlarida mutatsion jarayon ro'y beradi. Ana shu mutatsiyaga uchragan hujayralarda organizmga kirgan yot narsalar-anigei tabiatiga mos antitanalar tez ko'payadi. Antitanalarning ajoyib turni-turmaniik mexanizmi hamda antitanalarni antigen molekulasiaga aniq moslik mexanizmi hali to'liq o'rnatilmagan va u iada su ralilar bilan tadqiq qilinmoqda. Bu sonada olingan ma'lumotlar organizmning immun reaksiyasi o'ta murakkab jarayon ekanligidan darak devlati.

6. OITS yoki OITV genetikasi (Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi, ottirilgan immunitet tanqisligi virusi)

Odamiarda immun sistemasini sustishishni oqibatida OITS bilan kasallanishga olib keladi. OITS dastlab 1983-yil AQShdagi gomoseksual odamlarda aniqlangan. Avval spid kasaligi sababiari va yuqist yo'llari no'malum bo'lgan. 1983-yilga kelib olimlar OITV kasalligiga sababli retrovirus ekanligini aniqlaganlar. Retrovirus RNK moiekulasiga teskari transkriptaza fermenti ishtirotida DNK molekulasini sintezlaydi va genomga birikadi. DNK ga ega virus transkripsiya hujayradan hujayra hosil bo'lish natijasida virus zarachalari yig'iladi. "xo'javin" hujayrasini bo'lgan. OITV virusi qonda, spermada, ona ko'krak bezida, bachelon bo'ynida, so'lak va sivdikda topilgan. OITV kasali qon, ona suti va jinsiy yo'l orqali bemordan sog' odamga o'tishi mumkin. OITV og'ir kasallik sanaladi. Bu kasalga chalingan bemorlarda immun sistema kasalligi sababli tashqi muhit zararli omillarga nisbatan organizmda immunitet hosil bo'lmaydi va oqibatda bemor o'ladi.

7. Xavfi o'sma kasallik genetikasi

Xavfli o'sma og'ir kasallik sanaladi. Bu kasallik odamdan tashqari ko'lijayrali hayvonlarda ham uchraydi. Xavfli o'sma kasalligi boshlanish paytida bilish nihoyatda qiyin. Shish 10⁹ hujayralardan iborat bo'lgandagining uni qo'l bilan paypaslab bilish va rentgen nurlari yordamida ko'rishtumkin. Agar xavfli o'sma-shish 10¹² hujayradan ortgan holda va hayot uchun nihoyatda zarur to'qimalarda rivojlansa bemor hayotdan ko'z yumadi. Xavfli o'sma-shish hujayralari bemor organizmidan sog'organizmga transplantatsiya qilinigan taqdirda u, xo'jayin tanasida ham ko'payib uning hayotiga xavf soladi. Bu hodisa xavfli o'sma hujayralarini avtonom ekanligidan dalolat beradi. Tanadagi normal hujayralar eskirib qo'lishi mumkin. Xavfli o'sma hujayralari esa doimo bo'linib ko'payadilar ya'ni o'lmaydilar. Odatda xavfli o'sma-shish monoklonal ya'ni genetik jihatdan o'zgargan yakka hujayradan hosil bo'ladi. Xavfli o'sma kasallik mohiyatini bilish uchun nima sababdan hujayra milliard yillar mobaynida tarkib topgan normal bo'linish o'rniga jadal bo'linishga o'tishini aniqlashtirish kerak. Xavfli o'sma kasalligini aniqlashda uch xil: 1. Nima sababdan ayrim hujayralar jadal sur'atlar bo'linish va tarqalish xususiyatiga ega; 2. Nima sababdan organismning immun sistemasi hujayraning bunday bo'linishini nazorat qila olmaydi; 3. Xavfli o'sma kasalligi paydo bo'lishida genetik omillarning roli qanday? degan savollarga danilish.

Bu haqda so'z yuritilar ekan avvalo ayrim oilalar boshqa oilalarga qaraganda xavfli o'sma kasali bilan tez-tez kasallanishini e'tiborga olish kerak. Bunday oilalarda odamning xavfli o'sma kasalligiga moyilligi emas, balki organizmdagi ayrim organning chunonchi me'da, o'pka, qizil o'ngach, ko'krak bezi va boshqalarning xavfli o'sma kasalligiga moyilligi kuzatiladi. Laboratoriyalarda gomozigota hayvonlarni olish va ular ustida maxsus tadqiqotlar o'tkazish xavfli o'sma kasalini sabablarini bilishda katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Ma'lum bo'lishicha ayrim gomozigota sichqonlarda xavfli o'sma kasalligi sodir bo'lsa ham, boshqa gomozigota sichqonlar bunday kasallik bilan og'rimaydi. Tabiiyki konserogen omillar gamma, rentgen, ultra gunafsha nurlar, turli zaharli kimyoiy moddalar organizmiga ta'sir etib gen, xromosoma mutatsiyalarni hosil etadi.

Mutatsiyalar retsessiv holatda bo'lgan taqdirda geterozigota organizmlar fenotipida namoyon bo'lmaydi. O'xshash mutatsiyaga uchragan geterozigota formalar o'zaro chatishganda retsessiv zararli genlar gomozigota holatga o'tib fenotipda ko'zga tashlanadi. Shu singari faktlar xavfli o'sma kasalini paydo bo'lishi to'g'risidagi mutatsion nazariyani yaratish uchun asos bo'ldi. Agar konserogen moddalar ayrim hollarda xavfli o'sma kasalini paydo qilmasligini e'tiborga olinsa mutatsion nazariya xavfli o'sma kasalini paydo bo'lishini to'liq tushuntira olmasligiga

ishonch hosil bo'ldi. Fanda mutatsion nazariya bilan bir qatorda xavfli o'sma kasalini paydo bo'lishi haqida virus-genetik nazariya ilgari surilgan. Mazkur nazariyaga muvofiq ayrim viruslar organizmda xavfli o'sma kasalini paydo qiladilar. Bunday viruslar onkogen viruslar nomini olgan. Viruslarning xavfli o'sma kasalini paydo qilishi 1970-yillar davomida ixtiro qilingan bo'lsada, keyinchalik viruslarni o'zi emas, balki undagi ayrim genlar ta'siri tufayli xavfli o'sma kasali rivojlanishi ma'lum bo'ldi. Bunday genlar 1981-yili onkogen deb atala boshlandi. Onkogen virus va onkogenlarni ixtiro qilinishi virus nazariya uchun asos bo'ldi. Bu nazariyaga ko'ra hujayraga kirgan virus uning genomiga joylashib avloddan avlodga berilishi va organizm uchun xavf tug'dirmasligi mumkin. Lekin organizmga har xil nurlar, yugori harorat, boshqa konserogen moddalar ta'sir etishi natijasida xromosomada joylashgan viruslar faollashishi oqibatda hujayra beto'xtov bo'linib xavfli o'sma kasalini paydo qilishi mumkin. Dastlabki paytda virus nazariya unchalik ishonartli deb e'tirof etilmadi. Bunga asosiy sabab onkogen viruslar genomini RNA dan tashkil topgan bo'lsa, hujayra genomida DNA uchrashligi bo'ldi.

genomida DΝK uchhrashligi bo'ldi. Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib hayvonlarning embrional hujayralarda onkogenlar mavjud bo'lib, ular embrional hujayralarini tez-tez bo'linishini ta'minlashlari, keyinchalik esa tabaqalashgan hujayralarda faol bo'lmasliklari faqat onkogen viruslar hujayra genomiga birikishi oqibatida ularning miqdori ortishi va xavfli o'sma kasalini hosil qilishi aniqlandi. Umurtqali hayvonlarning normal hujayra genomida onkogen viruslarning Crc geni singari bo'lak bor, lekin aynan unga birday emas. Shunga binoan hujayra genomidagi va sarkoma virusidagi bunday izchillik turlicha virusdagi v- src, hujayra (protoonkogenlar) dagi c- src deb nomlandi. Keyinchalik viruslarda 100 dan ortiq onkogenlar va ularga mos protoonkogenlar topildi. Protoonkogenlarning faollashishi har xil yo'llar bilan amalga oshadi. Xususan har xil konserogenlar protoonkogenlar faol bo'lishini ta'minlaydi. Xromosomalar translokatsiya tusayli ham protoonkogen doimo faol promotor nazoratida bo'ladi.

Hujayralarda onkogenlarga qarshi bo'lgan antionkogenlar ham bor bo'lib, ular ishtirokida sintezlangan oqsil molekulalari protoonkogenlarni xavfli o'sma genlarga transformatsiya qilinishini oldini oladi. Natijada kasallik ro'y bermaydi. Xavfli o'sma bilan kasallanish organizm yoshiga ham bog'liq. Bu sohada to'plangan ma'lumotlarga ko'ra 40 yoshli odamlarning 100000 tasidan 8 tasi, 60 yoshlilarning 60 tasi, 70 yoshlilarning 120 tasi xavfli o'sma kasalligiga duchor bo'lar ekan.

Xavfli o'sma kasali rivojlanishida organizmning immun sistemasi ham katta ahamiyatga ega. Yuqorida qayd qilingandek sутемизувчиларда xavfli o'sma kasalini yuzaga keltiruvchi hujayralar bor. Lekin organizmning

immun sistemasi bunday hujayralarni tez payqavdi va ularni yo'q qiladi. Agar immun sistemasida nuqson bo'lса va organizm genoti pining o'ziga xos ho'lati immun sistema hujayralar tabqaqanishini sust nazorat qiladi. Bu esa xavfli o'sma kasalini keltirib chiqishiga olib keladi.

Keyingi yillarda xavfli o'sma kasalini kelib chiqish sababiari ko'p tadbirlar ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiq qilinmoqda.

Savol va topshiriqlar

1. Ontogenetik haqida nima bilasiz?
2. O'simlik va hayvon ontogenetikda qanday o'xshashiiklar bor?
3. Ontogenetikning genetik dasturini izohlang.
4. Ko'p hujayrali organizmlarda ro'y beradigan ontogenetik jarayonlarni tushuntiring.
5. Ontogenetik fiziologik metod asosida o'rganishga misoilar kehiring sintezlanadi?
6. Nikotin kislota hujayrada nechta gen - ferment ishtirokida?
7. Ontogenetik taddiq qilishda qo'llaniladigan genetik metodiardan transplantatsiyani izohlang.
8. Ontogenetik biokimiyoviy metod asosida o'rganishni misollar bilan voriting.
9. Hujayrada oqsil biosintezini tartibga solish - operon tizimini tushuntiring.
10. Gerdon bo'yicha baqada embriogenezning ilk davrida genlar faoliyatini qanday o'zgarishini batafsil gapiring.
11. Genetik dastur nima?
12. Embriona induksiya nima?, misolda tushuntiring.
13. Organizmda fenilalanin aminokislotosini parchalovchi fermentni o'zearishi qaysi kasalliklarga sabab bo'ladi?
14. DNA zanjiri drozofila meva pashshasining g'umbak va lichinkalik davridan o'zaro farq qiladimi? Javobni izohlang.
15. Ontogenetika nima?
16. Immunitet nima?
17. Spid kasalligi qanday paydo bo'ladi?
18. T(Te) va B(Bi) limfatsitlarni farqini gapiring.
19. Antigen, antitana nima ekanligini tushuntiring.
20. Odam organizmda immun reaksiyasi qanday hosil bo'ladi?
21. Xavfli o'sma kasalligi paydo bo'lishi to'g'risida qanday nazariyalar ilgari surilgan?
22. Siz ularning qaysi birini ko'proq ishonarli deb topasiz?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Ontogenetik o'rganishda qo'llaniladigan metodlar
 - A. Yadro transplantatsiyasi, biokimiyoviy, duragaylash
 - B. Fiziologik, to'qima, transplantatsiyasi, duragaylash
 - C. Yadro, to'qima, transplantatsiyasi, biokimiyoviy, fiziologik
 - D. Transplantatsiya, biokimiyoviy, fiziologik
2. Operator bu:
 - A. Repressor oqsil bilan birikib transkripsiyanı to'xtatadigan DNA ning qismi
 - B. Polimeraza fermentini taniydigان DNA ning qismi
 - C. Transkripsiyanı boshqaruvchi DNA ning qismi
 - D. Strukturali genlardan tashkil topgan DNA ning qismi
3. Operon nimalardan tashkil topgan?
 - A. Promotor, strukturali genlardan
 - B. Operator, strukturali genlardan
 - C. Promotor, operatordan
 - D. Promotor, operator, strukturali genlardan
4. Promotor bu:
 - A. DNA molekulasiidagi nukleotidlар majmuasi bo'lib, oqsil sintezini boshlovchi
 - B. Polimeraza fermentini taniydigан operonning bosh qismidagi nukleotidlар
 - C. Oqsil biosintezini boshqaruvchi DNA ning bir qismi
 - D. DNA dagi strukturali genlar majmuasi
5. Neytrospora hujayrasida fenilalanin aminokislotosidan nikotin kislotani sintezlanishi nechta ferment ishtirokida ro'y beradi?
 - A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 2
6. Embrional induksiya nima?
 - A. Embriyon taraqqiyotida bir rivojlanish kurtagini ikkinchisiga ta'siri
 - B. Embriyon taraqqiyotida bir genning ikkinchi genga ta'siri
 - C. Embriyon taraqqiyotida bir organning ikkinchi organga ko'rsatgan ta'siri
 - D. Embriyon taraqqiyotida yadroning sitoplazma orgonellalariga ta'siri
7. Organizmlarni shaxsiy taraqqiyotining genetik asoslarini tadqiq etuvchi fan nima deb ataladi?
 - A. Sitogenetika

- B. Molekular genetika
- S. Ontogenetika
- D. Medgenetika

8. Boshqa embriogenezning ilk davrida genlar faolligi o'zgarishini tekshirgan olim.

- A. Dj. Gerdon
- B. A.L. Zavarzin
- C. A.A. Neyfax
- D. F.Jakob va J.Mono

9. Immunitet qaysi organizmlarda rivojlangan?

- A. Hashorotlarda
- B. Umurtqalilarda
- C. Sodda hayvonlarda
- D. Mollyuskalarda

10. Limfasit hujayralar qayerda hosil bo'ladi?

- A. Epiteliy hujayralarida
- B. Nerv hujayralarida
- C. Suyak iligi va ko'mik hujayralarida
- D. Qon hujayralarida

11. Antigen bu:

- A. Hujayra, organizmga kirgan yot narsa
- B. Immunoglobulin molekulasi
- C. Murtak hujayralari
- D. Polipeptid zanjir

12. Antitana bu:

- A. Hujayra, organizm tanasiga kirgan yot narsa
- B. Immunoglobulin molekulasi
- C. Qon hujayralari
- D. Polipeptid zanjir

13. Xavfli o'sma kasalligi paydo bo'lishi to'g'risidagi nazariyalar.

- A. Modifikatsion nazariya
- B. Mutatsion nazariya
- C. Virus-genetik nazariya
- D. B, S javoblar

14. Onkogenlar bu:

- A. Xavfsiz o'sma kasalligini hosil qiladi
- B. Xavfli o'sma kasalligini keltirib chiqaradi
- C. Xavfli o'sma genlarini transformatsiya qiluvchilar
- D. Immunitetni hosil qiluvchi genlar

X-BOB. POPULYATSIYA VA EVOLYUTSIYANING GENETIK ASOSLARI

Tayanch tushunchalar: Populyatsiya haqida umumiy tushuncha, populyatsiyalarda irlsylanish, populyatsyaning genetik dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar, evolyutsyaning genetik asoslari.

16§. Populyatsiya dinamikasi va evolyutsyaning genetik asoslari.

1. Populyatsiya haqida umumiy tushuncha

Populyatsiya deyilganda tur tarqalgan arealning muayyan joyida uzoq muddat mayjud bo'lgan, o'zaro erkin chatishib nasl beradigan, ayrim belgi-xossalari bilan shu turga mansub boshqa populyatsiyalardan farq qiluvchi, nisbatan alohidashgan organizmlar yig'indisi tushuniladi. Har bir populyatsiya turning kichik bir qismidir.

Populyatsiyalardagi irlsiy o'zgarishlarni tadqiq qiluvchi genetikaning shahobchasi **populyatsion genetika** deb ataladi. Populyatsiyalarni genetik tomondan o'rGANISH XX asrning dastlabki yillardan boshlangan. Rus olimi S.S. Chetverikov 1926-yili chiqargan «Hozirgi zamон genetikasi nuqtai nazaridan evolyutsion jarayonning ba'zi bir tomonlari» degan maqolasida har bir populyatsiya juda ko'p yashirin va oshkot mutatsiyalarni qamrab olganligini ta'kidlagan. U birinchi bo'lib populyatsiyani genofondi tushunchasini fanga joriy etdi va mazkur atama ostida populyatsyaning genetik imkoniyatlarini tushunish kerakligini ta'kidladi. Olimlardan R. Fisherning «Tabiiy tanlanishning genetik nazariysi» (1930), N.P. Dubininning «Genetik-avtomatik jarayonlar va ularning evolyutsiyadagi roli» (1931), S. Raytning «Mendelchalar populyatsiyalardagi evolyutsiya» (1932), N.P. Dubinin va D.D. Romashevning «Turning genetik tuzilishi va uning evolyutsiyasi» nomli asarlarida populyatsiya genetikasining asoslari yaratildi.

2. O'z-o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalarni genetik strukturasi

O'z-o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalarni genetik strukturasini birinchi bor V. Logansen tomonidan o'rGANilib, uning natijalarini 1901 yili «Populyatsiya va toza liniyalarda irlsylanish» nomli asarida e'lon qilingan. V. Logansen tajribalarida o'z o'zidan changlanuvchi loviya (Phaseolus vulgaris) o'simligi olinib, uning donining og'irligi tahtil qilingan. Bir loviya navining donlarini og'irligi o'chanilib variatsiya qatori tuzilgan. Bir donlarning og'irligi 150 mg. dan 750 mg. gacha ekanligi ma'lum bo'lib.

Tamaki o'simligida gultoji barglarning uzunligi bo'yicha olib borilgan sun'iy tanlash natijalari

Gultoji bargning uzunligi	F_2 dagi o'simliklarning		Tanlash natijasida F_2 dagi o'simliklarning xilma-xiligi	
	A	B	A	B
34	-	-	3	-
37	-	-	6	-
40	-	-	48	-
43	-	-	90	-
46	-	-	-	-
49	-	-	-	-
52	2	1	-	-
55	4	5	-	-
58	20	16	-	-
61	24	23	-	-
64	37	18	-	-
67	31	62	-	-
70	38	37	-	-
73	35	25	-	2
76	27	16	-	3
79	21	4	-	8
82	5	2	-	14
85	6	2	-	20
88	1	-	-	25
91	-	-	-	23
94	-	-	-	20
97	-	-	-	9

4. Populyatsiyalarda irlsiyanish

Tabiatda mutloq gomozigota bo'lgan populyatsiyalar uchramaydi. Chunki o'z-o'zin urug'lanuvchi organizmlar ham vadu-yadu bilan chetdan chatishadi. Ikkinchidan populyatsiyalarda tashqi muhit ta'sirida mutatsion o'zgaruvchanlik ro'y beradi. Shunga ko'ra hech bir paytda yuz foiz gomozigota bo'lgan populyatsiyalarni topish mumkin emas. Masalan, g'o'za o'simligi o'z-o'zinin changlantiruvchi o'simlik sanalsada, unda chetdan changlanish 20-25 foizni tashkil etadi. S.Odilov, O.Jalilov,

Bular ichidan 250-350 mg. va 550-650 mg. donnililar alohida populyatsiya sifatida ajratib olinib ekildi. "Engil" donli loviyalar populyatsiyasidan olingan hosilda donning o'rtacha og'irligi 443,4 mg. bo'lsa, "og'ir" donnilar populyatsiyasidan olingan hosilda donning o'rtacha og'irligi 518,7 mg. ni tashkil qildi. "Engil" va "og'ir" donli loviya vazni o'changanda sezilarli darajada o'zgarish ro'y bermaganligi ma'lum bo'ldi. Bu natija loviya navi genetik jihatdan farq qiluvchi o'simliklardan iborat ekanligi va har bir o'simlik yangi "sof liniya" uchun asos bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Shundan xulosa qilib aytish mumkinki o'z o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalar mutatsion o'zgaruvchanlik tufayli turli xil genotiplardan tashkil topgan bo'lsalarda, lekin ular o'zaro chatishmaganliklari sababli genotiplari nisbatan gomozigota holatida bo'ldi.

3. Chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarning genetik strukturasi

Chetdan urug'lanuvchilarda organizmlarni o'zaro chatishishlari, ya'ni panmiksya natijasida populyatsiya shakllangan bo'ldi. Shuning uchun ham ularni genetik strukturasi o'z-o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalar genetik strukturasidan tubdan farq qiladi. Chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarning genetik strukturasi amerikalik genetiklar D.Djonson va E.Istlar tomonidan o'rganilgan. Ular tamaki o'simligini gul tojlari turli uzunlikda bo'lgan xillarini chatishitrib duragay sun'iy populyatsiya olib unda gul tojlari uzunligi o'zgarishini kuzatdilar. F_2 dagi duragylarning gul tojlarni uzunligi 52 mm dan 88 mm gacha bo'ldi. Ikkinchini avlod duragay o'simliklar orasidan kalta gultojili va uzun gultojili (A va B) formalari ajratib olinib, birida gul tojlarni uzayishi tomon ikkinchisida qisqarishi tomon sun'iy tanlash ishlari olib borildi. Sun'iy tanlash mobaynida A - liniyalarda gultojlarni qisqartirish tomon, ya'ni har bir avlodda olingan o'simliklarni gul tojlari eng qisqa formalarini o'zaro chatishirish natijasida, B - liniyasida aksincha gul tojlarni uzaytirish tomon gul tojlari eng uzun bo'lgan formalari o'zaro chatishirilib keyingi avlodlar olindi. F_3 ga kelganda A va B liniyalar gul tojlari bir biridan keskin farq qildi. Binobarin tamaki o'simligida gul tojlari uzunligini o'zgartirish bo'yicha olib borilgan sun'iy tanlash natijali bo'ldi. Demak chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalar turli xil genotiplardan tashkil topgani uchun ularni genotiplari geterozigota holatida bo'lib tanlash natijasida o'zgarib turadi. (14-jadval)

X.Jumabekov ma'lumotlariga ko'ra g'o'zaning AN 208 navida 4, AN 211 navida 5, Toshkent-1 navida 6 xil genotiplar mayjud. Chetdan chatishadigan o'simlik, hayvon populyatsiyalarini tarkibi har xil genotipga ega organizmlarning o'zaro erkin chatishishi bilan belgilanadi. Populyatsiyadagi u yoki bu genotipga ega organizmlar miqdori har xil genotipli ota-onalarni gametalarining o'zaro uchrash tezligiga bog'liq. Tabiiyki populyatsiya tarqalgan hudud sharoitiga moslashgan genotipi larning gametalarini o'zaro uchrashishlari shu sharoitga unchaliq moslashmagan organizm genotip gametalarining o'zaro uchrashishlariga nisbatan ko'p bo'ladi. Bundan tashqari populyatsiyalarda doimo mutatsiyalar ro'y berishini hisobga oladigan bo'lsak tabiiy sharoitda tarqalgan har bir populyatsiya genetik jihatdan nihoyatda har xil genotiplardan tashkil topganligiga shubha qolmaydi.

Tabiiy sharoitda populyatsiya genetikasini o'rganishning bir usuli undagi tezligini aniqlashdan iborat. Biror populyatsiyada AA va aa allellariga ega formalar teng deb faraz qilaylik. U holda bunday o'simlik populyatsiyasida spermatozoidlarda dominant va retsessiv allellari 0,5 A va 0,5 a teng bo'ladi, 0,25, geterozigota Aa-0,50, gomozigota aa-0,25 nisbatda bo'ladi. Keyingi holatda chatishsalar dominant allel A-0,50, retsessiv allel a-0,50 nisbati teng bo'ladi. Chetdan chatishuvchi populyatsiyalarda gen allellarini qanday irsiyanishini izohlash maqsadida 1908-yili Angliyada matematik G.Xardi va Germaniyada vrach V.Vaynberg bir-biridan mustasno populyatsiyalar etdilar. Ularning mulohazasiga binoan ma'lum sharoitlarda allellarning takrorlanishi o'zgarmasa, mutatsiya ro'y bermasa populyatsiyalarda dominant va retsessiv formalarning o'zaro nisbati o'zgarmay qoladi. Xardi-Vaynberg uchrash tezligi q, retsessiv d allelining uchrash tezligini esa $(1-q)$ bilan belgilansa ularning o'zaro uchrashishidan hosil bo'lgan avlodlarda genotipik sinflar nisbati shunday bo'ladi:

q^2	qD	$(1-q)d$
qD	$^2 DD$	$q(1-q)Dd$
$(1-q)d$	$q(1-q)Dd$	$(1-q)^2 dd$

Agar olingan natijalarni jamlasak u holda Xardi-Vaynberg formulasiga ko'ra genotipik va fenotipik sinflarning taqsimlanishi tubandagicha ko'rinishda bo'ladi: $q^2DD : 2q(1-q)Dd : (1-q)^2dd$. Ushbu formula muvoziq mazkur populyatsiyada tanlanish ro'y bermasa fenotipik sinflarning o'zaro nisbati belgililar oraliq holda irsiyanishida yaqin namoyon bo'ladi. Nazariy jihatdan chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarda genotipik sinflar Xardi-Vaynberg formulasiga binoan teng nisbatda bo'ladi. Shunday bo'lsada, chetdan changlanuvchi populyatsiyalar Xardi-Vaynberg qonunida ko'rsatilgan tenglikda chetlashgan bo'ladi va bu Xardi-Vaynberg notengligi deyiladi. O'z-o'z urug'laniruvchi organizmlardagi irsiyanishga Xardi-Vaynberg qonuni latbiq etilmaydi.

5. Populyatsiyaning genetik dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar

Evolutsion jarayonda populyatsiyadagi bir genotip ikkinchi genotip bilan almashinib turishi mumkin. Bu esa sifat jihatdan fikirluvchi genotiplar sonining o'zgarishiga olib keladi. Populyatsiyalarda genotiplar nisbatining o'zgarishi populyatsiyadining mohiyat isoda etadi. Populyatsiyaning genetik jihatdan o'zgarishi mutatsion kombinativ o'zgaruvchanlik bilan uzviy bog'liq holda amalgalashadi. Populyatsiya dinamikasining genetik omillariga **mutatsion jaray**, **tanlanish**, **alohidalanish**, **populyatsiyalar to'lgini va genlar dreyfi kina**.

A) **Mutatsion jarayon:** populyatsiyadagi genlar tezligini nisbatdoimiy takrorlanishi mutatsiyalar kuzatilmasa yuz beradi. Bu populyatsiyalarda vaqtiga vaqtiga bilan mutatsiyalar sodir bo'lishi tabiiy hol. Mutatsiyalar populyatsiyalar evolyutsiyasini o'zgartiruvchi birlashtirishni sanaladi. Irsiy birlik hisoblangan genda mutatsiya ro'y beradi, ahyon-ahyonda kuzatiladigan hodisa bo'lsada, shunga qaramay organizmlarda genlar soni, populyatsiyada esa organizmlar soni kengaytiriladi. Har qanday mutatsiya tarixiy jarayonda tarkibini nisbatan muqim genetik sistema bir butunligini o'zgartiradi. Chunqichu A gen alleli mutatsiyaga uchrab a allelini hosil etsa, avlodlarda bora A alleli son jihatdan kamayib, a alleli qulay sharoitda aksa ko'paya boradi. Xuddi shunday mulohazani B yoki C geniga nisbatan aytish mumkin. Populyatsiyadagi gen allellari muvozanatini o'zga uning genetik tarkibini o'zgarishiga olib keladi. Lekin populyatsiyalarda yangi mutatsiyaning tarqalishi uning organofondida hayotchanligiga, urchishiga qanday ta'sir etishiga bog'liq. Agar mutatsiya

orasida letal, yarim letal, pushtga salbiy ta'sir etuvchi xillarini uchrashishi e'tiborga olinsa, u holda ana shunday mutatsiyalar hisobiga populyatsiyadagi individlar soni kamaya boradi.

Ko'p holatlarda yangi mutatsiya populyatsiya uchun zararli, ahyonda esa foydali bo'lisi mumkin. Dominant mutatsiya geterozigota holatda fenotipda retsessiv mutatsiya faqat gomozigota holatdagina tanlanish nazoratida bo'ladi. Retsessiv mutatsiyani populyatsiyada ko'payishi, gomozigota holatda bo'lisi shu gen bo'yicha geterozigota organizmlarning uchrashish tezligiga bog'liq. Populyatsiya egallagan maydon kichik bo'lsa geterozigota organizmlarning o'zaro uchrashish ehtimoli ko'proq, katta bo'lsa retsessiv allel genni gomozigot holatga o'tish ehtimoli kamroq bo'ladi.

B) Populyatsiyaning genetik dinamikasida tanlanishning roli: muhit sharoitiga moslashgan organizmlarni yashab, nasl qoldirishi tanlanish deyiladi. Shaxsiy taraqqiyotida organizm yashab, nasl qoldirishi ko'p jihatdan muhit sharoitiga qay darajada moslashganligi bilan izohlanadi. Populyatsiya genetikasini bilish genotipning tanlash qiymatini aniqlash imkonini beradi. Birog populyatsiyada gomozigota retsessiv allelli organizmlar (aa) 99%, dominant allelli (AA) organizmlar esa 100% nasl qoldiradi deb faraz qilaylik. Ular orasidagi tanlanish farqi ya'ni genotiplarni tanlanish koefitsienti S ni ifodalasak, bu populyatsiyada tanlanish koefitsienti $S=1,00-0,99=0,01$ ga teng bo'ladi. Mabodo qolish va nasl qoldirish ehtimoli teng bo'lsa, tanlanish koefitsienti 0 bo'ladi. Populyatsiyadagi ikki xil AA, aa allellariga ega organizmlardan biri pushtsiz bo'lib nasl qoldirish imkoniyatiga ega bo'lmasa, u holda tanlanish koefitsienti 1 ga teng bo'ladi. Agar, gomozigota retsessiv allelli organizmlar tanlanish tusayli yaroqsizga chiqarilsa, u holda avlodlar sari bu allelning populyatsiyadagi uchrashlik darajasi kamaya boradi. Tanlanish doimo muhit sharoitiga mos bo'ligan genlarning dominant holatda tarqalishini cheklab boradi. Shu ma'noda yashash uchun kurashning organizmlar orasidagi nasl qoldirish bo'yicha o'zaro poygaga qiyoslash mumkin. Ana shunday poyga natijasida populyatsiyadagi juda zararli mutatsiyalar to'plami unchalik zararli bo'ligan populyatsiyalar to'plamiga qaraganda kamaya boradi. Aksincha muhit sharoitiga moslashgan mutatsiyalarning populyatsiyadagi to'planishi orta boradi. U yoki bu genlar to'planishi populyatsiyalardagi organizmlar soni bilan aloqador. Populyatsiyalarda individlar soni kam bo'lsa bir xil allelli organizmlarning o'zaro uchrashishi tez-tez bo'ladi. Natijada populyatsiyada gomozigota formalar foizi oshadi va oqibatda tanlanish zararli mutatsiyalarni tez bartaraf

judi. Populyatsiyada organizmlar soni ko'p bo'lgan taqdirda bir xil allelli organizmlarning o'zaro uchrashligi ahyon-ahyonda ro'y beradi, natijada labiyy tanlanish zararli mutatsiyalarga kam ta'sir ko'rsatadi va ular populyatsiya genofondida uzaq davri saqlana boradi.

Populyatsiyadagi dominant va retsessiv allellarni bartaraf etilish tezligi har xil. Populyatsiyalarda dominant alleller retsessiv alleller singari letal, yarim letal, qisman pushtsiz, to'liq pushtsiz formalarni va har xil morfologik, fiziologik kamomadlarni keltirib chiqaradi.

Bunday dominant letal, yarim letal va pushtsizlikni keltirib chiqaruvchi genlar tanlanish tusayli birinchi avloddayoq yaroqsizga chiqadi. Yashovchanligi nisbatan past boshqa dominant genlarni tabiiy tanlanish bir necha avlodlar mobaynida bartaraf etadi. Agar dominant genlar mutatsiyasi organizmning muhitga moslashishini oshirsa u holda tanlanish bunday dominant genlarni avloddan-avlodga o'tgan sari ko'payishni ta'minlaydi. Retsessiv mutatsiyalar dominant mutatsiyalardan farqli ravishda geterozigota holatda populyatsiyalarda to'plana boradi va mutatsiyalarning katta zaxirasini hosil qiladi.

Agar retsessiv mutatsiyalar o'ta zararli va pushtsiz bo'lsa, u holda tanlanish ularni populyatsiya tarkibidan bartaraf etadi. Mabodo retsessiv allel populyatsiya tarkibida 0,5% ni tashkil etsa, u holda Xardi-Vaynberg qonuniga binoan AA-0,25, Aa-0,50, aa-0,25 ga teng bo'ladi. Demak, tanlanish retsessiv mutatsiyalarni populyatsiya tarkibidan to'liq bartaraf eta olmaydi.

V) Alohidalanish: har bir tur turli populyatsiyalardan tashkil topadi. Agar bir populyatsiya bilan ikkinchi populyatsiya o'tasida genlar almashimovi ro'y bermasa, mazkur populyatsiya shu turning boshqa populyatsiyalaridan alohidalaшиб ketadi. Bunday alohidalanish uzoq muddat davom etsa hamda ulardagi tanlanish turli yo'nalishda bo'lsa, populyatsiyalarning bir-biridan farqlanishi orta boradi va nihoyat ular kenja turlarga, agar bu jarayon yana davom etsa yangi turlar ajraladi.

Populyatsiyalarning bir-biridan alohidalanishi geografik, ekologik, biologik, yuksak hayvonlarda esa yana etiologik omillar ta'sirida ro'y beradi. Geografik omillarga populyatsiya tarqalgan hududlar orasida baland tog'larni, katta daryolarni, suv havzalarni paydo bo'lishi kiradi. Ekologik omillar deganda iqlim, tuproqni, namlikni o'zgarishi tusfayli tur tarkibidagi turli populyatsiya orasida erkin chatishish bo'lmasligi tushuniladi. Masalan, dengizda yashab daryolarda urchiyidigan balıqlarni alohidalaшиб populyatsiyalari bo'lib, ular bir-biridan tanasi katta bo'lishi, rangi, tuxum tashlash vaqtini, uning miqdori, yoshi, jinsi yetilish vaqtini bilan tafovut muhit ta'sirida paydo bo'lgan bilan tafovut qiladi. Bunday tafovutlar muhit ta'sirida paydo bo'lgan

modifikatsion o'zgarishlar emas, balki irsiylanish oqibati hisoblanadi. Alohidalanishning biologik omillariga meyoz bo'linishning normal bo'lmasligi oqibatida o'zaro chatishishga to'sqinlik qiluvchi kamomallari gametalarni hosil bo'lishi, xromosoma abberatsiyalar, yadro-sitoplazmatik nomuvofiqlik, letal mutatsiyalar va pushtsizlikni ortib ketishi kabi holatlar kiradi.

G) Genlar dreyfi. Har bir populyatsiya o'ziga xos gen allellariga ega. Agar populyatsiya tarkibidagi individlar son jihatdan ko'p bo'lsa, dominant allel bilan retsessiv allel o'rtasida muvozanat uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Mabodo populyatsiya tarqalgan hududda favqulodda hodisa-yong'inlar, yer qimirlashi, urushlar, epidemiyalar ro'y berishi natijasida ma'lum bir genotipni saqlanib qolishi, uning keyinchalik populyatsiyada keng tarqalishi natijasida tor doiradagi genlar to'plamini vujudga kelishi **genlar dreyfi** deb ataladi.

Ayrim holatlarda genlar dreyfi populyatsiyadan tasodifan ajralgan kam sondagi individlar avlodida ham kuzatiladi. Masalan, 1770-yili Amerikaning Lankaster shahriga ko'chib kelgan mennonit mazhabiga mansub uch erkak va ayoldan tug'ilgan nasllarning alohidalashgan holda yashashi va o'zaro nikohlanishi tufayli paydo bo'lgan 8000 odamlar populyatsiyasida anchagina pak-pakana va ortiqcha barmoqli shaxslar uchragan. Mennonitlarning AQSh da tarqalgan boshqa guruhlarida esa bunday irsiy kasallik kuzatilmagan.

Populyatsiyadan alohidalashgan organizmlardagi allellar to'plami undan farq qilishi mumkin. Xususan bundan taxminan 10000 yil ilgari, muzlanish davrining oxirida Osiyoning Bering bo'g'ozi Kanada orqali Amerikaga o'tgan indeyslar guruhida faqat B alleli uchragan. Mana shu indeys guruhi alohida yashashi tufayli ularning erkak va ayollarini nikohlanishidan paydo bo'lgan hozirgi indeyslar populyatsiyasida B qon guruhi uchraydi. Yangi populyatsiya uchun oson bo'lgan gen allellariga ega organizmlar avlod boshi deyiladi.

6. Evolyutsiyaning genetik asoslari

Populyatsiyadagi genetik o'zgarishlar albatta mikroevolyutsiyaga sababchidir. Gen mutatsiyasidan tashqari xromosoma va genom mutatsiyalari organizmlarning tarixiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. O'simliklar ayniqsa gulli o'simliklar evolyutsiyasida poliploidyaning o'mi niyoyatda beqiyosdir. Sitologik tadqiqotlarni ko'rsatishicha gulli o'simliklarning ko'p turkumlari poliploid turlardan tashkil topgan. Chunonchi kartoshkaning 12, 24, 36, 45, 60, 72, 96, 108, 144 xromosomali turlari mavjud. Bug'doyda esa 14, 28, 42 xromosomali, g'o'zada 26, 52 xromosomali turlar uchraydi. Bunday poliploid turlar

suli, sholi, yeryong'oq, tamaki, gladiolus, gulsafsar, lola, malina, olxo'ri, olma, nok, limon, apelsin va boshqa gulli o'simliklarda aniqlangan. Ochiq urug'li o'simliklarda poli ploidiyakam, lekin qirqulloqlarda, yo'sinlarda noqulay sharoitda ham yashovchan bo'ladi. Shu sababli Arktikada o'suvchi o'simliklarning 70%, Pomirdagilarning 86%, Oltoydagidagi o'simliklarning 65% poliploid turlar sanaladi. Poliploid mutatsiyalarni tabiiy tanlanish orqali tanlanishiga asosiy sabab shuki hujayrada xromosomalar soni karra oshganda zararli retsessiv mutatsiyalarni gomozigota holatga o'tish ehtimoli diploid xromosomali formalarga nisbatan kam bo'ladi. Bu ayniqsa o'z-o'zini changlatuvchi o'simliklar uchun o'ta muhim. Chunki xromosomalari diploid bo'lgan organizmlari retsessiv mutatsiyalarni gomozigota holatga o'tishi tez ro'y beradi.

Yani turlarni hosil bo'lishida bir turga mansub xromosomalarni karra ortishi – avtopolipliodiya bilan bir qatorda bir organizmda har xil turlarga oid xromosomalarning karra ortishi – allopolipliodiyani ham ahamiyati kattadir. Odatda o'simlik, hayvonlarda turlararo duragaylar pushtsizdir. Bunga yorqin misol tariqasida ot bilan eshakning chatishishidan tug'ilgan xachirning nasl bermasligini olsa bo'ladi. Turlararo duragaylarning nasl bermasligi sababi quyidagicha: duragaylarda har xil turlardan o'tgan xromosomalar meyozda o'zaro kon'yugatsiyalashmasligi sababli univalentlar ko'p bo'ladi. Natijada meyoz mahsuloti-gametalar hayotchan bo'lmaydi. Agar turlararo duragaylarning xromosomalari ikki karra ortsu, u holda meyoz jarayoni normal kechadi. Chunki shunday tetraploid o'zida chatishishda qatnashgan har ikki turning diploid to'plamli xromosomalarini jamlagan bo'ladi. Oqibatda har bir turning xromosomalari o'zaro kon'yugatsiyalashdilar va ikki qutbga tarqalib gaploid to'plamli xromosomalari bor gametalarni hosil qiladilar. Turlararo duragaylarning xromosomalar to'plamini ikki karra oshirish hisobiga o'simliklarni pushtli qilish mumkinligini **G.D.Karpechenko** avlodlararo chatishirishdan olingan karam va turp duragaylarida isbotlab berdi (70-rasm). Bu ikki o'simlik turining xromosomalari diplod to'plami $2n=18$ ga teng. Ularni o'zaro chatishirishdan olingan duragayda 9 ta turpni, 9 ta karamni xromosomasini jamlangani sababli, meyoz jarayonida har ikki turga mansub xromosomalar bilan kon'yugatsiya hosil etmagan va gametalar kamomadli bo'lgan. Ayrim holatlarda duragay hujayrasida 18 karam, 18 turp xromosomalari uchrashi kuzatilgan. Bunday hujayralar meyoz bo'linishda normal gametalarni hosil qilgani sababli urug'chi bilan changchi gametalari birlashishi normal bo'lib hosil bo'lgan zigitadan karam-turp o'simligi rivojlangan.

U'z-zaning ham 52
xromosomali yangi dunyo
turlari *G.hirsutum*, va
G.barbadense, eski dunyo
turlari *G.herbaceum*,
G.arboeum turlarini
Janubiy Amerikaning
yovvoyi *G.raimondi* turi
bilan chatishishi va duragay
xromosoma to'plamini ikki
karra ortishi hisobiga kelib
chiqqan degan fikrlar bor.

70 - rasm. *Raphanus*
va *Brassica* hamda ular
duragaylarining mevalari
va xromosomalar to'plami.
1 - *Raphanus*. 2 -
Brassica. 3 - *F*, duragay.
4 - triploid duragay. 5 - tetraploid duragay. 6 - pentaploid duragay.
7 - geksaploid duragay. R - turp xromosomalar. B - karam
xromosomalar.

Odatda auto va allopoliploid turlar diploid turlardan reproduktiv jihatdan alohidalashgan. Shunga ko'ta ular o'zaro chatishmaydilar, agar chatishsalar *F*₁ duragaylar pushtsiz bo'ladi. Ba'zan meyoz va mitoz bo'linishda bir qiz hujayraga 1-2 xromosoma ortiqcha yoki kam taqsimlanishi mumkin. Bu hodisa aneuploidiya deb ataladi. Aneuploidiyaning evolyutsion ahamiyati kam. Chunki u ko'pgina hollarda fenotipni keskin o'zgartirib, letal - hayotchanlik pasayishiga olib kefadi. Xromosoma mutatsiyalari orasida duplikatsiyaning evolyutsion ahamiyati katta. Duplikatsiya xromosomadagi genlar sonini ko'payishi va xilma-xil bo'lishini asosiy sababchisidir.

Xromosomalar deletsiyasi duplikatsiyaga qaraganda fenotipni ko'proq o'zgarishiga sababchi sanaladi. Deletsiya gomozigota holatda letal xossaga ega bo'ladi. Translokatsiya va inversiya tufayli paydo bo'lgan mutant formalar mutatsiyaga uchramagan formalar bilan chatisha olmaydi. Natijada populyatsiya ichida evolyutsion divergentsiya ro'y beradi. Gomologik bo'lmagan xromosomalar orasidagi translokatsiya ba'zan yangi turlarni kelib chiqishi uchun asos bo'ladi.

Savol va topshiriqlar

1. O'z-o'zidan urug'lanadigan organizmlarning populyatsiyasidagi genetik jarayonlar nimalardan iborat?
2. Chetdan urug'lanadigan organizmlarning populyatsiyasidagi genetik jarayonlar nimalardan tashkil topadi?
3. Xardi-Vaynberg qonuni. Unga ta'sir etuvchi omillarni yoriting.
4. Populyatsiya dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarga nimalar kiradi?
5. Populyatsiyaning genetik dinamikasini o'rganishda mutatsiya jarayonining rolini gapiring?
6. Populyatsiyaning genetik dinamikasini o'zgarishida tanlash qanday rol o'ynaydi?
7. Genlar dreyfi deganda nimani tushunasiz? Uning qanday ahamiyati bor?
8. Tanlanish koefitsienti qanday aniqlanadi?
9. G.D.Karpechenko tajribasining ahamiyati nimada?
10. Poliploidiya nima?
11. Populatsiya, populyatsiya genofondi, populyatsion genetika nima?
12. Populyatsiyadagi irlisanishni o'rganishda qaysi o'zbek olimlarini ishlarini bilasiz?
13. Populyatsiyalarning alohidalanish xillari?
14. Populyatsiya to'lqinlarini tushuntiring.
15. Populyatsiyadagi genetik o'zgarishlar nimalarga olib keladi?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Populyatsiya dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar
 - A. Mutatsion jarayon, tanlanish
 - B. Alohidalanish, populyatsiyalar to'lqini
 - C. Genlar dreyfi, duragaylash
 - D. A va B javoblar
2. Xardi-Vaynberg qonunini matematik ifodalash
 - A. $(1-q)d^2 : q(1)Dd : (1-q)^2dd$
 - B. $q^2DD : 2q(1-q)Dd : (1-q)^2dd$
 - C. $q^2DD : 2(1-q)Dd : (1-q)^2dd$
 - D. $qD : q(1-q)Dd : q(1-q)Dd$
3. Genlar dreyfi bu:
 - A. Populyatsiyadagi allellar kontsentratsiyasini tasodifiy o'zgarishi
 - B. Ayrim organizmlarni bir populyatsiyadan boshqa populyatsiyaga ko'chishi

- S. Populyatsiyadagi organizmlarning erkin chatishishi
D. Tabiiy tanlanish natijasi
4. *Populyatsiya to'lqini qanday oqibatlarga olib keladi?*
A. Populyatsiya sonini ortishiga sabab bo'ldi
B. Genlar dreyfiga sababchi bo'ldi
S. Populyatsiyadagi genetik xilma-xillik ortadi
D. Populyatsiyadagi genetik xilma-xilligini kamaytiradi
5. *Panmiksiya nima?*
A. Chetdan urug'lanadigan organizmlarni o'zaro chatishishi.
B. Populyatsiyadagi allellar kontsentratsiyasini tasodifiy o'zgarishi.
S. Populyatsiyadagi turli xil organizmlarni erkin chatishishi.
D. Tabiiy tanlash natijasi.
6. *Populyatsiyadagi organizmlar sonining ko'payib, kamayib ketishi nima deb ataladi?*
A. Genlar dreyfi
B. Populyatsiya to'lqini
S. Geografik alohidalanish
D. Biologik alohidalanish
7. *Turlari erkin chatishmasligiga sabab bo'luvchi omillar.*
A. Etalogik alohidalanish
B. Ekologik alohidalanish
S. Geografik alohidalanish
D. Biologik alohidalanish

XI-BOB. XULQ-ATVOR GENETIKASI

Tayanch tushunchalar: Xulq-atvor genetikasining vazifalari, xulq-atvor ko'rinishlari, hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish, shaxsiy, reproduktiv va ijtimoiy xulq-atvorlar, evgenika fani, odam xulq-atvorining genetik asosları.

17§. Xulq-atvor genetikasining vazifalari

1. Hayvon va odamlarning xulq-atvor ko'rinishlarining tarkib topishida genetik va muhit omillarining nisbatini aniqlash.
2. Nerv sistemasi shakllanishini belgilovchi genlar faoliyatini o'rganish.
3. Markaziy nerv sistemasi funksiyasiga ta'sir etuvchi mutant genlar faoliyatini tadqiq qilish.
4. Xulq-atvor genetikasini populyatsiya va evolyutsiyadagi rolini oydinlashtirishdan iborat.

1. Xulq-atvor ko'rinishlari

Xulq-atvor, hatti-harakat hayvon va odam organizmlarning murakkab biologik funksiyasi bo'lib, u tufayli hayvon va odam organizmi tashqi abiotik muhit bilangina emas, balki o'z turi va boshqa turlarga mansub organizmlar bilan aloqada bo'ldi.

Xulq-atvoring fiziologik asosi bo'lib shartsiz va shartli reflekslar sanaladi. Odamlarda mehnat qilish faoliyati hamda jamoa bo'lib yashash bilan uzviy bog'liq holda ikkinchi signal sistemasi rivojlangan. Xulq-atvor ijtimoiy tarixiy - tajriba bilan bog'liq bo'lib, odamning fe'l-atvori axloq-odob doirasida baholanadigan hatti-harakat sistemasidan iborat.

Hayvonlarning o'zini himoya qilish, ozuqa topish, yakka yoki guruh bo'lib yashashi, o'z turiga mansub boshqa jins bilan jinsiy qo'shilishga bo'lgan moyillik va fe'l-atvoring boshqa ko'rinishlari shartsiz reflekslar instinktlar asosida tarkib topadi. Shu bilan birga murakkab tuzilishga ega hayvon fe'l-atvori hayot davomida orttirilgan befarq ta'sirlovchilar bilan shartsiz ta'sirlovchilarning navbatlashishi natijasida hosil bo'lgan tajribalar asosida shakllanadi.

Hayvonlar va odamlar fe'l-atvori shakllanishida markaziy nerv sistemasi, analizatorlar asosiy o'rinni egallaydi. Hayvonlar va odamlarning xulq-atvori bilan etiologiya, zoobiologiya, fiziologiya, ijtimoiy psixologiya shug'ullanadi. XX asrning 50-yillardan boshlab hayvonlar, odam xulq-atvori bilan genetika fani ham shug'ullanmoqda.

Xulq-atvor ko'rinishlari har xil. **D.Dyusberi** hayvonlar xulq-atvoring

uch guruhgaga ajratadi. Ular shaxsiy, reproduktiv va ijtimoiy xulq-atvorlardir.

I. Shaxsiy xulq-atvor shakllari:

1. Uyg'unlashgan harakatlar.
2. Oziqlanish, nafas olish (ozuqani topish, uni zahirada asrash, kistorodga boy joyni tanlash) bilan bog'liq hatti-harakatlar.
3. O'z tana haroratini boshqarish.
4. Pana joy topish.
5. Yirtqichlardan qochish.
6. Uyqu.
7. Tanani toza tutish.
8. Biologik maromlar.
9. Biror narsani tekshirib ko'rish.
10. O'yin.
11. Tayyor quroldan foydalanish.
12. Ayyorlik qilish.

II. Reproduktiv xulq-atvor (o'zga jinsnai jaib etish) shakllari:

1. Jinsiy qo'shilishdan oldin o'yin ko'rsatish.
2. Chiroli ko'rinish orqali.
3. «Ashula» orqali.
4. Kuch orqali.
5. Hatti-harakat orqali.
6. Qarama-qarshi jinsnning ko'nglini "ovlash".
7. Tuyg'uni ifodalash orqali.
8. Naslga g'amxo'rlik ko'rsatish.

III. Ijtimoiy xulq-atvor shakllari:

1. Yo'lboshchilikka intilishga oid hatti-harakatlar.
2. To'dada bo'ysinish tartibi.
3. To'dami himoya qilish.
4. To'dadagi erkak organizmlar orasidagi munosabat.
5. Ota-onalar bilan ularning nasllari orasidagi munosabat.
6. Oziqlanishda bo'ysunish tartibi.
7. Jinsiy qo'shilish davrida bo'ysunish tartibi.
8. Hayvonlarning «tili».
9. Jamoada funktsiyaning taqsimlanishi.

2. Hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish

Hayvonlardagi murakkab hatti-harakatlar genga bog'liq ekanligi tajribalarda isbotlangan. Chunonchi kumushsimon qora yungli tulkilarning ba'zilari odamga nisbatan tajovuzkor, qo'rkoq yoki mo'mintoy bo'ladi.

Akademik D.K.Belyayev o'z shogirdlari bilan kumushsimon qora yungli tulkilalar orasida bir necha yil davomida turli yo'nalishda sun'iy tanlash o'tkazdi, hatto harakati xuddi itlarnikidek va yoshligidan o'ta tajovuzlar tulkilarni yetishtirishga muvofiq bo'ldi. Tulkilarga bundan hatto harakat o'rgatish emas, balki genlar faoliyatining natijasi ekanligi tajribada aniqlandi.

Klassik genetikada ayrim belgilarning irsiylanishini bilish uchun qo'llaniladigan metodlardan hayvonlar xulq-atvorini o'rganishga oid tajribalarda ham foydalilanadi. Hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish uchun avvalo qaysi xususiyatini o'rganish aniqlanib olinadi. Misol tariqasida hayvonlar xulq-atvoridagi tanani toza tutish yoki tanani toza tutmaslik, jinsiy qo'shilishga moyillik, jinsiy qo'shilishga befarq, qarama-qarshi jins bilan qo'shiladigan, gomoseksuallar, nasl uchun qayg'uradigan, nasl uchun unchalik qayg'urmaydigan kabi belgilarni olish mumkin. Mana shunday belgilarga ega va ega bo'limgan urg'ochi va erkak hayvonlar tanlanib olinadi va alohida-alohida urchitiladi. Ularni urchitish to gomozigota izogen liniyalarni hosil etguncha davom ettiriladi.

Gomozigota individlar hosil bo'lganligiga ishonch hosil qilingach, qarama-qarshi xossalarga ega individlar o'zaro chatishirilib, duragay organizmlar olinadi. F₁ duragay organizmlarning erkak va urg'ochilarida u yoki bu xususiyat qay darajada namoyon bo'lishi kuzatiladi yoki maxsus metodlar yordamida aniqlanadi. Birinchi avlod duragaylarining erkak va urgochi formalarning bir-biri bilan chatishirilib, ikkinchi avlod olinib, ularda tekshirilayotgan belgi-xossaga ega hamda ega bo'limgan yoki o'rganilayotgan belgini o'rtacha namoyon qilgan hayvonlar nisbati aniqlanadi. Shuningdek F₁ duragaylarda tahvilayotgan belgi bekrossdan hosil bo'lgan individlarning qanchasida o'rganilayotgan belgi borligi, yo'qligi yoki oraliq holda rivojlanganligi tahvil qilinadi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib o'rganilayotgan belgining qaysi biri dominant, qaysi biri retsessiv ekanligi, ular bir gen yoki ikki gen ta'sirida rivojlanganligi aniqlanadi. Masalan, drozofilada xulq-atvor bilan bog'liq ko'rish, oziqlanish, hid bilish, jinsiy qo'shilishga moyillik, himoyalanish kabi xususiyatlar irsiylanishi o'rganilgan. Hozirgi vaqtga kelib drozofila *severless* (sey) geni bo'yicha mutant formalarda ultrabinafsha nurlarga nisbatan fototaksis yo'qolishi, *small-optic-lobes* (sol) genining mutatsiyasi natijasida qo'g'irchoqlik davrida "bosh" miyaning ko'rish pallasining 50% hujayralari yemirilishi oqibatida voyaga yetgan drozofila biror narsaga qo'nish paytida mo'ljalni to'g'ri ololmasligi aniqlangan. Drozofilada hid sezish organi antennada joylashgan. Unda ayrim teshiklar bo'lib, uning ichiga hid molekulalari kirishi tufayli antennadagi neyronlar bosh miyaga

tassurotni yetkazadi. Neyronlar 1000 ta atrofida bo'ladi, shunga ko'ra drozofila ko'p hidlarni farqlay oladi. Aldegid, esirni sezish neyronlar faoliyatining 6 ta: *olfA*, *olfB*, *olfC*, *olfD*, *olfE*, *sbl* genlar nazoratida ekanligi ma'lum bo'lgan. Drozofilada jinsiy qo'shilish paytidagi fe'l-atvorning genetik asoslari ham o'rganilgan. Ma'lum bo'lishicha, jinsiy qo'shilishiga urg'ochi drozofilaning moyilligini ro'yobga chiqarish uchun erkak drozofila «o'yin» ko'rsatishi lozim. Mazkur «o'yin» urg'ochi drozofilaning qormini qitiqlash, uning atrofida aylanib uchish, jinsiy qo'shilish uchun urg'ochining qorin qismini o'ziga tortish va 50 sekund mobaynida tez-tez qanot qoqib «ashula» aytishdan iborat.

Drozofilada ko'rish, hid sezish, eshitish bilan bog'liq mutatsiya jinsiy qo'shilish paytida «ko'nglini» ovlashga ta'sir etish mumkin. Odatda, erkak drozofila urg'ochini ko'rmaydi yoki garang urg'ochi pashsha erkak drozofilaning «sevgi ashulasini» eshita olmaydi. Jinsiy qo'shilish bo'yicha qilinadigan fe'l-atvorlar genlar nazoratida bo'ladi. Chunonchi, *slak* genini mutatsiyasi tufayli ashula davomiyligi o'zgaradi. Normal drozofilalarda ashula davomiyligi 55 sekund. *slak* mutatsiyasi ro'y berganda uning davomiyligining kamayishi (40 sek) yo ko'payishi (80 sek) ma'lum bo'lgan. *Hni* geni mutatsiyaga uchrasa, erkak organizm urg'ochining kamayishi (40 sek) yo ko'payishi (80 sek) ma'lum «ko'nglini» ovlay olmaydi. *Fru* (pushtsiz) geni mutatsiyaga uchrasa erkak drozofilaning jins bilan bog'liq xulq-atvori o'zgaradi. Ular urg'ochi gomoseksual pashshalariga aylanadilar. *Sluggish* geni bo'yicha mutantlar esa ham urg'ochi, ham erkaklarni «ko'nglini» ovlaydi. *Les* genida mutatsiya urg'ochi pashshalarini ko'nglini ovlaydi.

Ichkilikka yuqori darajada moyil va moyil bo'Imagan sichqonlarning inbred liniyalarini chatishdirib, so'ng ularning F_1 va F_2 dagi nasllarning har birini ichkilikka bo'lgan talabini o'rganish natijasida mazkur belgi bo'yicha farq ikkita bir-biri bilan bog'liq bo'Imagan genlar uyushmasiga bilan tojovuzkorligi past sichqonlar chatishdirilganda F_2 duragaylarini tajovuzkorligi yuqori bo'lishi dominantlik qilgan. Tajovuzkorlik sichqonlarda gen mutatsiyasi tufayli ro'y berishi aniqlanadi.

3. Yevgenika fani

Odamlarning xulq-atvori doimo olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan. Genetika fan sifatida shakllanmasdan ancha ilgari ham olimlar odam xulq-atvori, ruhiyatini irsiyanishi bilan qiziqqanlar. Masalan, eramizdan

ancha ilgari yashagan antik dunyo olimi **Platon** birinchi bo'lib nikohlarni davlat tomonidan boshqarishning lozimligini ta'kidlagan. U jismoniy jihatdan o'ta baquvvat bolalarni dunyoga keltirish uchun qanday erxotinlarni saralash lozimligi haqida fikr bildirgan. XIX asrda yashagan **F.Golton** iste'dodli odamlar shajarasini o'rganib ikki xil xulosaga keldi. 1) Ulug' iste'dodlar avloddan-avlodga beriladi. 2) Har bir odam xulq-atvori, iste'dod hamda kasallikni ifodalovchi belgilarni zahirasiga ega.

F.Golton evgenika fanining otasi hisoblanadi. Mazkur atama yuno tilidan olingen bo'lib, «yaxshi, ma'qul odamlarni tug'ilishi» degan ma'nori anglatadi. Olim nufuzli oilalar shajarasini o'rganib, shaxslarning jamiyatdagi faoliyati irsiyatga bog'liqligini qayd qiladi. Masalan, AQShda Edvardslar avlodidagi 1394 erkakning to'rtadan uch qismi jamiyat hayotida iz qoldirgan va tarix sahifalaridan o'rinn olgan shaxslar bo'lgan.

Tarixchilarning ma'lum qilishicha buyuk kompozitor **I.A.Bax** avlodidan muzikaga iste'dodi bor shaxslar 56 ta bo'lgan. Buyuk bobomiz **'Amir Temur avlodlari orasida Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Xumoyun, Akbarshohlar** yetishib chiqqanligi qobiliyat, iste'dod kabi belgilarni avloddan-avlodga irsiyanishidan dalolat beradi. Qobiliyat iste'dod bilan bir qatorda odamdagisi salbiy xislatlarni ham avloddan-avlodga o'tishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bor. Chunonchi XVIII asrda Shimoliy Amerikada yashagan aroqxo'r baliqchi Dijuka va yengil tabiali firibgar, aroqxo'r bo'lgan. Shunga o'xshash dalillarga asoslanib turli mamlakat siyosatdonlari aqli zaif, aroqxo'r jinoyatchilardan qutilish uchun zararli genlarni o'zida saqlovchi odamlarni bichish zarurligi to'g'risida fikr bildiradilar va uni «odam zotini yaxshilaymiz» degan shior ostida targ'ib qila boshladilar. Oqibatda XX asrning birinchi yilligida Amerikaning 22 shtatida, Angliya, Estoniya kabi mamlakatlardagi tajovuzkorlikka moyil erkaklar bichila boshlandi.

Rossiyada XX asrning 20-30-yillarda evgenik olimlarda **Y.U.A.Filipchenko, S.A.Serebrovskiylar** ziyoli, iste'dodli odamlarni genlarini jamiyatning boshqa a'zolariga tarqatish kerak, "sovet jamiyat" uchun yangi odam zotini yaratish lozim, shundagina besh yillardagi mo'ljalangan rejalarini ikki yilda bajarish mumkin degan g'ayri ilmoyani ilgari surdilar.

XX asrning 30-yillariga kelib evgenika jamiyat uchun zararli so'rolli millatchilar fani deb e'lon qilindi hamda bu sohadagi tadqiqotlar to'xta qo'yildi. Evgenika to'g'risida mulohaza yuritganda uchta masala muhokama qilish kerak. 1) Odamlarda zararli irsiy belgi-xossalalar bor va ular avloddan-avlodga o'tgan sari orta boradimi? 2) Fandagi maj

tadqiqot metodlari yordamida zararli belgilarni odamlarda kamaytirish mumkinmi? 3) Agar kelgusi avlodlarning irsiyatiga ta'sir etish mumkin bo'lsa, uni boshqarish uchun axloq hamda yuridik huquqqa egamizmiz! Bu haqda to'xtab hozirgi vaqtda odam tanasining har bir organiga sistemasida yuzlab nuqsonlar-kasalliklar borligi va ularning ko'pchiligi gen funksiyasiga bog'liq ekanligi aniqlanganligini qayd etish kerak.

Odamlar orasida jismonan nogiron, qo'l, oyoqlari qisqa, aqli zaif, ruhiy boshqa kasali bor shaxslar uchrashi barchaga ayon. Kuzatishlarning ko'rsatishicha aqli zaif erkak va ayoldan aqli zaif farzandlar tug'iladi. Un qanday oldini olish mumkin? Insoniyat oldida turgan bunday muammoni turli qonunlar yoki taqiq qilishlar asosida hal qilib bo'lmaydi. Mazkur muammoni yechimini topish har bir insonni o'ziga havola qilinadi va bunda ularning "**genetik savodxonligi**" muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun odam irlsiyatini o'rganish va har bir insonni "**genetik savodxonligi**" ni oshirish hozirgi vaqida nihoyatda dolzarb sanaladi.

4.Odam xulq-atvorining genetik asoslar

Odam xulk-atvori hayvonlar fe'l-atvorida qanday jihatlari bilan farq qiladi degan masalaga e'tiborni qaratmoq kerak. **Birinchi tafovut** shundan iboratki, odamlar eng yuksak darajada rivojlangan hayvonlardan o'zining aql-zakovati, fahm-farosati bilan farqlanadi. Itlar, maymunlar, delfinlar so'zni tushunishlari, tana harakati tuyg'uni ifodalash orqali o'z xohishlarini bildirishlari mumkin. Lekin ular tushunib, fikrlash qobiliyatiga ega emaslar ya'ni ularda narsalarning asosiy xossalari to'g'risida abstrakt tasavvur shakllanmaganligini qayd etish zarur. Agar hayvonlarning fikrlashi haqida gap ketsa hamma vaqt uning konkret ekanligini ulardan farqli ravishda insonlarda mavhum umumlashgan, tushunarli, mantiqiy fikrlash kabi faoliyat rivojlanganligini ta'kidlash kerak. To'g'ri, yuksak darajada rivojlangan hayvonlar bilan odam fe'l-atvori o'rtasida juda ko'p o'xshashliklar bor. Masalan, maymunlar xursand, xafa, g'am-g'ussa, ayb ish qilganligini tuyg'u orqali ifodalaydilar.

Yuksam hayvonlarda qiziquvchanlik, diqqat, xotira, xayol hamda xulq-atvorning murakkab shakllari mavjud bo'sada, odam biror ish qilishdan oldin uni qanday bajarish rejasini tuzadi. Binobarin odam tushunib fikrash qobiliyatiga ega bo'lishi sababli nima qilayotganini biladi. Odamlar xulq-atvori bilan hayvonlar fe'l-atvoridagi **ikkinchchi tafovut** odamlarda ikkinchi signal sistemasi - nutqning taraqqiy qilganligidir. Hayvonlar bir-birlari bilan tovush signallari yordamida, odamlar esa so'z orgalij aloqada

bo'ladilar. So'z odamlar xulq-atvoriga ta'sir etuvchi kuchli omil sanal qilib. Odamlar xulq-atvorining hayvonlar fe'l-atvoridan **uchinchchi farqi** mehnat sanaladi. To'g'ri ayrim hayvon turlari ham «mehnat» qiladilar. Ular o'zari uchun in, uya yasaydilar, o'rgimchaklar to't «to'qiyidilar», maymu'lar tayoq yordamida mevalarni oladilar yoki ozuqalarini suvgaga chayib iste' qiladilar. Lekin hayvonlar mehnat qurollarini yasash qobiliyatiga emaslar. Ular atrofdagi muhitga moslashadilar xolos, odamlar esa uni o'zgartiradilar. Shu ma'noda odamni mehnat yaratgan deb aytilish munqin. Shunga qaramay odam xulq-atvori va hayvonlar fe'l-atvori genlarga, xromosomalarga bog'liqligini ta'kidlash joiz. Hayvonlarning fe'l-atvori genlarga bog'liq ekanligini drozofila meva pashshasi, sichqon va bo'nqa hayvonlar ustida olib borilgan kuzatishlar, tajribalar misolida yuqorida yoritildi. Endi odamning xulq-atvorini genetik asoslari xususida o'z yuritamiz.

Odamlarda musiqa va matematikaga bo'lgan qobilyati ko'proq yular faoliyatiga bog'liq. Bu qobilyat inson shaxsiy taraqqiyotining ilk erta da, rida namoyon bo'tadi.

namoyon bo'ladi.

Odamlar xulq-atvorini o'rganishda irlsiy kasalliklarni keşirib chiqaruvchi mutatsiyalar markaziy o'rinda turadi. Hozirgi davrga kelib odamlarda 5000 ga yaqin irlsiy belgilari, kasalliklar o'rganilgan. Odan dagi irlsiy kasalliklarning ayrimlari xulq-atvorning o'zgarishi bitan aloqador. Avloddan-avlodga faqat tashqi ko'rinish, ichki tuzilish, gavdaning kattakichikligi bilan bir qatorda, bosh miyaning tuzilishi, aql-idrok, qobiqliyat, kuchli iste'dod, xotira, muloyimlik, yoqimtoylilik, qahri qajiqlik kabi belgilarga shaxs ko'rsatkichlari ham o'tadi. Har bir odam bi otsial mayjudot. Uning rivojlanishida ijtimoiy omillar, ta'lim-tarbiya, jamoada qadagi odamlarning shaxsga ko'rsatgan ta'siri katta ahamiyatga ega. Lekin odam xulk-atvorini faqat ta'lim-tarbiyaga, jamoa ta'siriga bog'liq deyish nazkar masalaga bir tomonlama yondashishdan iborat bo'lar edi. Tashqi muhit omillari bilan bir qatorda odam xulq-atvoring o'zgarishi, irlsiy omillarning roli nihoyatda katta. Masalan, shizofreniyani misol qilsak, u og'ir ruhiy kasallik qisoblanadi. Bu kasallikka yo'liqqan be'morlarda seruyqulik, yoshi o'tganlarda kam uyqulik, tananing kuchsiz qishishi, yolg'iz qolish istagi yoki kun davomida ko'chatlarda izg'ib yurish, seyjahlliq namoyon bo'ladi. Bemorlarda yana gallutsinatsiyalar «fikrlash bu'libilishi», kuzatiladi. Ota-onas yoki ulardan birini shizofreniya bilan kasallanishi tufayli ularning avlodlarida ushbu kasallik 14,2 dan bir tuxumdan rivojlangan egizaklarda 56,2 foizga yetishi aniqlangan.

Savol va topshiriqlar

1. Xulq-atvor deganda nimani tushunasiz?
2. Xulq-atvor genetikasining qanday vazifalarini bilasiz?
3. D. Dyusberining hayvonlar xulq-atvorini qanday guruhlarga va xillarga ajratadi?
4. Shaxsiy xulq-atvorga nimalar kiradi?
5. Reproduktiv xulq-atvorga nimalar kiradi?
6. Ijtimoiy xulq-atvorgachi?
7. Hayvonlar va odamlarning xulq-atvori qanday metodlar yordamida o'rganiladi?
8. Drozofila meva pashhasida xulq-atvorming qanday xususiyatlarining genetikasi o'rganilgan?
9. Egenika fani qanday fan va unga kim asos solgan?
10. Odamlar nikohini o'zaro taqqoslab F. Golton qanday xulosalarga keldi?
11. Odamning xulq-atvori bilan bog'liq qaysi belgi-xossalar irsiylanadi? Bunga misollar.
12. Odamning xulq-atvori bilan yuksak darajada rivojlangan hayvonlar xulq-atvoridagi qanday o'xshashlik va tafovutlar mavjud?
13. Odamlardagi xulq-atvorni o'zgarishi bilan aloqador qanday kasalliklarni bilasiz? Ularning xulq-atvoridagi o'zgarishlarni tavsiflab bering.
14. Iste'dodli odamlar sulolasidan kimlarni bilasiz?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. D. Dyusberi hayvonlar xulq - atvorini necha guruhg'a ajratgan?
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
2. D. Dyusberi hayvonlar xulq - atvorini qanday guruhlarga ajratgan?
A. Shaxsiy, reproduktiv, ijtimoiy
B. Shaxsiy, g'amxo'rlik, to'dani himoya qilish
C. Tanani toza tutish, tuyg'uni ifodalash, to'dada bo'ysunish tartibi yo'lboschilikka intilish
D. Pana joy topish "ashula" orgali qarshi jinsni jalb etish,
3. Hayvonlar xulq - atvorini bilishda qanday metodlardan foydalilanadi?
A. Xulq - atvori har-xil hayvonlar chatishtiriladi
B. Mutant formalar o'rganiladi

S. Hayvonlar populyatsiyasi tadqiq qilinadi
D. Erkak va urg'ochi hayvonlar xulq - atvori taqqoslanadi

4. Yevgenika faniga asos solgan olim
A. T. Morgan
B. F. Galton
C. A.S. Serebrovskiy
D. YU.L. Filipchenko

5. Yevgenika fanining dasilabki maqsadi
A. Odamlardagi belgi-xossalarning irsiylanishini o'rganishi
B. Yuqori martabali shaxslardagi belgi xossalaringin irsiylanishini o'rganish
C. Yuqori martabali erkak, ayollarni nikohlash yo'li bilan inson zotini yaxshilash
D. Irsiyatida kamchiligi bor odamlarning nikohlanishiga yo'q yomaslik

6. Odamlar psixikasini o'zgarishga olib keladigan kasalliklar.
A. Shizofreniya
B. Morgan sindromi
C. Polidaktiliya
D. Sindakteliya

7. 1920-1930-yillarda Rossiyada yevgenika fanining tarafdarlari

- A. F.Golton, YU.A.Filipchenko
- B. YU.A.Filipchenko, S.A.Serebrovskiy
- C. T.Morgan, S.A.Serebrovskiy
- D. Mendel, F.Golton

8. Klassik genetikada belgilarni irsiyanishi bilan xulq-atvorni o'rganishga oid tajribalar qaysi obyektlarda yaxshi o'rganilgan?

- A. Quyganlar, sichqonlar
- B. No'xatlar, baqalar
- C. Sichqonlar, kalamushlar
- D. Drozofila pashhasi, sichqonlar

XII-BOB. ODAM GENETIKASI

Tayanch tushunchalar: Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rghanishdagi qiyinchiliklar, antropogenetikaning asosiy maqsadi, odam irsiyatini o'rghanish metodlari, tibbiyot genetikasi gen va xromosoma kasalliklari.

18§. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rghanish

Genetika fani o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar bilan bir qatorda odamning irsiyati va o'zgaruvchanligini tadqiq qilish bilan ham shug'ullanadi. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rghanuvchi genetikaning sohasi **antropogenetika** deb ataladi. Odam ham biologik, ham ijtimoiy o'zgaruvchanligi bilan bog'liq barcha metodlarni odamlar irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rghanishda qo'llab bo'lmaydi. Masalan, genetik tadqiqot biror belgi yoki xossani irsiylanishini aniqlash maqsadida shu ma'n etiladi. Bu odam genetikasini o'rghanishdagi **birinchi qiyinchilik**. Odam nasl berishi bilan aloqador. Ma'lumki gulli o'simliklar minglab urug' beradilar, baliqlar yuz minglab tuxum qo'ygani holda, odam bittadan va o'zgaruvchanlik qonun, qoidalarni kashf etish niroyatda mushkul. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rghanishdagi **uchinchchi qiyinchilik** uning naslini juda kech balog'atga yetishi bilan aloqador. O'rta hisobda odamlar 20-22 yoshda farzand ko'radilar. Nevara ko'rishi uchun esa 38-42 yil kerak bo'ladi. Vaholanki, bakteriyalarda ikkita nasl olish uchun 60-90 minut kifoyadir. G'o'za, bug'doy, makkajo'xori va shu singari bir yillik o'simliklar uchun esa ikki yil yetarlidir. Ko'pchilik hayvonlarning balog'atga yetish davri odamlarniga nisbatan ancha qisqa. Chunonchi, drozofila meva pashshasi 10-15 kunda yangi nasl bersa, chumchuqlar bir yilda 2-3 nasl qoldiradilar.

Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rghanishdagi **to'rtinchi qiyinchilik** odamning begona shaxsga uylanishi yoki turmushga chiqishi oqibatida uning irsiyatini geterozigotali holatda bo'lishi. Holbuki genetik tadqiqotlarni o'tkazish va biror xulosaga kelish uchun gomozigota ota-onal organizmlar tanlanib olinadi. Ular esa inbred usulini qo'llash orqali hosil qilinadi. Odamlarda esa bunday usulni qo'llash qonun orqali ma'n qilinadi.

Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rghanishdagi **beshinchi qiyinchilik** nikohlangan ota-onalar bilan ularning farzandlarini har xil sharoitda

tarbiyalanishi bilan aloqador. Genetik tadqiqotlarda biror xulosaga kelish uchun ota-onal organizmlar va duragay nasllari bir xil sharoitda bo'lislari kerak. Chunki, tirik organizmlarda yosh bilan bog'liq ontogenetik va muhit o'zgarishi bilan bog'liq modifikatsion hamda mutatsion o'zgaruvchanlik sodir bo'ladi. Shunday qiyinchiliklarga qaramay odam irsiyatini o'rghanish nazariya va amaliyot uchun niroyatda zarur. **Birinchedan** o'simlik va hayvonlarda ochilgan irsiyat va o'zgaruvchanlik qonunlari, nazariyalari odamda ham o'z mohiyatini saqlaydimi, degan muammoni hal etish kerak. **Ikkinchidan** odam irsiyati qanchalik yaxshi o'rGANILSA, uning tarixiy jarayonda qanday paydo bo'lganligi, boshqacha aytganda evolyutsiyasini oydinlashtirish ijobiyl hal etiladi. **Uchinchedan** odam irsiyati va o'zgaruvchanligini tadqiq qilish orqali odam irsiyatiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va irsiy kasalliklari kelib chiqishi sabablarini bish va odam irsiyatini yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Shunga ko'ra odam irsiyatini o'rGANISHGA ayniqsa keyingi vaqtarda juda katta ahamiyat berilmoxda. Natijada qisqa vaqt ichida antropogenetika fan sifatida shakllanib, uning yangi-yangi shoxobchalari tarkib topdi. Tibbiyot genetikasi, pedagogik genetika, demografik genetika, populyatsion genetika va evgenika, antropogenetikaning shunday tarmoqlari sanaladi.

1. Antropogenetikaning asosiy maqsadi

Antropogenetika tubandagi masalalarni o'rGANADI:


- 1) Odam organizmi va uning organlari, to'qimalarining fiziologik, biohimik, morfologik hamda ruhiy holati, fahm-farosati, aql-idroki, nerv-gumoral koordinatsiyasi qay darajada genetik asoslarga bog'liqligini aniqlash;
- 2) Mikropopulyatsiyalarda belgi-xossalarning takrorlanish tezligi, tarqalishini statistik qonuniyatlarini bish;
- 3) Odam genotipini muhitning turli zararli: kimyoviy, fizikaviy, biologik omillardan saqlanish usullarini ishlab chiqish;
- 4) Irsiy kasalliklarning geografik tarqalishi, ularni kelib chiqish sabablari, ontogenezda namoyon bo'lishi, avlodlarga berilishi, irsiy kasalliklarga tashxis qo'yish, oldini olish bo'yicha tibbiy maslahatlar berish;
- 5) Shaxsni shakllanishida irsiyat va muhitning rolini belgilash;
- 6) Irsiy axborotni kelgusi avlodlarga berilishida xotiraning molekular mexanizmlarini oydinlashtirish;
- 7) Ontogenezda to'plangan axborotni kelgusi avlodlarga berishda signal sistemasining rolini o'rGANISH.

Qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirishda antropogenetika fani maxsus metodlardan foydalanadi.

2.Odam irsiyatini o'rganish metodlari

Odam irsiyati va o'zgaruvchanligi geneologik, sitogenetik, egizaklar, populyatsion, ontogenetik, biokimiyoviy va boshqa metodlar yordamida o'rganiladi.

Geneologik – shajara metodini dastlab F.Galton joriy etgan. Ushbu metod orqali piru-badavlat, ya'ni bir vaqtning o'zida bir necha avlodji mavjud oilalarning shajarasini tuzish va unda ota yoki onaning aynim belgi-xossalari, kasalliklarini avloddan-avlodda namoyon bo'lishi o'rganiladi (71-rasm). Bunda bir ota-onadan tug'ilgan avlodlardagi qarindosh-urug' oilalardagi odamlar soni ko'p bo'lishi shart. To'plangan ma'lumotlar statistik jihatdan tahlil qilinadi.




71 - rasm. Shajara tuzishda ishlataladigan genetik ramziy simvollar.

Tadqiqot natijasida olingan natijalarga asoslanib qaysi belgi-xossalalar dominant, qaysilari retsessiv, qaysi belgi-xossa genlari autosomalarga, qaysi belgi-xossa genlari jinsiy xromosomalarga birikkan holda irsiylanishi aniqlanadi. Retsessiv belgi va xossalalar geterozigota holatda namoyon

bo'lmagani sababli ularni tahlil qilish birmuncha murakkabroq. Chunki geterozigota erkak va ayol nikohlangan taqdirdagina belgi-xossa gomozigota holatga o'tishi va fenotipda ko'zga tashlanishi mumkin. Qarindoshlar orasidagi nikoh retsessiv belgilarning geterozigota holatdan gomozigota holatga o'tishi va fenotipda namoyon bo'lishi uchun qulay imkoniyat tug'diradi. Qarindoshlar orasidagi nikoh deyarli hamma mammakatlar aholisi o'rtaida uchraydi. Professor M.E.Lobashevning ko'rsatishicha Hindistonda u 12,9%, Yaponiyada 5,03%, Gollandiyada 0,13-0,16%, Portugaliyada 1,40%, AQShda (Baltimore) 0,05% ga teng. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh respublikamizning shahar va qishloqlarida ham tez-tez uchrab turadi.

Geneologik metod yordamida odamlarda ko'z rangining qoraligi, qoshlarning enliliqi, kipriklarning uzunligi, labning qalinligi, yuzdag'i sepkililik - dominant, ko'z rangining havorangligi, qoshlarning ensizligi, labning yupqaligi, yuzda sepkilning bo'lmasligi - retsessiv belgi ekanligi, ya'ni retsessiv holda irsiylanishi aniqlangan (72-rasm).



72 - rasm. Autosom dominant belgi (barmoqlarning qisqa bo'lishi)ning shajara bo'yicha irsiylanishi.

Ko'zlar oralig'inining yaqinligi, ko'zlar kattaligi, og'izning kattaligi, labning do'rdayganligi, burunning kattaligi, sochning jingalakligi oraliq holda irsiyanishi ma'lum bo'lgan. Odamlardagi dal'tonizm, gemofiliya kasalliklari jins bilan bog'liq holda irsiyanishi kuzatilgan.

Egizaklar metodi – egizaklar deyilganda bir paytda tug'ilgan

16 - jadval

Egizaklarda ayrim kasalliklarni takrorlanishi (%)da)

Egizaklar tipi	Shizofreniya	Aqli pastlik	Tut-qanoq	May-moqlik	Qandli diabet	Jinoyat-chilik
Monozigota	69	97	67	32	65	68
Dizigota	10	37	30	3	18	28

Bir tuxumdan rivojlangan egizaklarni bir xil sharoitda yoki har xil sharoitda tarbiyalash orqali organizmning shaxsiy rivojlanishida irsiy omillar va tashqi muhitning organizmga ko'rsatgan ta'siri o'rganiladi (73-rasm). Bir tuxumdan va har xil tuxumdan rivojlangan egizaklarni bir xil sharoitda tarbiyalash orqali organizm rivojlanishida irsiy omilning roli bilinadi. Agar biror belgi bo'yicha egizaklarda deyarli farq bo'lmasa, u holda bir tuxumdan, belgililar o'zaro katta farq qilsa egizaklar har xil tuxumdan rivojlangan degan xulosaga kelinadi.



73 - rasm. Monozigota va dizigota egizaklar.

16-jadvalda bir tuxumdan va har xil tuxumdan rivojlangan egizaklarning biri kasal bo'lsa, ikkinchisida ham mazkur kasallik uchrashiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Jadvaldan ko'rinish turibdiki bir tuxumdan rivojlangan egizaklarning biri kasal bo'lsa, ikkinchisining ham kasallanishi foizi niyoyatda yuqori.

Egizaklar metodi qo'llanilganda juft egizaklarning har ikkisi bir xil sharoit yoki har xil sharoitda tarbiyalanganligi e'tiborga olinishi kerak. Egizaklar metodi belgilarning irsiyanish koefitsientini aniq ifodalash uchun imkon beradi.

Sitogenetik metod odam irsiyatini sitogenetik metod asosida o'rganishning asosiy obyekti hujayra bo'lib, bunda xromosomalarning tashqi, ichki tuzilishi, vazifasi tadqiq qilinadi. Odam xromosomalarni o'rganish mitoz bo'linishning metafazasida amalga oshiriladi. Chunki bu

organizmlar tushuniladi. Egizaklar kelib chiqishi jihatdan ikki xil monozigota hamda dizigota bo'ladi. **Monozigota egizaklar** bir otalangan tuxum hujayraning embrional rivojlanish davrida bo'linishidan hosil bo'ladi. **Dizigota egizaklar** esa bir vaqtning o'zida ikkita tuxum hujayraning ikkita urug' hujayra bilan qo'shilishidan rivojlanadi.

15-jadval

Egizaklarda ayrim belgilarning o'xshashligi

Belgi-xossalalar	Foiz hisobida o'xshashlik darajasi	
	Monozigot	Dizigot
Rang:		
Ko'z	99,5	38
Soch	97	33
Teri	100	45
Shakl:		
Soch	100	79
Qosh	100	51
Burun	100	34
Lab	100	65
Qulqoq	98	20

Ba'zan uchta, to'rtta tuxum hujayralar bir vaqtida otalanishi mumkin. Odatda bir zigotadan rivojlangan egizaklarning genotipi bir xil bo'lgani sababli, ular bir-biriga aynan o'xshaydi (15-jadval).

Professor S.I.Alixanyan va boshqa mualliflarning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra 1985-yilda Yer yuzi aholisi orasida 30 mln. dizigota, 15 mln. monozigota egizaklar borligi aniqlangan. Egizaklarda faqat morfologik belgilargina emas, hatto tovush, yurish, tuyg'uni ifodalash, qo'l va gavdani harakatlanishi, qon tuzilishi, ta'mni bilish kabi belgi-hususiyatlar o'xshash bo'ladi. Qayd etilganlardan tashqari egizaklarda turli kasalliklarning namoyon bo'lishiha ham o'xshashlik kuzatiladi (16 - jadval).

bo'linish fazasida xromosomalar to'liq shakllangan va hujayraning markaziy qismida joylashgan bo'ladi. Sitogenetik metod yordamida somatik hujayralardagi xromosomalar soni, tuzilishidagi o'zgarishlar va ular ta'sirida fenotipning o'ziga xos tafovutlari aniqlanadi.

Shaxsiy taraqqiyot mobaynida har xil to'qima hujayralarining bo'linishi oqibatida ularda xromosomalar miqdori o'zgargan yoki qayta shakllangan tuzilishini o'rghanishda sitogenetik metod bebaho sanaladi. Ma'lum individlar, hujayralar kuzatiladi. Ayrim xromosomalarning tarqalmasligi faqat meyozda emas, balki somatik hujayralarda ham ro'y beradi. Shu sababli odamlarda XO/XX, XO/XXX, XO/XXXX xromosomali ayollar, XO/XY, XO/YYY xromosomali erkaklar uchraydi. Somatik hujayralarda xromosomalarning tarqalmasligi yoki ularagi translokatsiya, deletsiya ayollarning yoshi ulg'aygan sari kuchaya boradi. Oqibatda xromosoma bilan bog'liq kasalliklarning foizi orta boradi. Masalan, 19 yoshli homilador ayollarda Daun kasali bilan tug'ilgan bolalarning foizi 0,03-0,04 bo'lsa, 40 yoshli va undan katta yoshli homilador ayollarda 0,2-0,81 foizga ortganligi aniqlangan.

Populyatsion metod yordamida odamlar populyatsiyasidagi turli genlarni yoki xromosoma tuzilishidagi kamchiliklarni tarqalishi o'rGANILADI. Populyatsion metod matematik-statistik metodiga asoslanadi. Populyatsiyaning genetik tuzilishini bilish uchun keng hajmi tадqiqot o'tkazish va unda populyatsiyaning bir butun holati tадqiq qilinishi lozim. Tanlab olingen odamlar populyatsiyada u yoki bu fenotipi belgilarning tarqalishi tадqiq qilinadi. Shundan keyin ana shu fenotipi belgilarning populyatsiyada takrorlanish darajasi belgilanadi. Populyatsiyada u yoki bu genni belgining takrorlanish tezligi Xardi-Vaynberg formulasi asosida hisoblab chiqiladi va unga qarab u yoki bu genning - belgining uchrashlik foizi, darajasi to'g'risida mulohaza yuritiladi. Genning takrorlanish darajasini bilish ayniqa yaqin qarindoshlar o'tasidagi nikoh oqibatlarini baholashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Populyatsiyalarda har xil irlsiy kamomadli individlarning uchrash darajasi genlar, belgililar bo'yicha turlichadir. Bunda albatta retsessiv allellar geterozigota holatda bo'lishi e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Chunonchi, albinizm Yevropa mamlaktlarida 20000 odamdan bittaning fenotipida namoyon bo'lsa, uning alleli geterozigota holatda 70 odamdan bittasida uchraydi.

Jins bilan bog'liq kasalliklarni irlsiyanishida boshqacha holat kuzatiladi. Masalan, daltonizm kasalligini keltirib chiqaruvchi bir necha allellar bor bo'lib, ular X jinsi xromosomaning ikki joyidan o'rIN olgan. S.A.Serebrovskiy ma'lumotlariga ko'ra 1930-yillarda Moskva aholisi o'tasida erkaklarning 7% da daltonizm kasali uchrasa ayollarning 13%

da uning allellari geterozigota holatda bo'lgan. Qarindoshlar o'tasidagi nikohning zararli oqibatlari ayniqa alohidalashgan kam sonli odamlar populyatsiyalarida tez ko'zga tashlanadi. Chunonchi, Janubiy Panamaning chetki viloyati San Blazdag'i Karibkun qabilasida albinos odamlar nihoyatda ko'p. Shveysariyaning Rone daryosi qirg'og'idagi qishloq aholisining 2000 tasining 50% kar-soqov, 200 tasining qulog'i eshitishida kamchilik uchraydi.

Ontogenetik metod retsessiv allellarning geterozigota holatda va xromosomalarning qayta tuzilishini fenotipga qarab aniqlash imkonini beradi. Retsessiv allellarning geterozigota holatda namoyon bo'lishini genetik sababi dominant allellar tomonidan u yoki bu metabolit sintezi to'liq amalga oshmasligidir. Shunga ko'ra hozirgi vaqtida geterozigota holatdagi retsessiv allellarni aniqlash metodlari ishlab chiqilmoqda. Masalan, fenilketonuriya kasalligi (qonda fenilalanin aminokislotasi miqdorining ortishi) fenilalaninni organizmga yuborish, so'ngra uning miqdorini qon plazmasida aniqlash orqali bilinadi. Agar mazkur allel bo'yicha odam geterozigota holatda bo'lsa qon plazmasida fenilalaninning miqdori ko'proq, mabodo gomozigota holatda bo'lsa normal miqdorda bo'ladi. Hozirgi vaqtida ontogenetik metod biokimyoiy, immunologik va molekular biologik metodlar bilan to'ldirildi.

Biokimyo, molekular biologiya sohasida ishlayotgan olimlarning sayi-harakati bilan odam genomi tilsimi aniqlandi. Odamning haploid genomi $2,9 \times 10^9$ nukleotidlar juftligidan tashkil topganligi ma'lum bo'lidi. Uning atigi 1 foizi kodlovchi ekzonlardan, 24 foizi kodlamovchi intronlardan, 75 foizi genlar oralig'idan iboratligi aniqlandi.

Biokimyoiy metod yordamida qon, siyidik, oshqozon shirasi va hokazolar tarkibini o'rGANISH, tahsil qilish yo'li bilan galaktozemiya, fenilketonuriya, qandli diabet, gemosiliya va boshqa shunga o'xshash kasalliklarni mutant genlar ta'sirida modda almashinishini o'zgarishi natijasida paydo bo'lishi ma'lum bo'lidi.

3. Odam genomni

XX asrning ikkinchi yarmida molekular biologiya va genetikaning jadal rivojlanishi rekombinat DNA texnologiyasini yaratilishi tufayli juda ko'p prokariot, eukariot organizmlarning genlar tuzilishi, soni, funksiyasi o'rGANILDI va genetikaning yangi shoxobchasi genomika shakllandi.

Genomikaning asosiy vazifasi odam va boshqa organizmlar genomini tадqiq qilish va bu sohada olingen ma'lumotlar asosida odam hayotini yaxshilashdan iborat.

Genomika sohasidagi tадqiqotlar uch yo'nalishda olib borilmoqda. Birinchi yo'nalish stukturaviy genomika bo'lib u genomdagi nukleotidlar izchilligi va ular ishtirotida sintezlangan oqsil molekulalari va ularning genlar funksiyasining tartibga solish mexanizmlarini o'rGANISHGA

bag'ishlangan. Shu bilan birgalikda funksional genomika hujayrada sintezlanadigan barcha oqsil molekulalarini tuzilishi, joylanish o'mni, o'zaro aloqalarini tadqiq qilish, genomdagi genlar funktsiyasini uyg'unlashtirish, ya'ni birlamchi iRNK va splaysing jarayonlari tufayli uning oqsil molekulasi sintezlash, tayyor xilini shakllanishini, nihoyat ontogeneza hujayra tabaqalanishi, to'qima organlarning hosil bo'lishini o'rganish bilan ham shug'ullanadi.

Funksional genomika. Shunga ko'ra genomikaning ikkinchi tadqiqi yo'nalishi qiyosiy genomika deb atalib, uning asosiy vazifasi odam genomini tadqiq qilish bilan cheklanib qolmay viruslar, bakteriyalar, parazit o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar genom tilsimini aniqlashtirishga qaratilgan hozirga qadar deyarli barcha viruslar genomini, 30 dan ortiq bakteriyalarning oqsil biosintezida qatnashadigan genom qismi aniqlandi. 100 dan ortiq kasallik qo'zg'atuvchi organizmlar genomidan nukleotidlardan izchilligini o'rganish tugallanish bosqichida turibdi.

Shu yo'l bilan respublika geninjener markaz laboratoriya mudiri, prof. Sh.S.Azimova boshliq olimlar jigar uchun o'ta xavfli "V" sariq kasalligini qo'zg'atuvchi virusga qarshi vaksina yaratish ilmiy loyihami yakunlab hayotga tadbiq etdilar va xavfli sariq kasalining paydo bo'lishini oldi.

Uchinchi yo'nalish qiyosiy genomika. Genomikaning uchinchi yo'nalishi odamning genetik xilma-xilligini tadqiq qilishga oiddir. Odamlar orasidagi genomning farqini aniqlash odamning kelib chiqishi bilan bog'liq ilmiy muammolarning yechimini topishga yo'naltirilgan.

Aniqlanishicha turli odamlarning 10000 nukleotidida 9999 o'zaro o'xshash bo'lib, bir nukleotid bo'yicha farq bo'ladi. Muhim oqsil molekulalarini yoki rRNK sintezida qatnashmaydigan genlar tarkibida bunday o'zgarishlar kamdan kam uchraydi. Odamlar birga yashar ekan odamlar guruhi bo'linib ketsa, ularning har bir guruhidagi mutatsiyalar to'plana boradi. Hozirgi tasavvurlarga binoan paydo bo'lgan ko'pchilik nazoratida bo'lmaydilar va avloddan-avlodga berila boradilar. Odam populyatsiyadagi o'zaro qarindoshlikni o'rganishda yadro DNA va mitoxondriya DNA tuzilishidagi o'zgarishlardan foydalaniлади. Odamdag'i mitoxondriyada molekulasi 16500 nukleotidlardan justligidan iborat. Mitoxondriya DNA si onalik tomonidan irtisylanishi sababli rekombinatsiyada qatnashmaydi. Bu holat uni tahlil qilishda asqotadi. 1987-yili AQShdagi Kaliforniya universiteti olimi Alan Uilson o'z hamkasblari bilan Afrika, Osiyo, Yevropa irqlariga mansub odamlar MtDNA sidagi nukleotidlardan justligini o'rganib, uning Sharqiy Afrikada nihoyatda turli-

tuman ekanligini aniqladi va unga asoslanib Homo sapiens Afrikada paydo bo'lgan degan fikrni ilgari surdi.

Har bir genning oldingi va keyingi qismida mazkur gen qanday to'qimani, rivojanishning qaysi bosqichida qanday tashqi, ichki (masalan, gormonal) faoliyat ko'rsatishi lozimligidan xabar beruvchi nukleotidlardan izchilligi mavjud. Bunday boshqaruvcchi qismlar gen yonidagina emas, balki DNKnинг retrovirus genomida ham uchraydi. Retroviruslarning ko'pchiligi xo'jayin DNA orasiga kirib unda ma'lum lokuslarni egallaydi va DNA replikatsiya paytida kelgusi avlodlarga beriladi. Ko'pgina viruslar ilgarigi odamlar genomiga joylashib olib o'zlarining kasallik qo'zg'atuvchi funktsiyasini yo'qtganlar. Ana shunday retroviruslarning ba'zilari genom bo'ylab sakrab yuradilar. Ularning ayrimlari genning tartibga soluvchi qismiga ham joylashib olgan. Endogen retroviruslar odam DNKnинг 3 foizini tashkil etadi.

Turli organizmlar, xususan odam genomining tilsimini ochish juda ko'p kasallik qo'zg'atuvchilarini genomini tadqiq qilishga imkon beradi. Endilikda shunday dorilar ishlab chiqarish kerakki, ular organizmning kasal geniga ta'sir etib yuqori samara bersin.

Limfatik hujayralar-374	Miya-3195
Endotelial hujayralar-1031	Ko'z-547
So'lak bezlari-17	Suyak-904
Qalqonsimon bezlari-584	Yog to'qimasi-581
Qalqon yoni bezlari-46	Timus-261
Silliq muskullar-127	Qizilo'ngach-76
Sut bezlari-696	O'pka-1887
Oshqozon osti bezi-1094	Yurak-1195
Taloq-1094	Jigar-2091
Buyrak osti bezlari-658	Entrotsit-8
O't no'fagi-788	Trombotsit-22
Charvi-163	Yo'g'on ichak-879
Ingichga ichak-297	Buyrak-712
Yo'ldosh-1290	Tuxumdon-504
Prostata bezi-1287	Urug'don-370
Skilet muskullari-735	Bachadon-1859
Oq qon tanachalari	Teri-620
	Homila-1859
	Moyak-1232

77 – rasm. Odamdag'i turli organ, to'qimalar rivojanishi va funktsiyasini bajarishida qatnashuvchi genlar majmuasi.

Genom tilsimi to'g'risidagi dasturni amalga oshirish juda murakkab bo'lib, juda katta miqdordagi mablag' sarflashni hamda barcha rivojlangan mamlakatlardagi salohiyati yuqori bo'lgan olimlarni birlashgan holda


kelishib tadqiqot olib borishlarini talab etadi. Fikrimizning isboti uchun shuni ta'kidlab o'tamiz, faqatgina kishilar nazariga ilmaydigan, tuzilishi oddiy sanalgan achitqi zamburug'i genomidagi nukleotidlardan izchilligini aniqlashga dunyoning 96 laboratoriyasidan 600 yirik olimlar jahb qilindi. Organizmlar genomini tadqiq qilish uchun 1990-yilda 60 mln dollar sarflangan bo'lsa, 1998-yil 253 mln Amerika dollari sarflandi.

Odam genomidagi nukleotidlardan ketma-ketligini aniqlash natijasida odam hujayrasiga funksional genlarni kiritish orqali davolash texnologiyasi, ya'ni, **genlar terapiyasi** ishlab chiqilgan. Binobarin odam genomini to'la o'rGANISH tufayli undagi irlsiy kasalliklarning genlar terapiyasi yordamida davolash imkoniyatlari yanada ortadi.

4. Tibbiyot genetikasi

Turli mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida to'plangan statistik ma'lumotlar aholining 5 foiziga yaqini ota-onalari, ajodlarida ro'y bergan mutatsion o'zgaruvchanlik tufayli paydo bo'lgan turli xil morfologik, fiziologik, biokimyoiy kasalliklarga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Atrof-muhitning ifloslanishi tufayli odamlarda uchraydigan irlsiy kasalliklar soni yildan-yilga ortib bormoqda.

A.Stivensonning bergan ma'lumotlariga ko'ra Shimoliy Irlandiyada yangi tug'ilgan bolalarning 40% irlsiy kasallikkaga chalingan bo'lar ekan. Bularga tabiiy abort natijalari (ular 14% ga yaqin) kirmaydi. Odamlarda uchraydigan irlsiy kasalliklar ikki toifaga: **gen kasalliklari va xromosoma kasalliklari** ajratiladi. Gen kasalliklari **N.P.Bochkov, A.I.Zaxarov, V.I.Ivanov** klassifikatsiyasiga binoan monogen va poligen kasalliklarga bo'linadi. Monogen kasalliklar o'z navbatida autosoma dominant, autosom retsessiv va jinsiy xromosoma bilan bog'liq kasalliklarga ajraladi.



74 - rasm. Amniosintez – irlsiy kasalliklarni homilatik davrida aniqlash usuli.

Gen kasalliklari nihoyatda ko'p. Ularga misol qilib modda almashinishi bilan bog'liq bo'lgan galaktozemiya, qandli diabet, fenilketonuriya daltonizm, gemofiliya kabi kasalliklarni olish mumkin. Xromosoma kasalliklari ayanchli oqibatlarga olib keladi. Xromosoma kasalliklari chatinganlar homilatik davridan boshlab nobud bo'ladilar yoki tug'ilgandan keyin o'ladilar. Masalan, odamning 18 xromosomasining uchta bo'lishi natijasida paydo bo'ladigan *Edwards sindromida* bola kichik vaznda, chala tug'ilgan, nerv sistemasi rivojlanmagan, bosh suyagi, ko'z kosalari kichik, harmoqlari changak holda bo'ladidi. Hayot kechirish muddati ko'pincha 6 oydan oshmaydi.

13 xromosomaning uchta bo'lishi tufayli *Patau sindromi* hosil bo'ladidi. Bunday bolaning vazni haddan tashqari kichik bo'ladidi, yurak qon-tomir sistemasini buzilgan bo'lib, chaqaloq 3-4 oy yashaydi. *Shereshevskiy-Terner, Daun, Klaynfelter sindromi* bolalarda ham ko'pgina irlsiy anomaliyalar kuzatiladi. Bolalarning irlsiy kasalliklar bilan tug'ilish ehtimolini aniqlash, uning oldini olish chora-tadbirlarini belgilashda tibbiy-genetik maslahat muhim rol o'ynaydi.

5. Tibbiy-genetik maslahat

Sog'lom, aqliy va jismoniy jihatdan baquvvat, har tomonlama kamol topgan shaxsnı voyaga yetkazish doimo hukumatimiz diqqat markazida bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti I.A.Karimov qilgan nutqlarini birida, "Sog'lom avlod deganda shaxsan men, eng avvalo sog'lom naslni tushunaman. Sog'lom bolaning tug'ilishi eng avvalo onaning sog'lomligiga bog'liq" deb ta'kidladi. Ona-bolaning sog'lom bo'lishida tibbiyot xodimlarining roli beqiyos. Shu sababli barcha homilador ayollar tibbiyot xodimlarining nazoratida bo'ladilar. Tibbiy ko'rikdan o'tayotgan homilador ayollar orasida u yoki bu irlsiy kasalligi bor, nuqsonli bola tuqqan, yoshi 35 dan oshgan, yaqin qarindoshiga turmushga chiqqan, bolasi turmaydigan shaxslar bo'lsa, ular tibbiy-genetik maslahatxonalarda maxsus ko'rikdan o'tadilar.

Tibbiy-genetik maslahatlarida homilador ayolning qoni, siydiqi tekshirib ko'riladi va uning o'zi, turmush o'rtog'i, oila a'zolari bilan suhbat o'tkazilib irlsiy kasalligi bor deb taxmin qilinayotgan ayol va uning tug'ilajak homilasiga dastlabki tashxisi qo'yiladi. Qo'yilgan tashxisini qanchalik to'g'ri ekanligini aniqlash maqsadida homilaning o'rab turgan amnion suyuqligi shprits orqali olinib (72-rasm) u sitogenetik, biokimyoiy, molekular biologik, fizikaviy metodlar yordamida tekshiriladi. Tekshirish natijalari o'rGANilib, tahlil qilinadi. Unga asoslanib ona va homiladagi taxmin qilinayotgan irlsiy kasallik genga yoki xromosomaga bog'liqligi, uning dominant yoki retsessiv holatda irlsiyanishi, jinsiy xromosoma yo autosomaga bog'liqligi aniqlanadi. Olingan ma'lumotlar homilador ayolga beriladi. Agar homiladagi irlsiy kasallik o'ta xavfli bo'lmasa,

uni oldini olish yoki rivojlanib ketmasligi uchun tibbiy xodim tavsiya etgan dorilarni ichish, parhezni saqlash, fiziko-terapevtik shifo olish tavsiya etiladi. Yaqin vaqtga qadar monogen irsiy kasallikni homilador ayolda namoyon bo'lishi kasallikni paydo bo'lish ehtimolligiga qarab taxmin qilinsa, endilikda DNK tuzilishidagi nuqsonlarga qarab belgilanadi.

Mabodo homiladagi irsiy kasallik xromosomalar sonini o'zgarishi yoki aberratsiyasi bilan aloqador bo'lsa, vrach-genetik eru-xotinni xohishiga ko'ra irsiy kasali bor homilaning dunyoga keltirish yoki keltirmaslik to'g'risida homilador ayol va uning turmush o'rtog'iga maslahat beriladi. Sog'lom bolaning dunyoga kelishi bir tomondan ota-onaning irsiy omillariga, ikkinchi tomondan esa tashqi muhit omillariga bog'liq.

Irsiy kasalliklarni oldini olishda faqat tibbiy genetik maslahat berish emas, balki atros-muhitni muhofaza qilish, ayniqsa uni radioaktiv moddalar bilan ifloslanishini oldini olish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga suvni, havoni, tuproqni sanoat, transport, maishiy xizmat chiqindilari bilan ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik zarur.

Savol va topshiriqlar

1. Odam irsiyatni va o'zgaruvchanligini o'rganishning o'ziga xos qiyinchiliklarini tushuntiring.
2. Odam irsiyatni va o'zgaruvchanligini o'rganishning nazariya va amaliyat uchun qanday ahamiyati borligini sharhlab bering.
3. Antropogenetikaning asosiy maqsadi va vazifalariga nimalar kiradi?
4. Odam irsiyatni qanday metodlar yordamida o'rGANILADI?
5. Geneologik (shajara) metodning mohiyatini izohlang.
6. Sitogenetik metod yordamida nimalar tadqiq qilinadi?
7. Odam irsiyatini o'rganishda egizaklar metodi yordami bilan nimalar aniqlanadi?
8. Populyatsion metodning vazifasi nima?
9. Ontogenetik metod yordamida nimalar o'rganiladi?
10. Biokimyoiy metod orgali nimalar aniqlanadi?
11. Odamdag'i irsiy kasalliklar qanday toifalarga ajratiladi?
12. Odamdag'i gen kasalliklariga misol keltiring.
13. Odamda xromosoma kasalliklari qanday oqibatlarga olib keladi?
14. Odamdag'i qanday xromosoma kasalliklarini bilasiz?
15. Tibbiy-genetik maslahat berishning asosiy maqsadi va vazifasi nimalardan iborat?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Odam irsiyatni o'rganish metodlari...*
 - A. Sitologik genetik, egizaklar, biokimyoiy
 - B. Sitologik, ontogenetik, egizaklar, biokimyoiy
 - C. Embriologik, fiziologik, sitologik, anatomik
 - D. Sitologik, fiziologik, egizaklar, biokimyoiy
2. *Odamdag'i dominant belgilar...*
 - A. Ko'z rangining qoraligi, qoshlarning enliliyi, labning qalinligi, yuzdag'i sepkilik

- B. Ko'z rangining havorangligi, qoshlarning enliliyi, labning yupqali
- C. Ko'z rangining qoraligi, qoshlar ensizligi, labning qalingi, kiprikrlarning uzunligi
- D. Kiprikrlarning uzunligi, qoshlar qalinligi yuzda sepkilni bo'lmashligi

3. *Odamdag'i retsessiv belgilar*

- A. Ko'z rangining havorangligi, qoshlarning ensizligi, labning qalinligi
- B. Ko'z rangining havorangligi, qoshlarning ensizligi, labning yupqaligi, sepkilni bo'lmashligi
- C. Ko'z rangining qoraligi, qoshlarning ensizligi, labning qalinligi, kiprikrlarning qisqaligi
- D. Kiprikrlarning qisqacha, qoshlarning qalinligi, yuzda sepkilni bo'lmashligi, og'izni kattaligi

4. *Egizaklar metodi yordamida nima aniqlanadi?*

- A. Belgilarning rivojlanishida tashqi omillarni roli aniqlanadi
- B. Belgilarning rivojlanishida, irsiy omillar va tashqi muhitning roli aniqlanadi
- C. Belgingining rivojlanishida irsiy omillarning roli aniqlanadi
- D. Belgingining rivojlanishida irsiy omillar va tashqi muhit omillarning nisbati aniqlanadi

5. *Sitogenetik metod yordamida nimalar bilinadi?*

- A. Xromosomalar tuzilishidagi kamchiliklar
- B. Xromosomalar soni va tuzilishidagi kamchiliklar
- C. Xromosomalar soni va tuzilishidagi o'zgarishlarni fenotipga ko'rsatgan ta'siri
- D. Dominant va retsessiv belgilar

6. *Odamdag'i jins bilan bog'liq holda irsiylanadigan kasalliklar*

- A. Daltonizm, gemofiliya
- B. Shereshevskiy - Terner, daltonizm
- C. Gemofiliya, Patau kasalligi
- D. Daltonizm, gemofiliya, qulqoqda yung bo'lishi

7. *Odamdag'i xromosoma kasalliklar*

- A. Edvars, Patau gemofiliya
- B. Klaynfeltr, Shereshevskiy - Terner, daltonizm
- C. Daun, Klaynfeltr, Shereshevskiy - Terner
- D. Qulqoqda yung bo'lishi Daun, Klaynfeltr

8. *Odamdag'i gen kasalliklari*

- A. Galaktozemiya, Fenilketanuriya, qandli diabet, gemofiliya, yoysimon anemiya
- B. Galaktozemiya, Klaynfelter, Daun sindromi, polidaktiliya
- C. Shereshevskiy Terner, Fenilketanuriya, gemofiliya, sindaktiliya
- D. Fenilketanuriya, gemofiliya, Edwards sindromi

XIII-BOB. GENETIK INJENERIYA VA BIOTEXNOLOGIYA

Tayanch tushunchalar: Genetik injeneriya haqida tushuncha, ko'chib yuruvchi genetik elementlar, regulyator genlar transpozonlar, transmissibl plazmidalar, restriksion endonukleazalar, rekombinant DNK olish va genlarni klonlash, o'simlik irsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish, transgen o'simliklar, "soxta" genlar, hayvonlar irsiyatini hujayra injeneriyasi yo'li bilan o'zgartirish, hayvonlarni klonlash, genlar terapiyasi.

198. Genetik injeneriya haqida tushuncha

Organizm genlari yoki genlar majmuasini inson manfaatlarini ko'zlagan holda o'zgartirilishi **genetik injeneriya** deb ataladi. Genetik injeneriyaning tadqiqot obyektlari bo'lib, viruslar, bakteriyalar, tuban zamburug'lar, hayvon va o'simlik odam hujayralari sanaladi. Genetik injeneriya molekular biologiyaning alohida shoxobchasi bo'lib, asosiy maqsadi hujayraning genetik axborotini yangi kombinatsiyalash va ularni ko'paytirib inson va hayvon uchun yangi moddalarni olishdan iborat. Genetik injeneriya metodlaridan foydalaniib odam, hayvon genlarini mikroorganizmlarga ko'chirib, kerakli moddalarni sintez qilish mumkin. Bunday texnologiya tibbiyot, qishloq xo'jaligi, sanoat ishlab chiqarishida muhim ahamiyatga molikdir.

Gen injeneriyasi tubandagi muammolarni hal etishga o'z diqqatini qaratadi:

1. Hujayra DNKsidagi kerakli genlarni ajratib olish yoki laboratoriyalarda sintezlash.
2. DNKnинг rekombinant molekulasini hosil etish.
3. Genlarni klonlash ya'ni DNK bo'lagini rekombinant vektor konstruktsiyalar vositasida ko'paytirish.
4. Rekombinant vektorlar yordamida yot genlarni hujayraga kiritish va uning faoliyati tufayli inson xohlagan mahsulot, masalan, oqsil kabi moddalarni yetishtirish.

1. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar

DNK genlar to'plamidan iborat. Uzoq yillar mobaynida genlar to'plamining genomdagagi o'mi doimiy deb kelinar edi. Biroq AQSh olimasi **Barbara Mak-Klintok** makkajo'xorida irsiy belgilarni tadqiq qilish jarayonida ba'zi genlar bir joyda muntazam ravishda joylashmay, aksincha o'z joyini o'zgartirib turishini aniqladi. Genlarni genom bo'yicha ko'chib yurishi uzoq vaqt tan olinmadi. Shunga qaramay bunday hodisa bo'lishi mumkunligi AQSh olimlari **J.Bishop**, **A.Buxarri** tomonidan mikroorganizmlarda, rus olimi **G.Georgiyev** tomonidan esa hayvonlarda

aniqlandi. Bunday ko'chib yuruvchi genlar toifasi **regulator genlar** yoki **transpozonlar** deb ataladi. Transpozonlar o'z joyini o'zgartirganda qo'shni genlar faoliyatini u yoki bu tomonga o'zgartiradi. Transpozonlar xilmal strukturaga ega bo'lalar ham, barcha transpozon molekulalarining har ikki chetida maxsus nukleotidlar izchilligi, markaziy qismida esa DNK molekulasini belgilangan joyda yopishqoq uchlar hosil qilib kesuvchi transpozaza fermentini sintez qiluvchi gen joylashgan bo'ladi.

2. Plazmidalar

Bakteriya va tuban eukariot hujayralarida asosiy xromosomadan tashqari qo'shimcha mayda plazmidalar uchraydi. Plazmidlar asosiy xromosomalardan bir necha yuz barobar kichik DNK qo'sh spiralidan iborat. Plazmidalar o'rtacha 3-10 genlardan tashkil topgan bo'lib, ikki toifaga bo'linadi. Ularning birinchisi transpozon yoki bakteriosag irsiy molekulasi kabi hujayradagi asosiy xromosomaning maxsus DNK izchilligini kesib, rekombinatsiya bo'la oladigan plazmidalardir. Bunday rekombinatsiyalananuvchi plazmidalarni transmissil, ya'ni nasldan-nasnga beriluvchi plazmidalar deb nomlanadi. Odatda transmissibl plazmid hujayraning asosiy xromosomasiga birikkandan so'ng o'z mustaqilligini yo'qotsa ham ularda joylashgan genlar orasida faoliyatini bajaradi. Hujayra bo'linganda rekombinatsiyalananuvchi plazmida genlari asosiy xromosoma genlari bilan birikkan holda nasldan-nasnga beriladi.

Plazmidalarning ikkinchi toifasi avtonom holda replikatsiyalananuvchi plazmidalar deb ataladi. Bunday plazmidalar asosiy xromosomaga birika olmaydi. Shunga ko'ra ular mustaqil holatda o'z-o'zin replikatsiya yo'li bilan ko'paytira oladilar. Avtonom plazmidalar bakteriya yoki zamburug' bo'linganda qiz hujayralarga tasodifiy ravishda taqsimlanadi. Ayni vaqtida avtonom plazmidalar bir hujayradan ikkinchisiga hujayra qobig'i yoki membrana teshiklari orqali o'ta oladi.

3. Restriksion endonukleazalar

Odatda bir mikroorganizm hujayrasiga tashqaridan yot genetik material kirsa u darhol hujayra nukleaza fermentlari ishtirokida parchalanib tashlanadi. DNK molekulasini mayda bo'laklarga bo'luvchi fermentlarni kesuvchi **endonukleazalar** yoki **restriktazalar** deb ataladi. Restriktazalar har xil. Ularning ayrimlari to'rt yoki ko'proq maxsus nukleotid jutflarini tanib bog'lanadi va DNK molekulasini kesadi. Ayrim restriktazalar DNK qo'sh zanjirini qaychi singari shartta ikkiga bo'ladi. Shu bilan birga DNK molekulasidagi qo'shaloq zanjirni yopishqoq uchlar hosil qilib kesuvchi restriktazalar ham mavjud. Ularga misol qilib genetik injeneriyada keng restriktazalar ham mavjud. Ularga misol qilib genetik injeneriyada keng qo'llaniladigan **Eco RI**(eko er bir) va **Bam+ HI** (*Bam ash bir*)ni olish mumkin. Odatda restriktaza qaysi organizm turidan olingen bo'lsa uning nomi bilan belgilanadi. Masalan, **Eco RI** – *Esherichia coli*, **Bam+ HI** – nomi bilan belgilanadi.

Bacillus amulolique faciens H, Hind III – Haemophilus influenzae. Hozirgi vaqtida DNK molekulasini bo'laklarga bo'luvchi 500 ga yaqin restrikta zalar tozalanib olingen va o'rganilgan.

4. Rekombinant DNK olish va genlarni klonlash

Sun'iy ravishda rekombinant DNK olish va genlarni klonlash birinchi marotaba 1972-yili AQSh olimlari **G.Boyer va S.Koen** tomonidan amalga oshirildi. Bu ikki olim ichak tayoqchasi bakteriyasi *E. coli* ning xromosoma DNKsini hamda shu bakteriya plazmidani alohida probirkalarga joylab, ularga *Eco R I* (iko ar bir) restrikta fermenti bilan ishlov bergenlar. Halqasimon plazmida tarkibidan faqat bir dona *Eco R I* restrikta fermenti tanlab kesadigan nukleotidlari izchilligi bo'lganligi sababli restrikta DNK qo'sh zanjirini faqat bir joydan kesib halqasimon plazmidani yopishqoq uchli ochiq holatga o'tkazadi. Xromosoma DNK molekulasiда *Eco R I* restrikta fermenti taniy oladigan maxsus nukleotidlari izchilligi qancha bo'lsa, bu molekula shuncha bo'lakka bo'linadi. D NK bo'laklarini elektroforez moslamasida kuchli elektr maydonida katta kichikligiga qarab ajratiladi va hosil bo'lgan bo'laklar maxsus bo'yoq bilan bo'yaladi. Natijada bir joyga yig'ilgan bir xil kattalikdagi D NK bo'laklari to'plamini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Elektroforez gelidan xohlagan kattalikdagi D NK bo'lagini sunda eritib ajratib olsa bo'ladi. **Boyer va Koen** shu usullar bilan ajratib olingen yopishqoq uchli bakteriya D NK bo'lagini ochiq holatdagi yopishqoq uchli plazmida DNKsi bilan probirkada aralashtirib ulovchi ligaza fermenti vositasida bu ikki xil D NK bo'laklari uchlarini bir-biriga kovalent bog'lar yordamida uladi. Natijada plazmida tarkibiga yet xromosoma D NK bo'lagi kiritildi. Shu usul bilan ilk bor rekombinant plazmida hosil qilindi.

Mazkur molekular qurilmada plazmida vektor tashuvchi funksiyasini bajaradi. Chunki plazmidalar xromosoma DNKsiga rekombinatsiyalana oladi. Bu vektor qurilma o'z tarkibida antibiotikka chidamlilik geni bo'lganligi uchun maxsus olingen plazmidasiz ya'ni antibiotikka chidamsiz shtamm (bakteriya) hujayralarga kiritilsa, rekombinant plazmida kiritilgan bakteriya kloni antibiotikka chidamlili genga ega bo'lib qolgani sababli antibiotik ta'sirida o'lmaydi. Shunday bakteriyalar alohida ko'paytirilsa uning tarkibidagi yet D NK bo'lagi ham shuncha ko'payishi mumkin. Undan tashqari rekombinant plazmida vektor avtonom replikatsiyaluvchi plazmida bo'lsa, yet D NK bo'lagi yana o'nlab barobar ko'payadi. Yet D NK bo'lagini rekombinant vektor qurilmalar vositasida ko'paytirish **genlarni klonlash** deb ataladi. Genetik injeneriyada D NK bo'lagini klonlashda vektor sifatida virus va fag D NK molekulasi dan yoki ko'chib yuruvchi genetik elementlardan ham foydalilanadi.

5. O'simlik irlsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish


Klassik genetika asosida yangi nav chiqarish jarayonida xo'jalik belgilari bilan bir-biridan farq qiluvchi organizmlar chatishtirilib, ularni eng yaxshi ollinsada, changchi, urug'chi o'simliklarning yaxshi belgi-xossalari bilan bir qatorda duragay o'simlik ko'pgina salbiy belgi-xossalarga ham ega bo'ladi. Gen injeneriyasi qo'llanilganda esa bu muammoni yengil hol qilsa bo'ladi. Buning uchun rejalahtirilayotgan nav hujayrasiga ma'lum foydali gen kiritiladi va bu hujayradan yetuk o'simlik hosil qilinadi. O'simlik hujayrasiga muayyan bir genni kiritish uchun tuproq bakteriyasi agrobakterium hujayrasidagi plazmidadan vektor molekula sifatida foydalilanadi.

Tabiatda agrobakteriumning bu turi o'simlik hujayrasini pala-partish bo'linishi natijasida shish hosil qiladi. Bu shishni *Ti* (ti ay) plazmidiga genomining T-DNK (shish hosil qiluvchi D NK) bo'lagi chaqirish. Agrobakteriumning *Ti* plazmida birmuncha yirikroq. U 20 mingdan ortiqroq nukleotid justligidan iborat. Shunga ko'ra undan gen injeneriyasi maqsadida foydalananish biroz qiyinroq. Shu sababli o'simlik irlsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish uchun plazmidani T-DNK qismini maxsus restrikta fermenti bilan kesib olinib PBR 322 – pi-bi-ar 32 plazmidasiga ko'chirib o'tkaziladi. Bunday sun'iy plazmida *Ti* plazmidiga nisbatan birmuncha kichik bo'lib, ulardan ya'ni vektor konstruktysiylaridan foydalananish birmuncha oson va unumliroq. Vektor konstruktisiyaning T-DNK qismini kesilib, unga o'simlik geni kiritiladi. Oqibatda T-DNK shish hosil qilish xossasini yo'qotadi. Chunki yet gen T-DNK ni ikkiga bo'lib yuboradi. Tarkibida T-DNK va yet genga ega vektor konstruktisiya genomidan T-DNK qismi olib tashlangan o'simlik uchun zararsiz maxsus *Agrobacterium* shtammlari kiritilganda, agrobakterium yet genni o'zingiz maxsus transformatsiya apparatidan foydalaniб o'simlik genomiga o'tkaziladi (75-rasm). So'ngi yillarda vektor molekula tarkibiga kiritilgan yet genlari o'simlik yoki hayvon hujayrasiga kiritish usullari ishlab chiqilgan bo'ladi. Lekin bu usullar texnik jihatdan murakkab va qimmatligi sababli maxsus hollardagina ishlataladi.

Genetik transformatsiya qilingan o'simlik hujayrasini maxsus ozuqa muhitida o'stinib undan **transgen o'simlik** rivojlantiriladi. Buning uchun transformatsiya qilingan o'simlik hujayrasi uchen maxsus ozuqa muhit tayyorlanadi. Unda o'simlik hujayrasi bo'linib, ma'lum bir dastur bo'yicha rivojlanadigan kallus to'qimasi rivojlanadi. Kallus to'qima hujayralaridan ayrimlari o'simlik gormoni va boshqa regulator moddalar ta'sirida bosqichma-bosqich o'simlik embrioni to'qimasi va barcha jihatdan normal voyaga yetgan transgen o'simlikni hosil qiladi. Transgen o'simlikning hali bir hujayrasida ko'chirib o'tkazilgan gen bo'ladi. Shu sababdan transgen o'simlik jinsiy yo'l bilan ko'paytirilganda yet gen nasdan-nasiga beriladi.

Hozirgi paytg'a kelib dunyo bo'yicha ekilayotgan soyaning 54.

makkajo'xorining 28, g'o'zaning 9, kartoshkaning 0,01 foizi transgen o'simliklar hisoblanadi. Transgen o'simliklar orasidan gerbetsidga chidamlilari 71%, zararkunandalarga chidamlilari 22%, bir vaqtning o'zida ham gerbetsidlarga, ham zararkunandalarga chidamlilari 7 foizni tashkil etadi.



75 - rasm. Gen muhandisligi usuli bilan o'simlik hujayrasiga bakteriyalar orqali yot genni kiritish usuli.

A. Abdukarimov, I. Abdurahmonov ma'lumotlariga ko'ra 2003 – yilda transgen qishloq xo'jalik ekinlarni umumiylar maydoni dunyo bo'yicha 67,7 mln gektarni tashkil etgan. Shundan 42,8 mln ga AQSh ga, 13,9 mln ga Argentinaga, 4,4 mln ga Kanadaga, 3 mln ga Braziliyaga to'g'ri keladi. Agar transgen o'simliklar ekiladigan maydon ayrim ekinlar bo'yicha taxsimlansa, unda 181,4 mln ga transgen soya o'simligi, 15,5 mlniga

transgen makkajo'xoriga 7,2 mln ga transgen g'o'za o'simligiga to'g'ri keladi. Mazkur ko'rsatkichlar transgen o'simliklarning iqtisodiy ahamiyati yuqori ekanligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi «Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi» institutida geninmarkaz tashkil etilib gen injeneriali va biotexnologiya sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Gen injeneriyasi qo'llanilib ko'sak qurtiga chidamli g'o'za va kolorada qo'ng'iziga chidamli kartoshka o'simligi yetishtirilgan. G'o'za genetik injeneriyasiga bag'ishlangan tadqiqotlar akademik **A.A. Abdukarimov** rahbarligida bir guruh olimlar tomonidan 1980-yillarda boshlangan bo'lib, gerbetsidga chidamli bo'lgan transgen g'o'za liniyalari olingen. Ayrim hujayralardan yaxlit o'simlikni yetishtirish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Laboratoriya olimlari tomonidan klonlangan tola sifatini belgilaydigan genlar ko'chirib o'tkazish va shu orqali yuqori sifatli, uzun tolali transgen g'o'za navlarini yaratish ishlari olib borilmoxda. Xususan shu markaz ilmiy xodimi **I. Abdurahmonov** g'o'zaning gullashini boshqaradigan hamda paxta tolasining uzunligini belgilaydigan genlar guruhini AQSh olimlari bilan hamkorlikda ilk bor ajratib oldi. Prof. **Sh.S Azimova** rahbarlik qilayotgan laboratoriya olimlari gen va hujayra injeneriya usullarini qo'llab gepatit B kasalini oldini olish uchun zarur vaktsina yaratish loyihasini ijobji hal etdilar.

Biologiya fanlari doktori **R.S Muxamedov** va **V.Irisbayevlar** o'nlab xavfli yuqumli va irlsiy kasallikkarni gen injeneriyasi yordamida tashxis qo'yish biotexnologiyasini yaratdilar va amaliyotga tatbiq etdilar.

Professor **O.Odilova** boshchiligidagi olimlar pestitsid qoldiqlarini parchalab zararsizlantiruvchi bakteriya shiammidagi genlar guruhini, g'o'za tomiri sathida yashovchi bakteriyaga ko'chirib o'tkazib piravard natijada g'o'za ekiladigan maydonlarga, sepilgan gerbetsid va pestidlar qoldig'ini zararsizlantirishni maqsad qilib qo'ygan. **S.Jatayev, F.Muxamedanova** g'o'zaning va bug'doyning gerbetsidga chidamli transgen formalarini yaratdilar.

6. Hayvonlar irlsiyatini hujayra injeneriyasi yo'li bilan o'zgartirish

Hujayra va gen injeneriyasi yutuqlari hayvon zotlarini yaxshilash uchun ham qo'llaniladi. Ma'lumki sigirlar bir yilda faqat 1 ta ba'zan 2 ta tuxum hujayra hosil qiladi. Shu sababli zotdor qoramollarni ko'paytirish imkonini bo'lmagan. Hozirgi vaqtga kelib ko'p miqdorda yuqori sifatli sut, go'sht beruvchi qoramolga ma'lum gormonni inyeksiya qilinib, tajriba o'tkazilayotgan sigirda ko'plab tuxum hujayra olinadi va ular sun'iy

urug'lantirilib, hosil bo'lgan zigota xonaki sigir bachadoniga kiritilib va implantatsiya qilinadi. Natijada xonaki qoramol qimmatli zotli buqacha yoki g'unajin tug'adi. Shunday qilib bir xil zotli allifen buzoqlar olinadi. Bu texnologiya bizning mamlakatda ham q'llaniladi.

AQShning dunyoga mashhur Monsanto kompaniyasi gen injeneriyasi usuli bilan o'sish gormonini ishlab chiqarib, sigirlarga ineksiya qildi va shu bilan sigirlarni sut miqdorini oshirishga erishdi. Hozirgi vaqtida bu sut AQShning oziq-ovqat do'konlarida sotilmoqda.

O'zbekistonda akademik **J.X.Xamidov** rahbarligida gen injeneriligi usulidan foydalanib quyon zigotasiga o'sish gormoni geni kiritildi va odatdagiga qaraganda yirik hamda tez o'suvchi transgen quyon olindi.

Biotexnologiya sohasidagi yutuqlar hujayra injeneriyasi yo'nalishida ko'proq qo'iga kiritilmoqda. Chunonchi amerika olimi **J.Tomson** 1998-yili hali ixtisoslashmagan o'zak hujayralarni alohida sun'iy muhitda ko'paytirib ulardan "yangi" to'qimalar va organlar yaratish texnologiyasini ishlab chiqdi. Bu yangi organlar teri, pay, tog'ay jarohatlanganda ko'chirib o'tkazib bemorni sog'aytirish uchun juda qulay.

7. Hayvonlarni klonlash

Tuzilishi murakkab hayvonlar vegetativ yo'l bilan ko'paymaganligi sababli, ularning klonini olish yaqin vaqtga qadar muammo bo'lib kelgan edi.

1997-yilda Angliyaning Edinburg shaharidagi Roslin institutida shotlandiyalik olim **Yan Wilmut** birinchi bo'sib gen injeneriligi yordamida Dolli deb nomlangan qo'zichoqni dunyoga keltirdi. Olim tajribasida asti-basharasi qora bo'lgan qo'y zotidan oositlar olinib uning yadrosi mikrotomizg'ich bilan olib tashlandi. So'ngra unga asti-basharasi oq bo'lgan qo'y yelinidan olingan hujayraning yadrosi kiritildi. Hosil bo'lgan sun'iy zigota urg'ochi qo'yning tuxum yo'lida rivojlanib morulla bosqichini qilindi. Shunday usul hosil qilingach, 277 zigotadan faqat bittasi embrional rivojlanishining barcha stadiyalarini o'tab Dolli qo'zichog'i tug'ilishiga olib keldi. Tajribaning eng ajoyib tomoni shundaki, tabaqalashgan sitoplazma bilan zigotaning yadrosi uyg'unkashgan holda faoliyat ko'rsatishi shu paytgacha hech kim tomonidan isbotlanilmagan edi. Olim huni mumkinligini tajriba orqali isbotlab berdi.



76 - rasm. Qoraboshli qo'yga ko'chirilgan oq qo'yning yelin hujayrasidan rivojlangan Dolli qo'zichog'i.

Savol va topshiriqlar

1. Genetik injeneriya deganda nimani tushunasiz?
2. Genetik injeneriya qanday muammolarni hal etishni vazifa qilib qo'yan?
3. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar nima? U qaysi olimlar tomonidan ixtiro qilingan?
4. Plazmidalar nima? Ular xromosomalarga nimasi bilan o'xshaydi va farqlanadi?
5. Restriksion endonukleaza nima? Ularni genetik injeneriyada qanday ahamiyati bor?
6. Rekombinant DNK olish sxemasini tushuntiring.
7. Rekombinant vektor qurilma qanday olinadi?
8. Genlarni klonlash deganda nimalarni tushunasiz?
9. O'simlik irsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish tafsilotini tushuntiring.
10. Hayvonlar irsiyatini hujayra injeneriyasi yo'li bilan qanday o'zgartiriladi?
11. Hayvonlarni klonlash haqida nimalarni bilasiz? Qaysi hayvonlarning kloni hosil qilingan?
12. Gen terapiyasining mohiyatini tushuntiring.
13. Transgen o'simlik qanday olinadi?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Transpozonlar* bu:
 - Dominant genetik elementlar
 - Retsessiv genetik elementlar

- S. Regulyator genlar
 D. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar
2. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar qaysi olim tomonidan kashf qilingan?
 A. G. Georgiyev
 B. A. Bixariy
 C. S. Mak Klintok
 D. A. Kornberg
3. Plazmidar bu:
 A. Kichik xromosomalar
 B. Xromosomalardan tashqaridagi doira shaklida o'z-o'zini replikatsiya qiladigan DNK
 C. Yo'ldoshli xromosomalar
 D. Restriktaza bilan bo'laklarga bo'lingan DNK qismi
4. Transmissibl plazmidlar bu:
 A. Xromosomadagi DNK izchilligini kesib, rekombinatsiya bo'ladigan va nasllarga beriluvchi plazmid
 B. Xromosomaga birikkan, keyin o'zi mustaqil yo'qoladigan plazmidlar
 C. Asosiy xromosomadan mustaqil ravishda o'z-o'zini replikatsiya qila olmaydigan plazmidlar
 D. A va B javoblar
5. Restriktazalar bu:
 A. D NK bo'laklarini bir-biriga ulovchi fermentlar
 B. Replikatsiyani amalga oshiruvchi fermentlar
 C. D NK molekulasini bo'laklarga bo'luvchi fermentlar
 D. Kichik bo'lgan D NK halqasi
6. Rekombinant D NK olish va genlarni klonlash birinchi marotaba qaysi olimlar tomonidan amalga oshirilgan?
 A. A. Kornber, A. Buxariy
 B. T. Georgiyev, G. Boyer
 C. S. Mak Klintok, S. Koen
 D. G. Boyer, S. Koen
7. D NK bo'lagini klonlashda vektor sifatida nimalardan foydalaniladi?
 A. Transpozonlardan
 B. Virus yoki fag D NK sidan
 C. Plazmidlardan
 D. A va S javoblar

8. O'simlik irsiyatini gen injeneriyasi metodida o'simlik jarayonini tartib bilan belgilang.
 A. Vektor konstruktsiya hujayraga kiritilib transgen kriya hosil qilinadi
 B. Ahamiyatga ega gen klonlanadi va tuzilishi o'stimli o'stiriladi
 C. Transgen hujayradan sun'iy sharoitda yetub o'simli kiritilib vektor ajratib olingan biror fag genomini yoki plazmidini kiritilib vektor konstruktsiya hosil qilinadi
 D. 1,3,4,2 B. 3,4,1,2 S. 2,4,1,3 D. 1,2,1
9. Odam nomoni qancha nukleotidlardan jisfi dan orat?
 A. 2 mlrd.
 B. 3 mlrd.
 C. 4 mlrd.
 D. 5 mlrd.
10. Odam hujayrasida qancha gen bor?
 A. 30-40 ming
 B. 70 ming
 C. 60-80 ming
 D. 10-20 ming
11. Odam nomida qancha soxta - kodlanmaydi jigan genlar uchraydi?
 A. 3000
 B. 2000
 C. 1000
 D. 500
12. Asosiy genlardan farqli ravishda soxta gerilir kodlanmaydi chunki ular:
 A. Asosiy intron qismiga ega emas
 B. Genlarning duplikatsiyasi tufayli pado bo'lgan
 C. Deletsiya va nuqtali mutatsiyaga ega
 D. A va S javoblar
13. Retroviruslar bu:
 A. D NK sintezlovchi viruslar
 B. R NK sintezlovchi viruslar
 C. Oqsil sintezlovchi viruslar
 D. R NK dan D NK sintezlovchi viruslar

XIV-BOB. GENETIKA — SELEKSIYANING NAZARIY ASOSI

Tayanch tushunchalar: Seleksiya va uning maqsadi, vazifalari, nav, zot, shtamm, madaniy o'simliklarning xilma-xilligi va kelib chiqish markazlari, sun'iy tanlash va uning xillari, o'simlik va hayvonlarda o'zgaruvchanlikni sun'iy ravishda hosil qilish metodlari, duragaylash sistemi, yakka va yalpi tanlash, inbriding, autbriding, resiprok, takroriy, pog'onali va kombinatsiyalararo duragaylash, tur ichida, geografik uzoq formalarni va turlararo duragaylash, geterozis, eksperimental mutagenez, hayvonlar seleksiyasi, eksteryer.

20§. Seleksiya va uning maqsadi, vazifalari.

Seleksiya atamasi lotincha *selectio* so'zidan olingen bo'lib, tanlash degan ma'noni anglatadi. Seleksiyaning ikki xil ma'nosini bor.

1. O'simliklarning yangi navi, hayvonlarning yangi zoti, mikroorganizmlarning foydali shtammlarini yaratish jarayoni.

2. Nav, zot, shtammlarning yaratish nazariysi va usuli to'g'risidagi fan.

Seleksiya evolyutsiya jarayonining o'ziga xos shakli bo'lib, bunda tabiiy tanlanish o'miga sun'iy tanlash yetakchi hisoblanadi. Atoqli rus olimi N.I.Vavilov ta'biri bilan aytganda seleksiya bu inson xohishi bilan yo'nalgan evolyutsiyadir. Seleksiyaning shoxobchalarini:

1. Dastlabki material haqidagi ta'limot.

2. Irsiy o'zgaruvchanlikning tiplari to'g'risidagi ta'limot.

3. Organizmlarning belgi-xossalari rivojiga muhitning ta'siri haqidagi ta'limot.

4. Sun'iy tanlash nazariysi.

1. Nav, zot, shtamm.

O'simliklar navi, hayvonlar zoti deb muayyan irsiy belgi xossalari: mahsuldarligi, uning sifati, tez yetilishi, boshqa xo'jalik va inson manfaatlariga mos belgi-xossalari, morfofiziologik xususiyatlari bilan ajralib turadigan sun'iy yo'l bilan yaratilgan individlar majmuasi (populyatsiyasi)ga aytildi. Bir turga mansub, lekin ayrim genlari bilan o'zaro farqlanuvchi bakteriya hujayralar **shtamm** deb nomlanadi. Zot, nav, shtamm inson faoliyati mahsuli sanaladi.

2. Madaniy o'simliklarning xilma-xilligi va kelib chiqishi

Bundan taxminan 10 ming yil muqaddam insonlar yovvoyi o'simliklarni o'z kubalarini atrofiga ekib, ibtidoiy dehqonchilik bilan shug'ullana boshlaganlar. Har yili bo'liq urug'larni yerga ekish oqibatida uzoq yillar mana shu yo'ldagi ibtidoiy dehqonchilik natijasida dastlabki

mahalliy o'simlik navlari yaratilgan. Ming yillar mobaynida yovvoyi hayvon bolalarini qo'lga o'rgatish, parvarishlash, ularning eng baquvvati, oda ma'zul, tez o'rganuvchanlarini duragaylash, tanlash tufayli dastlabki mahalliy hayvon zottlari chiqarilgan. Tabiatda tarqalgan 250 ming yuksak foydalanim kelgan bo'lsalarda, ulardan 150 turini madaniylashtirganlar. Bu jarayon hozirgi vaqtida ham davom etmoqda. Masalan, qand tavlagi va kungaboqar o'simliklari XIX asrdan boshlab ekila boshlangani bunga yorqin dalildir.

XX asrning 20-35-yillarda akademik N.I.Vavilov boshliq olimlar Yer yuzining Avstraliyadan boshqa mamlakatlarga 60 dan ortiq ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etib, u yerlarda ekladigan madaniy o'simlik namunalarini to'play boshladilar. Ma'lum bo'lishicha madaniy o'simliklar qit'alarda bir tekis tarqalmay, ularning har birini kelib chiqish markazlari bor. N.I.Vavilov aniqlashicha dunyo bo'yicha madaniy o'simliklarning 7 ta kelib chiqish markazlari mavjud. Bular: Janubiy Osiyo tropik markazi, Sharqiy Osiyo, Janubiy-G'arbiy Osiyo, O'rta Yer dengizi, Xabashiston, Markaziy Amerika, Janubiy Amerika madaniy o'simliklarning kelib chiqish markazlaridir. Janubiy Osiyo tropik markazdan sholi, shakarqamish, limon, apelsin, bodring, baqlajon, qora muruch kabi 50% ga yaqin madaniy o'simliklar kelib chiqqan. Sharqiy Osiyo markazda soya, tariq, arboreum g'o'zasi olxo'ri, olcha, turup kabi 20% ga yaqin madaniy o'simliklar, Janubiy-G'arbiy Osiyo markazdan bug'doy, javdari, dukkakli o'simliklar, xerbateum g'o'zasi, sholg'om, sabzi, sarimsoq piyoz, tok, o'rik, nok, olma kabi 14% madaniy o'simliklar kelib chiqqan. O'rta Yer dengizi markazidan karam, qand tavlagi, beda, chechevitsa va yem-xashak madaniy o'simliklarni 11% i kelib chiqqan. Habashiston markazdan qattiq bug'doy, arpa, kofe daraxti, kakao jo'xori, banan, Markaziy Amerikadan makkajo'xori, xirzitum g'o'zasi, kakao, qovoq, tamaki, Janubiy Amerika markazdan kartofel, ananas, barbadenze g'o'zasi kelib chiqqan.

Hozirgi vaqtida akademik N.I.Vavilov boshliq olimlar to'plagan madaniy o'simliklar namunalarini Sankt-Peterburg shahridagi o'simlikshunoslik institutida saqlanmoqda. Ulat jami 300 ming namunadan iborat. Mazkur o'simlik namunalarini sobiq ittifoqqa kiruvchi barcha respublikalar datalatida ekilgan va ekilayotgan navlarni chiqarishda boshlang'ich material sifatida qo'llanilmoqda. Respublikamiz olimlaridan G.S.Zaytsev, F.M.Mauer akademik A.Abdullahov, Yu.Uzoqov, F.Tolipovlarning beqiyos xizmatlari ru'yayli O'zbekiston Fanlar Akademiyasining «Genetika va o'simliklarning eksperimental biologiyasi»

institutida 7000 ga yaqin, o'zbekiston G'o'za seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tadqiqot institutida g'o'zaning 50 turiga mansub 12054 yovvoyi va madaniy namunalaridan iborat kollektsiya bor.

3. Sun'iy tanlash va uning xillari

Odam tomonidan olib boriladigan tanlash **sun'iy tanlash** deyiladi. U ikki xilga bo'linadi. O'z-o'zidan urug'lanadigan yoki vegetativ yo'l bilan ko'payadigan o'simliklarda **yakka tanlash**, chetdan chatishadigan o'simliklarda **yalpi tanlash** o'tkaziladi. **Yakka tanlashda** chatishirilayotgan o'simliklar orasidan tadqiqotchi talabiga mos individ saralanib olinadi va ko'paytiriladi. **Yalpi tanlashda** esa seleksioner tadqiqotchi qo'ygan maqsadga u yoki bu darajada mos bo'lgan bir necha individlar tanlanib, ular birlgilikda ko'paytiriladi. Bir marotaba olib borilgan yakka va yalpi tanlash ko'pgina holiarda kutilgan natija bermaydi. Shu tufayli yakka va yalpi tanlash ko'p marotaba o'tkaziladi. Qisqa qilib aytganda o'z-o'zidan changlanuvchi o'simliklarda yakka tanlanishning ko'p marotaba tanlash xili keng tus olgan. Yakka tanlash usuli bilan g'o'zaning *Akala* 0278 namunasidan 8517, *Ashmuni* namunasidan 35-1, 35-2 navlari chiqarilgan. Tabiiy sharoitda o'simlik va hayvonlarda odam uchun foydali o'zgarishga ega formalari kamdan-kam kuzatiladi. Oqibatda yangi nav va zotlarni yaratish uzoq muddatni talab etadi. Yangi nav, zotlarni qisqa muddatlarda chiqarish uchun o'simlik va hayvonlarda irlar o'zgaruvchanlik ko'lамини ko'paytirish uchun maxsus usullar: **chatishirish**, organizmlarga kimyoviy, fizikaviy omillarni ta'sir ettirish orqali **sun'iy mutatsiyalarini** hosil qilish, **poliploid** formalarni olish va **genetik injeneriyadan** keng foydalilaniladi.

4. Duragaylash sistemasi

Yangi nav va zotlarni chiqarishda **duragaylash** usulidan keng foydalilaniladi. Duragaylash metodi tanlangan ota-onal organizmlarning inson uchun foydali belgi-xossalarini duragay formalarda biriktirishga asoslanadi. Bunda ayrim foydali belgi-xossalarga ega ota-onal individlar chatishirilib duragay organizmlar orasidan maqsadga muvofiq individlar tanlanib olinadi. Duragaylash jarayonida ota-onal organizmlarni belgi-xossalarini duragay avlodlarida turli kombinatsiyalarda beriladi.

Qo'yilgan maqsadga qarab duragaylash ikki tipda olib boriladi. Bular **inbriding** va **autbriding** duragaylashdir. Bir yaqin qon-qardosh organizmlar va ularning nasllari orasidagi duragaylash **inbriding** duragaylash deyiladi. Inbriding duragaylash odatda gomozigot formalarni hosil qilishda qo'llaniladi. Inbriding duragaylash gomozigota formalarni hosil etsada, hosildorlikni, hayotchanlikni pasayishiga olib keladi. Lekin shunga

qaramay seleksiya ishida u inbriding duragaylashdan ayrim holatlarda foydalilaniladi, chunki u mutant genlarning geterozigota holatdan gomozigota holatga o'tkazishning yagona usuli sanaladi.

Autbriding qon-qardosh bo'lmagan individlarni duragaylash usulidir. Autbriding organizmlar irsiyatini boyitishga, ota-onadagi ijobjiy belgi-xossalarini duragay organizmlarda jamlashga yo'naltirilgan. Chunonchi, g'o'zaning mayda ko'sakli, tezpishar navi bilan yirik ko'sakli kechpishar navi chatishirilsa, F_2 duragaylar orasida mayda ko'sakli tezpishar, yirik ko'sakli o'tapishar, mayda ko'sakli kechpishar, yirik ko'sakli tezpishar, ko'sakli o'tapishar, mayda ko'sakli kechpishar, yirik ko'sakli tezpishar, yirik ko'sakli kechpishar va hokazo o'simliklar hosil bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi tezpishar, yirik ko'sakli, hosildor formalarni ajratib, ular orasida takroriy tanlashni olib borish hisobiga yangi g'o'za navini chiqarishi mumkin. Masalan, *Akala* va *Kuk* navlарини o'zaro duragaylashdan **L.V.Rumshevich** g'o'zaning mashhur *108f* navini chiqarishga muvaffaq bo'lgan.

Retsiprok duragaylash usuli oddiy duragaylashga o'xshasada, bir gal urug'chi sifatida olingan o'simlik, ikkinchi gal changchi sifatida olinadi. Masalan, urug'chi o'simlikni A, changchi o'simlikni B harfi bilan ifodalasak, u holda resiprok duragaylashda AxB va BxA bo'ladi. Bunday duragaylash qaysi o'simlik urug'chi yoki changchi sifatida olinsa yaxshi natija berishi mumkinligini ya'ni qanday duragaylash kombinatsiyasi seleksiya amaliyoti uchun natijali bo'lishini aniqlashga qaratilgan.

Takroriy duragaylash duragay formalarda urug'chi yoki changchi o'simlik belgi-xossalarini kuchaytirish uchun o'tkaziladi. U $(AxB)xA$ yoki $(AxB)xB$ ko'rinishda bo'ladi. Bunday duragaylash duragay organizmlarda $(AxB)xCxD$ ko'rinishda bo'ladi. Bunday duragaylash duragay organizmlarda urug'chi yoki changchi o'simliklarning belgi-xossalarini kuchaytirish zarur bo'lgan taqdirda qo'llaniladi.

Pog'onali duragaylash usulida urug'chi va changchi o'simlikni duragaylashdan olingan F_1 boshqa nav yoki tur bilan chatishiriladi. Chunonchi, $[(AxB)xC]xD$. Bu usul duragaylar bir qancha nav yoki turlarni belgi xossalarini duragaylarda mujassamlashtirish maqsadida qo'llaniladi.

Kombinatsiyalararo duragaylash usulini tubandagicha ifodalash mumkin: $(AxB)(CxD)$. Ko'rinish turibdiki bunda ikki xil urug'chi va changchi o'simliklardan hosil qilingan duragaylar o'zaro chatishiriladi. Shunga ko'ra ularni **kombinatsiyalararo duragaylash** deb ataladi. Kombinatsiyalararo duragaylash makkajo'xori formalarni chatishirishda keng qo'llaniladi.

Seleksiyada duragaylashning navlарaro, geografik va sistematik uzoq formalarni duragaylash xillaridan foydalilaniladi.

5.Tur ichida va turlararo duragaylash

A) **Tur ichida duragaylash** seleksiya ishlarida keng qo'llaniladi. Chunki bir turga mansub navlar o'ng'aylik bilan chatishadilar va ulardan hosil bo'lgan duragay organizmlar naslli bo'ladi. Madaniy o'simliklarning juda ko'p navlari mana shu usul orqali yaratilgan.

G'o'za, donli, sabzavotli, poliz ekinlar, mevali daraxt navlarini ko'pchiligi tur ichidagi duragaylash asosida chiqarilgan.

B) **Geografik uzoq formalarini duragaylashda** bir turga kiruvchi, lekin turli geografik hududlarda chiqarilgan individrlar o'zaro chatishtiladi. Chunonchi, akademik S.Mirahmedov *G.hirsutum* turiga mansub yovvoyi, lekin vilt kasalligiga chidamli meksikanum g'o'zasini madaniy g'o'za S4727 navi bilan duragaylash natijasida yirik ko'sakli va viltga chidamli *Toshkent-1*, *Toshkent-2*, *Toshkent-6* navlarini, akademik A.I.Avtonomov *G.barbadense* turiga mansub fuzarioz kasaliga chidamsiz g'o'za navlarini ko'p yillik peruvianum g'o'zasi bilan duragaylab fuzarioz kasaliga chidamli, yirik ko'sakli 10964, 2836, 2850, 6002 navlarini chiqarishga muvaffaq bo'ldilar.

V) **Turlararo duragaylash** seleksiya ishlarida katta ahamiyatga ega. Faqat shu usul orqali turlar genofondini boyitish mumkin. Har bir tur qimmatli belgilarni, masalan, g'o'za tola sifatini, kasalliklarga, zararkunandalarga, qurg'oqchilikka, past haroratga chidamlilik belgilarni hosil etuvchi genlarga ega. Biroq turlar har xil genomli bo'lganlari sababli o'zaro chatishmaydilar, chatishsalar ham naslli avlod hosil etmaydi. Turlarning o'zaro chatishmasligi, birinchi avlod duragaylarining naslsizlik sabablari turlichadir. Birinchidan har xil xromosoma to'plamiga ega turlar urug'lanisa ham biroq zigota o'z rivojlanishining turli bosqichlarida nobud bo'ladi. Ikkinchidan murtak rivojlansa ham u birinchi chin barg chiqquncha nobud bo'ladi. Uchinchidan holatlarda turlararo duragaylashdan hosil bo'lgan individrlar gullash davrigacha rivojlansa ham ularning urug'chi va changchilari o'zaro chatishib nasl bermaydilar yoki ularning nasli juda oz miqdorda bo'ladi. F₁ duragaylarning pushli yoki qisman pushli bo'lishi duragaylashda qatnashgan urug'chi va changchi turlarning genetik jihatdan qay darajada yaqinligiga bog'liq. Masalan, g'o'zaning tetraploid turlarida 50% xromosomalar yirik bo'lib, ularning hajmi 2-3,4 mikron, 50 foiz xromosomalar mayda bo'lib hajmlari 1,2-1,7 mikron atrofidadir. Shunga ko'ra yangi dunyoning tetraploid turlari (*G.hirsutum*, *G.barbadense*) eski dunyoning 26 xromosomali turlari bilan duragaylansa G¹, duragaylar har ikki turning mayda xromosomalarini o'zaro kon'yugatsiyalashsalarda yangi dunyoning 13 yirik xromosomasi univalent holatda bo'lgani uchun tetraploidlar nasl bermaydilar.

Shunday qilib har xil genomga ega turlarni duragaylashda meyo'jarayoni normal holatda bo'lmaydi. Oqibatda duragaylar F₁ da nasi bo'ladi. Shunga qaramay turli usullarni qo'llash tufayli akademik S.S.Kanash xromosoma to'plami 26 (*G.herbaceum*) va 52 ta (*G.hirsutum*) bo'lgan g'o'zalarni chatishtilib, so'ngra olingan duragaylarni urug'chi changchi turlar bilan takroran duragaylash natijasida gommoz kasalichidamli 8802 navini, 52 xromosomali *G.barbadense* turini xromosomali *G.arboreum* turi bilan duragaylab bir vaqtning o'zida ha gommoz ham fuzarioz kasallariga chidamli 114-1 navini chiqarish muvaffaq bo'ldi.

Akademik N.V.Sitsin yovvoyi bug'doyiq o'simligini bug'doy o'sim bilan duragaylash tufayli bug'doyiqning sovuqqa, qurg'oqchilik kasalliklarga chidamlilik belgilardan ayrimlarini o'zida mujassamlashtirish, 1, 186, 559 serhosil bug'doy navlarini yaratdi. Turkmaniston seleksionerlardan I.K.Maksimenko *G.hirsutum* va *G.purpasenc* kenja tur duragaylab havorang, yashil tolali (7631 i) g'o'za navini chiqardi.

6.Geterozis

Odatda o'z-o'zidan changlanadigan yoki xromosomalar soni o'siz turlar o'zaro chatishtiliganda birinchi avlod duragaylari urug'chi va changchi o'simliklarga nisbatan kuchli rivojlangan, yashovchan va hosildor bo'la. Bu hodisa fanda **geterozis** yoki «duragay kuchi» deb ataladi. Odatda geterozis hodisasi olasidagi duragaylarning faqat birinchi avlodida kuzatiladi. Geterozis hodisasi o'siz tomonidan turlicha tushuntiriladi. Olimlar *Shell* va *Ist* fikricha, uning shi va changchi o'simliklarni o'zaro duragaylashda gomozigota holos, geterozigota holatga o'tishi geterozisiga sababchidir. G.Devenport, A.D.Jenik qayd etishicha, geterozis urug'chidagi zararli retsessiv aksincha, changchi o'simliklarning foydali genlar dominantlik shi, ustidan changchi o'simliklarning foydali genlar dominantlik shi, aksincha, changchi o'simliklarda zararli genlar ustidan urug'chi genoti pi *AabbccDDeeff*, changchi esa *aaBBccddEEFF* genotipi urug'chi genoti pi *AabbccDDeeff*, changchi esa *aaBcdEF*, birinchi avlod iborat bo'lsa, ularning gametalari *AbcDef* va *aBcdEF*, birinchi avlod urug'chi genoti pi *AaBbccDdEeFf* ko'rinishda bo'ladi. Boshqacha aytganda, urug'chi va changchi o'simliklarda to'rttadan, uchtadan zararli retsessiv genlar bo'lsa, ularni duragaylashdan hosil bo'lgan F₁ o'simliklarda esa bitararli retsessiv gen uchraydi.

Geterozis duragaylarning barcha belgilari taaluqli bo'lmaybelgi-xossalarga tegishli bo'ladi. A.Gustafsson o'simliklardi geterozisini tubandagi xillarga ajratadi:

a. Reproduktiv geterozisda F₁ duragaylarning urchish organlari yaxshi

rivojlanib, u urug' va mevalarning hajm va miqdor jihatdan ko'p bo'lishiga olib keladi.

b. Somatik geterozis o'simlikning vegetativ organlarining kuchli rivojlanishiga sababchi bo'ladi.

c. Adaptiv geterozis esa duragaylarning hayotchanligini oshiradi.

Tabiiy ravishda duragaylarda geterozis ularni hosil qilish uchun tanlangan ota-onal organizmlarga hamda sharoitning qulay bo'lishiga bog'liq.

Geterozis faqat F₁ da bo'lib, uni kelgusi avlodlarga berish halij o'z echimini topgani yo'q. Geterozis faqat o'simliklarni vegetativ, ya'ni qalamcha, tugunak va piyoz ko'paytirilgandagini avloddan-avlodga berilishi mumkin. Geterozis faqat o'simliklarda emas, hayvonlarni ham chatishirganda namoyon bo'ladi. Masalan, leggorn zotli tovuqlarning inbred liniyalarni chatishirishdan olingan F₁ duragay tovuqlarda chatishirishga qatnashgan tovuqqa nisbatan tana og'irligi 130 gr, tut i pak qurti kapalaklarini har-xillarini chatishishidan olingan kapalak pillalarining i pak berishi 10-15% ortganligi aniqlangan. Geterozisni sababini biokimyoiy yo'l bilan tadqiq qilish yo'li o'rganilganda duragay organizmlarda ba'zi fermentlar faolligi oshganligi ma'lum bo'ldi.

7. Eksperimental poliploidiya

Agar xromosomalar to'plami bir necha karra ortsa bunday o'simlik va hayvonlar **poliploidlar** deb ataladi. Normal o'simliklarda xromosomalar juft-juft holatda bo'lgani sababli bunday individlar diploid to'plamli turlar deyiladi. Mabodo o'simliklarda diploid to'plamli xromosomalar ikki marotaba ko'paysa ularni tetraploidlar, uch marotaba ko'paysa geksaploidli, to'rt marotaba ko'paysa oktaploid turlar deb nomlanadi.

Poliploidiya o'simliklar evolyutsiyasida muhim rol o'ynagan. Aniqlanishicha gulli o'simliklarning ko'p avlodni poliploid turlardan iborat. Poliploid turlar donli, mevali, rezavor mevali, sitrus va texnika, dorivor o'simliklarda ko'plab uchraydi. Akademik P.M.Jukovskiy ta'biri bilan aytganda insoniyat poliploid turlar hisobiga ham oziqlanadi, ham kiyinadi.

Fizikaviy omillardan farqli ravishda kimyoviy omillar (iprit, formaldegid, etilenamin, dietilsulfat, ayniqsa kolxitsin alkoloidi) orqali sun'iy mutatsiyalar hosil qilingan.

Past harorat ham mutatsiyalarni hosil etishi tajribada isbotlangan. Past harorat ta'sirida hosil shoxi bor g'o'za navlaridan A.I.Avtonomov hosil shoxi yo'q, ko'saklari asosiy poyada joylashgan 2525 navini yaratdi.

8. Eksperimental mutagenez

Seleksiyada fizikaviy, kimyoviy omillar ta'sirida sun'iy mutatsion o'zaruvchanlikni hosil etish va ular asosida yangi navlarni chiqarish

ommaviy tus olgan. Dastlab 1925 yili rus olimlaridan G.A.Nadson va G.S.Filippovlar achitqi zamburug'lariga rentgen nurlarini ta'sir etib mutatsiya olish mumkinligini isbotladilar. 1927 yilda esa amerikalik olim G.Meller drozofila meva pashshasida sun'iy mutatsiya hosil etdi. Keyinchalik L.N.Delone va A.A.Sapegin rentgen nuri ta'sirida irlsiy o'zgaruvchanlik hosil qilish va uni tezlashtirish mumkinligini isbotladilar. Rentgen va gamma nurlar ta'sirida gen va xromosoma mutatsiyalari paydo bo'ladi. Tirk organizmlarga radiatsiyaning ta'sir etish kuchi uning nurlantirilayotgan to'qima hujayralariga singishi bilan o'chanadi. Organizmlarning nurlanish dozasini bilish muhimdir. Nurlanish dozasi odatda havoning nurlanish hajmi bilan aniqlanadi. Nurlanish dozasi birligi qilib bir rentgen (K) olingan. Rentgen bu 0°C va 760 mm simob ustuni bo'yicha bosimda 1 sm² quruq havoda (0,001293g) taxminan 2 mlrd (2x1x10⁹) ion bug'i hosil bo'lishiga olib keladigan nurlanish sanaladi.


O'simlik va hayvonlarni rentgen va gamma nurlari bilan nurlantirish kilorentgen (Kr) bilan o'chanadi. Rentgen va gamma nurlarining kuchi 1 sekund (r/sec) yoki 1 minut (r/min) bilan belgilanadi. O'simliklarning urug'i, chang donasi, mevasi, bargi, ildizi, umuman o'simlik rivojalanishining barcha bosqichlarida ta'sir etish mumkin. Lekin ko'pgina hollarda urug'ga nur orqali ta'sir qilinadi.

O'zbekiston «G'o'za seleksiyasi va urug'chiligi» ilmiy-tadqiqo institutidan akademik Sh.I.Ibragimov va katta ilmiy xodim R.I.Kovalchuk 108f g'o'zaning vegetativ organlariga gamma nurlarini ta'sir ettirish orqa Mutant navini, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining muxbir a'zos Nabijon Nazirov va akademik Oston Jalilovlar yuqqori hosilli AN-40 Samarqand-3 va Yulduz g'o'za navlarini yaratdilar.

9. Hayvonlar seleksiyasi

Hayvonlar seleksiyasi ko'p jihatdan o'simliklar seleksiyasiga o'xshas Shu bilan birga hayvonlar seleksiyasining o'ziga xos jihatlari bo'lib. Birinchidan, uy hayvonlari faqat jinsiy yo'l bilan urchiydi. Ikkinchida hayvonlar nasli kam sonli, uchinchidan esa har bir hayvon qimmaturadi. Hayvonlar ustida seleksiya ishlari olib borilar ekan ulamiy ekstereri, intereri diqqat markazida bo'ladi. Eksterer deganda hayvon tashqi tana tuzilishi, shakliga bog'liq mahsuldarligi tushuniladi. Intereri deganda esa ichki organlarning anatomiysi, fiziologiyasi, bioximiya bilan aloqador mahsuldarligi tushuniladi. Har bir hayvon organlari bilan yaxlit bir sistema bo'lib, uning barcha organlari o'zaro bog'liq. Masai qoramoldagi sersutlikning rivojlanib borishi qon tomirlar, nafas olish, a boshqa ichki organlar bilan uzviy bog'langan. Shunga ko'ra hayvon usha

Inson o'zining uzoq yillar olib borgan seleksiya ishlari tufayli otlarning 45 dan ortiq zotlarini chiqargan. Chopqir, aravaga qo'shiladigan otlar, og'ir yuk tortadigan otlar, jaydari otlar shular jumlasidandir. Markaziy Osiyoda tanlash va duragaylash natijasida yaratilgan chopqir, mahalliy sharoitga moslashgan *Axaltaka*, *Qorabayir* otlari ayniqsa mashhur (80-rasm).



80 – rasm. *Axaltaka* ot zoti.

Savollar va topshiriqlar

1. Seleksiya atamasi nimani bildiradi?
2. Nav va zotga ta'rif bering.
3. Madaniy o'simliklarning kelib chiqish markazlarini jadvaldan ko'rsating. Markaziy Osiyo markazidan qanday o'simlik navlari kelib chiqqan?
4. Sun'iy tanlash va uning xillarini tushuntiring.
5. Duragaylash metodining mohiyatini so'zlang.
6. Duragaylash sistemasini yoriting.
7. Tur ichida duragaylash va u yordamida chiqarilgan navlar haqida nimalarni bilasiz?
8. Seleksiyada turlararo duragaylashdan qanday maqsadlarni amalga oshirish uchun foydalilanildi?
9. Nima sababdan xromosomalar to'plami har xil bo'lган turlarni duragaylashda F₁ pushtsiz bo'ladi?
10. Turlararo duragaylash metodi tufayli yaratilgan g'o'za, bug'doy, karam o'simliklariga misollar keltiring.
11. Eksperimental mutagenez qanday omillar ta'sirida hosil qilinadi?
12. Fizikaviy omillarga nimalar kiradi?
13. Kimyoviy omillarga nimalar kiradi?

14. Insoniyatga poli ploid turlarning ahamiyati nimalardan iborat?
15. Autbridningni inbridingdan nima farqi bor?
16. To'g'ri va retsiprok duragaylash sxemasini yozib ko'rsating.
17. Takroriy duragaylash qaysi maqsadlarni hal etish uchun qo'llaniladi? Pog'onali duragaylashchi?
18. Kombinatsiyalararo duragaylash sxemasini yozib ko'rsating.
19. Geterozis nima? Uni tushuntirish uchun qanday nazariyalar ilgari surilgan?.
20. Hayvonlar seleksiyasining o'simliklar seleksiyasidan farqini yoriting
21. Qoramol zotlarini chiqarish qaysi yo'nalishlarda olib boriladi?
22. Sersut qoramol zotlariga misollar keltiring.
23. Sergo'sht qoramol zotlariga misollar keltiring.
24. O'zbekistonda qoramolning qanday zoti yaratilgan?
25. Respublika otlarning qanday zotlarini bilasiz?
26. O'zbekistonda qo'yarning qanday zotlari mashhur?

Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

- I. Yuksak o'simliklarning nechta turi madaniylashtirilgan?*
- A. 100 turi
- B. 130 turi
- C. 150 turi
- D. 80 turi
- 2. Madaniy o'simliklarning kelib chiqish markazlari.*
- A. Hindiston, Xitoy, o'rta Osiyo, Xabashiston
- B. O'rta Yer dengizi, Markaziy Amerika, Janubiy Amerika
- C. Avstraliya, Yevropa, Markaziy Osiyo, Yaponiya
- D. A va B javoblar
- 3. G'o'za seleksiya va urug'chilik ilmiy-tadqiqot institutida qancha madaniy va yovvoyi g'o'za namunalari bor?*
- A. 1000
- B. 20000
- C. 12054
- D. 11150
- 4. Autbridning nima?*
- A. Qon-qardosh bo'lмаган individlarni chatishtirish
- B. Sistematisk jihatdan o'zak formalarini chatishtirish
- C. Geografik jihatdan uzoq formalarini chatishtirish
- D. Yaqin qon-qardosh formalarini chatishtirish

5. Inbriding nima?

- A. Qon-qardosh bo'lmagan individlarni chatishtirish
- B. Sistematik jihatdan o'zak formalarni chatishtirish
- C. Geografik jihatdan o'zak formalarni chatishtirish
- D. Yaqin qon-qardosh formalarni chatishtirish

6. Kombinatsiyalararo chatishtirish toping.

- A. A+B
- B. (A+B)+A
- C. (A+B)+(C+D)
- D. (A+B)+B

7. Gustafson geterozismi qanday xillarga ajratgan?

- A. Reproksaktiv, somatik, adaptiv
- B. Fiziologik, biokimyoviy, reproduktiv
- C. Fiziologik, somatik, adaptiv
- D. Somatik, biokimyoviy, adaptiv

8. Navga ta'rif bering.

- A. Seleksiya yo'li bilan olingan o'simlik xili
- B. Eksperimental yo'li bilan olingan o'simlik populyatsiyasi
- C. Morfologik va xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan belgilari bo'yicha bir xillashtirilgan, xalq xo'jalik talablariga javob bera oladigan guruhi
- D. Xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan qishloq-xo'jalik talablariga javob bera oladigan o'simliklar guruhi

9. Zotga ta'rif bering.

- A. Hayvonlarni duragaylash yo'li bilan olingan guruhi
- B. Morfologik belgi xossalari bo'yicha birxillashtirilgan va xo'jalik talablariga javob bera oladigan individlar guruhi
- C. Xonakilashtirilgan hayvonlarning alohida guruhi
- D. Hayvonlarni eksperimental yo'li bilan olingan alohida populyatsiyasi

Asosiy genetik atamalar lug'ati

Aberratsiyalar — xromosoma tuzilishining tashqi yoki ichki omillar ta'siridagi o'zgarishlar.

Albinizm — teri va ko'z rangdor pardasida melanin pigmenti yo'qligi. Bu belgi retsessiv bo'lib, aminokislotalar almashinuvining buzilishiga bog'liq.

Anafaza — mitozning uchinchi bosqichi. Bu faza vaqtida xromatidalar bo'linayotgan hujayraning qarama-qarshi qutblariga qarab tarqaladi.

Antropogenetika — odam genetikasi.

Autosomalar — turli jins vakillarida bir xil bo'ladigan nojinsiy xromosomalar.

Avtopoliploidiya — bir turga mansub organizmlar xromosomalar to'plamini ikki xissa ortiq bo'lishi.

Allel — genning ikki va undan ortiq holati.

Altopoliploidiya — hujayrada ikki turga mansub xromosomalarni mujassamlashgan xili.

Amniotsentez — homila suyuqligini genetik jihatidan tahlil qilib bolaga tashxis qo'yish.

Aneuploid — mitoz yoki meyozi bo'linishida xromosomalarni qiz hujayralarga noto'g'ri taqsimlanishi natijasida sonini kamayishi ($2n-1$) yoki ko'payishi ($2n+1$).

Antigen — organizm uchun genetik jihatdan yet bo'lgan modda.

Antipod hujayralar — murtak xaltachasida urug'chi va sinergidlarning qarama-qarshi tomonida joylashgan gaploid bo'lgan hujayralar.

Antikodon — t RNK dagi uchta nukleotidi bo'lib, ular oqsil biosintezida i RNK uchta nukleotidi (kodon) komplementarlik asosida o'zaro juftlashadigan qismi.

Arxeospora — gulli o'simliklarda chang donachalari va tuxum hujayrani hosil qiluvchi dastlabki hujayra qatlami bo'lib, ulardan chang donachalari yoki murtak xaltasini hosil qiladigan ona hujayralar rivojlanadi.

Autbriding — genetik jihatdan uzoq bo'lgan organizmlarni chatishtirish.

Bivalent — meyozening paxinemasi bosqichida o'zaro konyugatsiyalashgan gomologik xromosomalar jufti.

Bioteknologiya — biologik molekulalar va organizmlardan foydalananib, odamlar va chorva mollari uchun zarur mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasi.

Vektor konstruksiya — biror ahamiyatga ega DNA bo'lagi kiritilgan plazmid, virus yoki ko'chib yuruvchi genetik elementlar DNA molekulasi.

Virulent fag — bakteriya halok bo'lishi yoki o'lmasligiga ta'sir etuvchi bakteriosag.

Viruslar — bakteriosaglar — hayotning hujayrasiz shakllari.

Gameta — generativ jinsiy hujayra.

Gametasit — o'simliklarda jinsiy hujayralarni hosil etuvchi bo'g'in.

Gemizigot gen — genotipda bir nusxada bo'lgan retsessiv gen ta'sirida belgining rivojlanishi.

Gaploid xromosomalar to'plami — jinsiy hujayralarda bo'ladigan barcha xromosomalar to'plami (In).

Gemizigota — ikki allelning faqat bittasiga ega zigota, organizm.

Gen — organizmda ma'lum funksiya bajaruvchi DNA dagi nukleotidlar izchilligi.

Genetik injeneriya — gen yoki genlar majmuasini maqsadga muvoziq o'zgartirish.

Genotip — organizm, hujayraning irlsiy omillar yig'indisi.

Genom — xromosomalarning gaploid to'plami.

Genofond — populyatsiyaning gendlar majmuasi.

Gen operator — operonnining bosh qismida joylashgan strukturali genlar funksiyasini faollashtiruvchi yoki to'xtatuvchi DNAning qismi.

Gen regulator — operatorga birikib strukturali genlar faoliyatini to'xtatib qo'yadigan repressor oqsillarni sintezlovchi genlar.

Gen suppressor — Allel bo'limgan genlar ta'sirini to'xtatib qo'yadigan gen.

Genlar dreyfi — (genetik avtomatik jarayon) tasodifli omillar ta'siri tufayli populyatsiyadagi genlar tuzilishi va takrorlanishini o'zgarishi.

Genofor — halqasimon gaploid DNA ipi, prokariotfarning «xromosomasi».

Germafrodit — ham erkak, ham urg'ochi jins xossalarni o'zida birlashtirgan organizm.

Geterogametali jins — har xil jinsiy xromosomaga ega gametalarni hosil etuvchi organizm.

Geterozigota — bir genning har xil allellariga ega bo'lgan zigota, organizm.

Geterozis — birinchi avlod duragylarning ota-onalar organizmlarga nisbatan kuchli rivojlanishi, hayotchan bo'lishi, vegetativ, generativ organlarning ko'p bo'lishi.

Geteroxromatin — xromosomadagi DNA spiralini zikh joylashgan qismi.

Gibriddoma — har qanday normal hujayra bilan rak hujayrasining qo'shilishi natijasida hosil qilingan tez bo'linuvchi duragay hujayralar to'plami. Ular tez ko'payadilar.

Ginandromorf — tananing bir qismi erkak, ikkinchi qismi urg'ochi jinsga tegishli mozaik organizm.

Gomogametali jins — bir xil jinsiy xromosomaga ega bo'lib o'xshash gametalarni hosil etuvchi organizm.

Gomozigota — bir genning bir xil allellariga ega zigota, organizm.

Gomologik xromosomalar — bir xil tuzilishga, allellarga ega xromosomalar

Gistogramma — variatsiya qatorini grafik yo'l bilan tasvirlashning usullaridan biri.

Guanin (G) — nuklein kislotalar tarkibiga kiradigan purin asosi.

Deletsiya — xromosomaning bir qismini yo'qolishi bilan bog'liq mutatsiya.

Deperatsiya — fizikaviy, kimyoiy mutagenlar ta'sirida o'zgargan DNA ning birlamchi tuzilishini tiklanishi.

Diplonema — meyozi bo'linish profaza-I ning to'rtinchisini bosqichi. Bu bosqichda kon'yugatsiyalashgan xromosomalar buraladi (krossingover bo'lib o'tishi mumkin) va bir-biridan itariladi.

Diduragay chatishtrish — ikki juft alleli bilan farq qiluvchi organizmlarni chatishtrish.

Dizigota egizaklar — ikkita tuxum hujayrani urug'lanishidan rivojlangan egizaklar.

Diploid — ikkita gaploid xromosoma to'plamiga ega hujayra, to'qima, organizm.

Diakinez — meyozi bo'linish profaza I ning oxirgi bosqichi bo'lib, bunda xromosomalar kalta va yo'g'on bo'ladi.

Diplonema — meyozi bo'linish profaza I ning bosqichi bo'lib bunda gomologik xromosomalar o'rtaida xizazmalar vujudga keladi.

DNK ligaza — bir nukleotidning 5'- RO₄ qoldig'i bilan ikkinchi nukleotidning 3'- ON qoldig'i orasida fosfodiefir bog' hosili tufayli polinukleotidni tikuvchi ferment.

DNK polimeraza — dezoksiribonukleotid trifosfatlardan DNK molekulasini sintezlovchi ferment.

Dominant — geterozigotada namoyon bo'luvchi allel yoki belgi-xossa.

Duplikatsiya — ikki hissa ko'payish, gen yoki xromosomalar qayta tuzilishining bir turi, bunda gen yoki xromosomaning ayrim qismi ikkita bo'lib qoladi.

Zigota — erkak va urg'ochi gametalarining qo'shilishidan, ya'ni urug'lanish natijasida hosil bo'ladigan hujayra (murtak).

Zigonema — meyozi bo'linishning profaza I ning bosqichi. Bu bosqichda gomologik xromosomalar kon'yugatsiyalananadi, ya'ni justlashadi.

Idiogramma — xromosomalarning morfologik belgilari uzunligi, eni, sentromerini joylanishi, hamda geteroxromatin, euxromatinni taqsimlanishiga qarab tuzilgan grafik tasviri.

Inbriding — chetdan urug'lanadigan o'simliklar va hayvonlarni o'zini-o'zi bilan chatishtrish, ya'ni yaqin qarindoshlarni chatishtrish.

Inversiya — xromosomalar ichida qayta tuzilish. Xromosomalarning ikki nuqtadan uzilishi va uzilgan qismining 180° ga burlishi natijasida genlarning xromosomada joylashish tartibining o'zgarishi.

Induktor — oqsil biosintezida ishtiroy etadigan past molekulali modda.

Interkinez — meyozi bo'linishning ikki bo'linish o'rtaсидаги давр.

Interseksklar — ikki jinsni oralig'idagi organizmlar.

Interfaza — hujayraning bir bo'linishi bilan yanagi bo'linishi orasidagi bosqich. U uch davr — sintezlanishdan oldingi (G¹), sintezlovchi (S) va sintezlanishdan keyingi (G²) ga bo'linadi.

Informatsion RNK (iRNK) — genlardan ribosomalarga oqsil sintezi haqida axborot beruvchi RNK.

Insuxt — chetdan changlanadigan o'simliklarni majburan o'z-o'zi bilan chatishtrish.

Interferensiya — xromosomaning bir joyida ro'y bergan krossingoverni boshqa joyidagi krossingoverga tasiri.

Intron — RNK ning irlsiy axborotga ega bo'limgan ayrim qismlari.

Insersiya — DNK molekulasining ayrim bo'lagini genomning ma'lum joyolariga kirishi.

Kariogamiya — erkak va urg'ochi gametalar yadrosining qo'shilish jarayoni.

Kariogramma — xromosomalarning fotosuratinti katta — kichikligi va tuzilishiga qarab qo'yib chiqish. Ayrim xromosomalar va ular to'plamlarining tuzilishida o'zgarishlar topilishi xromosomalardagi bir qancha o'zgarishlarni, demak kasallikkarni aniqlab olishga imkon beradi.

Kariokinez — (kariotomiya) yadroning bo'linishi.

Kariotip — u yoki bu turdag'i organizm somatik hujayralardagi xromosomalarning soni, hajmi, shaklini ifodasi.

Klon — bir formani jinssiz ko'paytirishdan hosil bo'lgan avlodlar yig'indisi. Ular genetik jihatdan bir xil bo'ladi.

Komplementar genlar — allel bo'limgan genlar bo'lib, ular birgalikda ma'lum bir belgini rivojlantiradi, ya'ni to'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Kodon — uchta nukleotid (triplet) dan tashkil topgan irlsiy axborot birligi

Kodominant — har xil allellar ta'sirida belgilarni geterozigota holatda fenotipda namoyon bo'lishi.

Kolxitsin — hujayra bo'linish davridagi dugning iplarini yemirib, xromosomalarining bir-biridan ajralish mexanizmini falaj qilib qo'yadigan (kuz boychechagidan olingan) alkloid.

Kombinativ o'zgaruvchanlik — ota-onha genlarning yangi kombinatsiyasi tufayli paydo bo'lgan irlsiy o'zgaruvchanlik.

Kon'yugatsiya — meyozning I profazasida gomologik xromosomalarining uzunasiga qo'shilishi. Ayrim holatlarda u krossingoverga sababchi bo'ladi.

Koinsindensiya — interferensiyanamoyon bo'lish darajasini ko'rsatkichi.

Krossingover — reduktzion bo'linishda kon'yugatsiyalashgan gomologik xromosomalarining xromatidalarini o'tasida o'xshash qismlari (genlar)ning o'rinnalmashishi.

Ligaza — ATF energiyasi hisobiga har xil molekulalararo o'zaro biriktiruvchi (tikuvchi) fermenti.

Liniya — o'zini-o'zi bilan chatishtirish natijasida vujudga keladigan genotip jihatdan bir xil bo'lgan organizmlar.

Lizogeniya — fag bilan zararlangan bakteriyada fag o'z D NK sini bakteriya D NK siga kiritadi va lizogen bakteriyani hosil etadi yoki fag bakteriyani o'ldirib undagi D NK va oqsillardan ko'plab flaglarni hosil etadi.

Lokus — xromosomaning genetik xaritasida u yoki bu genning joylashgan o'mni.

Leptonema — meyoz bo'linishdagi profaza I ning bosqichi bo'lib bunda ipsimon shakldagi xromosomalar hali birlashmagan bo'ladi, euxromatin qismlari bilan navbatlashib turadi.

Letal gen — embrionni, organizmlarni (ayniqsa gomozigota holatda) nobud qiladigan gen.

Megaspora — yosh urug'kurtakdagidagi arxespora hujayralarining meyoz bo'linish natijasida hosil bo'lgan 4 ta sporaning yirigi. Uning rivojlanishidan murtak xaltasi hosil bo'ladi.

Meyoz etilmagan jinsiy hujayralar yadrosining ikki marta bo'linishi natijasida xromosomalar gaploid bo'lgan 4 gameta hosil bo'ladi.

Metafaza — mitozning ikkinchi fazasi, bu fazada yadro qobig'i erib ketadi, xromosomalar esa hujayra ekvatori bo'ylab joylashadi.

Metatsentrik xromosomalar — teng yelkali xromosomalar.

Metabolitlar — tirik organizmdan modda almashishi natijasida hosil bo'lgan moddalar.

Migratsiya — bir populyatsiya genofondiga boshqa populyatsiya genotiplarini qo'shilishi. Migratsiya tufayli populyatsiyadagi genlar konsentratsiyasi o'zgaradi.

Mikrospora — yosh chang xaltachasidagi arxespora hujayrasining meyoz bo'linishi natijasida hosil bo'lgan to'rtta hujayra (tetradan)ning biri, uning rivojlanishidan chang donachasi hosil bo'ladi.

Mitoz — somatik va yetilmagan jinsiy hujayralar bo'linishining bir shakli. Mitozda dastlabki hujayraning genetik strukturasi normada qiz hujayralarga aniq taqsimlanadi.

Mitoxondriylar — replikatsiyaga qodir hujayra organellari bo'lib, ular hujayraning oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini yuzaga chiqaradigan «energetik stansiyalari» bo'lib hisoblanadi. Tarkibida nuklein kislotalar, jumladan, D NK ham bo'lishi mitoxondriylarning sitoplazmatik irlsiyatda ishtiroy etishini taqozo qiladi.

Modifikatsion o'zgaruvchanlik — irlsiy bo'lmagan fenotipik o'zgaruvchanlik, u tashqi sharoit ta'sirida hosil bo'ladi va nasldan-nasliga berilmaydi.

Modifikator gen — boshqa genlar bilan aloqada bo'lib, ular ta'sirini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi

Monozigot egizaklar — bir otalangan tuxum hujayradan rivojlangan egizaklar.

Monoduragay — bir just muqobil belgisi bo'yicha bir-biridan keskin farq qiladigan formalar (AA va aa)ni chatishtirib olingan duragay (Aa).

Monomer — polimerlarda takrorlanadigan elementlar. Masalan, aminokislotalar oqsilning monomerlari hisoblanadi.

Mozaiq — har xil genotipli hujayralardan tashkil topgan organizm.

Monosomik — xromosomalarining diploid to'plamida ikkita gomologik xromosomadan birining bo'imasligi.

Morfozdar — turning normal reaksiya normasini fizikaviy, ximiyaviy va boshqa ta'siri oqibatida ahyon-ahyonda kuzatildigan va irlsiylanmaydigan o'zgaruvchanlik.

Mutagenez — tabiiy va sun'iy omillar ta'sirida irlsiy o'zgarishlar hosil bo'lish jarayoni.

Mutagen — mutatsion o'zgaruvchanlik hosil qiladigan fizikaviy yoki kimyoviy omillar (ionlashtiruvchi nurlar, har xil kimyoviy birikmalar va boshqalar).

Mutant — mutatsiya natijasida genotipi o'zgargan organizm.

Mutatsion o'zgaruvchanlik — organizmda yangi irlsiy belgi — xususiyatlar hosil qiladigan gen va xromosomalarining tarkibiy o'zgarishi.

Mutatsiya — to'satdan hosil bo'ladiqan irlsiy o'zgaruvchanlik.

Muton — mutatsiyalinish xossaliga ega bo'lgan genning eng kichik qismi.

Nogomologik xromosomalar — genlari o'zaro farq qiladigan va meyozda o'zaro konyugatsiyalashmaydigan xromosomalar.

Nonsense kodon — irlsiy axborot saqlamaydigan terminator kodon.

Nuklein kislotalar — biologik polimer bo'lib uning ikki tipi D NK va RNK mavjud.

Nukleotidlardar — nuklein kislotalarning tarkibiy elementi bo'lib: azotli asos, oddiy uglevod va fosfat kislotosi qoldig'i molekulalarining qo'shilishidan hosil bo'lgan murakkab organik birikmalar. D NK va RNK molekulalari nukleotidlardan tuzilgan.

Nukleoproteidlar — oddiy oqsil va nuklein kislotalarning birikishidan hosil bo'lgan murakkab birikma. Ular hayvonlar bilan o'simliklar hujayrasi yadrosi va sitoplazma tarkibiga kiradi.

Nullisomik — xromosomalarining diploid to'plamida ikkita gomologik xromosomaning bo'imasligi.

Ovogenez — murtak hujayralarini ixtisoslashishi va meyoz bo'linishi natijasida tuxum hujayrani rivojlanishi.

Ontogenez — organizmning individual rivojlanish davri.

Operon – oqsil transkriptsiyasini tartibga soluvchi promotor, operator, strukturali genlardan iborat DNK qismi.

Operator – operondagi DNK ning bir bo'lagi. Repressor oqsil bilan bog'lanib operonning transkriptsiyasini "bo'g'adi".

Organogeneza – tanani asosiy organlarini shakllanishini ta'minlovchi embriogenez stadiysi.

Oogoniya – murtak hujayralardan mitoz orqali oosit hujayralarini hosil bo'lishi jarayoni.

Partenogeneza – urug'lanmagan tuxum hujayradan murtak rivojlanishi.

Paxinema – meyozi bo'linishning profaza I ni zigonema bosqichidan keyingi davr. Bu bosqichda gomologik xromosomalar bir-biri bilan mahkam bog'langan bo'ladi va bivalentlar deb ataladi.

Penetrantlik – dominant yoki retsessiv gen allelini gomozigota holatdagi ta'sirini namoyon bo'lish ehtimolligi.

Peptid bog' – bir aminokislotaning amin guruhi bilan ikkinchi amino kislotaning karboksil guruhi o'tasida bog'ni hosil bo'lishi va bir molekula N₂O ajralishi.

Plazmogenlar – ona organizm orqali irlsylanadigan (mitaxondriya, o'simliklarda plastida) genlari.

Plazmida – xromosomadan tashqarida joylashgan o'z-o'zini replikatsiya qila oladigan nihoyatda kichik halqali DNK molekulasi.

Pleyotropiya – bir genning ikki va undan ortiq belgilarning fenoti pda namoyon bo'lishiga ko'rsatgan ta'siri.

Promotor – operonning bosh tomonidagi RNK polimerazasi "taniydiyan" nukleotidlari izchilligi, oqsil transkriptsiyasini boshlovchi qismi.

Prototroflar – minimal muhitda yashab undan organizm uchun zarur barcha organik moddalarni sintezlay oladigan mikroorganizmlar.

Polimerazalar – kichik molekulali birikmalardan polimer birikmalarning hosil bo'lishini ta'minlovchi fermentlar.

Polipeptid zanjir – peptid bog'li 10 dan ortiq aminokislotalardan iborat zanjir.

Poliploidiya – uch va undan ortiq xromosoma to'plamiga ega hujayra, to'qima, organizm.

Politen xromosoma – hujayra bo'linish mobaynida xromatidalarning bir-birdan ajralib ketmasligi tufayli hosil bo'lgan gigant xromosomalar.

Polimeriya – organizm bir belgisining rivojlanishiga bir qancha allel bo'lmagan genlarning o'xshash ta'siri.

Poliploidiya – xromosomalar haploid to'plamining ikki yoki uch hissa va undan ko'p marta ortishi.

Populyatsiya – bir turga mansub, ayrim belgi-xossalari bilan farqlanuvchi, nisbatan alohidalashgan, erkin chatishib nasl beruvchi individlar majmui.

Praymer – DNKnинг ayrim qismiga komplementar syn'iy sintez qilingan o'nug'unkleotid izchilligi.

Proband – taxlit qilish uchun ma'lumotlarga ega shaxs.

Profaza – mitoz va meyozi bo'linishning birinchi fazasi bo'lib, bunda xromosomalar shakllana boshlaydi.

Prokariotlar – shakllangan yadrosi bo'lmaydigan organizmlar, bakteriyalar, ko'k-yashil suvo'tlar.

Repressor – operondagi operator bilan birikib RNK polimerazani promotorga o'rnatishiga to'sqintik qiluvchi va natijada strukturali genlar faoliyatini to'xtatuvchi oqsil molekulasi.

Reparatsiya – fizikaviy, kimyoiy mutaganlar ta'siri o'zgargan DNK birlamchi tuzilishini genlar nazoratidagi maxsus fermentlar ishtirokida tiklanishi.

Resiksion endonukleazalar – DNK molekulasi mayda bo'laklarga kesuvchi fermentlar.

Rezus faktori – monogen yo'l bilan nasldan-nasnga o'tadigan, ya'ni bir just dominant (Rh⁺) va retsessiv (rh⁻) alleliga bog'liq bo'lgan eritrotsitlardagi antigen.

Rekombinatsion o'zgaruvchanlik – krossingover natijasidagi DNK dagi o'zgargan birikmalarini hosil bo'lishi.

Rekombinatsiya – meyozi, mitoz bo'linishi natijasida xromosomalar, genlarning yangi kombinatsiyalarini paydo bo'lishi.

Rekon – rekombinatsiyalanish xususiyatiga ega bo'lgan genning eng kichik qismi.

Replikatsiya – DNK molekulalarining ikki hissa ko'payishi, ikkala komplementar polinukleotid zanjirining o'z-o'zini aniq paydo qilishi. Bu hodisa intersazaning sintetik davri (S) da matritsa prinsipiqa muvofiq amalga oshadi.

Retro viruslar – RNK ga ega viruslar. Uning ko'payishi RNK orqali qo'sh zanjirli DNK sinteziga asoslanadi.

Retsessiv gen – belgi va xossani faqat gomozigota holatda namoyon etuvchi gen.

Retsiprok chatishtrish – chatishtrishda bir forma (A) ning bir gal ona (A x B), ikkinchi gal ota (B x A) sifatida olinishi.

Sayt – krossingover va mutagenezda faoliyk ko'rsatuvchi genning eng kichik bir bo'lagi.

Sekvenirovanie – DNK bo'lagidagi nukleotidlari izchilligini aniqlash.

Supressor (ingibitor) genlar – gomozigota, geterozigota holatda allel bo'lmagan genlar faoliygini "bo'g'uvchi" genlar.

Spermatogenesi – erkak jinsi hujayralarning rivojlanish jarayoni.

Sibslar – bitta ota-onadan tarqalgan bolalar, nasl (jinsidan qat'iy nazar).

Singamiya – erkak va urg'ochi gametalarning qo'shilishi.

Sinergidilar – tuxum hujayraning ikki yonida joylashgan yo'ldosh hujayralar, ularda xromosomalar haploid sonda bo'ladi.

Somatik hujayralar – tana hujayralar, ularda xromosomalar to'plami 2n bo'ladi.

Somatik mutatsiyalar – somatik hujayralarda hosil bo'ladigan mutatsiyalar.

Spermatidalar – erkak jinsi hujayralarning rivojlanish bosqichlaridan birida ikkinchi tartibli spermatosidlarning bo'linishi tufayli sodir bo'ladi.

Splaysing – genning intron qismini ajralishi, ekzon qismlarning o'zaro qo'shilishi.

Spermatogoni - mitoz bo'linishi natijasida spermatotsitlari hosil etuvchi murtak hujayralar.

Spermatotsitlar - meyozi tufayli keyinchalik spermatozoidlarga aylanuvchi hujayralar.

Spermatogenez - erkak jinsiy hujayralarning rivojlanish jarayoni.

Sporofit - jinssiz nasl. Sporofit zigotadan boshlanib sporalarini hosil qiluvchi nasl.

Spontan mutatsiyalar - o'z - o'zidan paydo bo'ladigan mutatsiyalar.

Submetasentrik xromosomalar - uzun-kalta elkali xromosomalar, sentromera kalta elgaga yaqin yotadi.

Struktali genlar - polipeptidlarni sintezlovchi genlar.

Telofaza - mitoz va meyozi bo'linishning oxirgi bosqichi.

Telosentrik xromosoma - sentromera oxirida bo'lgan xromosoma.

Terminator - oqsil biosintezini tugallanganligini bildiruvchi triplex.

Tranzitsiya - bir purinni ikkinchi purin, bir pirimidinni ikkinchi pirimidin bilan almashinishi bilan bog'liq gen mutatsiyasi.

Transgen o'simlik - yot genni o'simlik hujayrasiga kiritib undan sun'iy sharoitda olingen yangi xususiyatlari o'simlik.

Transmissibl plazmid - hujayra xromosomalar tarkibiga rekombinatsiyalana oladigan plazmidalar.

Transpozonlar - genomdan o'zini qirqib genomning boshqa joyiga ko'chib o'tadigan genlar majmuasi.

Transformatsiya - bir bakteriya DNA bo'lagini ikkinchi bakteriya genomiga funktsional faol holatda ko'chib o'tishi tufayli undagi belgi-xossasini o'zgarishi.

Triploid - hujayra, organizmda xromosoma gaploid to'plamini uch marta ko'pligi.

Trisomik - hujayrada bir xil xromosomani uchta bo'lishi.

Tetraploid - hujayralari to'rtta genomdan iborat organizm.

Transgenoz - qandaydir biror usul bilan olingen genni tajribada retsepient hujayrasiga kiritish, payvand qilish. Masalan, baqa genini ichak tayoqchasi bakteriyasiga kiritish.

Transduksiya - xromosoma qismlarining bitta bakteriya hujayrasidan boshqasiga fag ishtirokida o'tib qolishi.

Transgressiya - polimer genlarning belgisini o'ta rivojlanishiga (ijobiy) yoki rivojlanmasligiga (salbiy) ko'rsatgan ta'siri.

Transkripsiya - DNA-matriksasi asosida RNA sintezlanishi.

Translokatsiya - xromosomaning uzilib qolgan bir qismining o'zi yoki gomologik bo'limgan boshqa xromosoma bilan birikishi.

Translyatsiya - RNA dagi irlari axborotni oqsil tuzilishiga o'tkazish.

Faglar (bakteriosfaglar) - faqat maxsus xo'jayin - bakteriyalar hujayralarida ko'payva oladigan filtrlanuvchi viruslar gunuxi.

Fenotip - genotip bilan tashqi muhitning o'zaro ta'siri natijasida organizmda shakllanadigan barcha tashqi va ichki belgilari yig'indisi.

Filogenez - o'simliklar hayvonlarning tarixiy rivojlanish jarayoni, ya'ni turning tarixiy rivojlanish davri.

Xiazma - meyozi profaza I diplonemasida xromatidalar o'rta hosil bo'ladigan X ga o'xshash shakl.

Xromatin - hujayra yadrosining maxsus bo'yoq bilan bo'yadigan qismi.

Xromonemo - xromosomaning nukleoproteiddan iborat ipi. U xromosomaning tuzilish birligi sanalib, mitoz bo'linishida spirallashadi.

Xromosoma - hujayra yadrosining ipchalar tuzilishidagi va genlarda tashkil topgan bo'yuvchi tana.

Xromatida - interfaza DNA molekulasi tufayli DNA replikatsiyasi tufayli xromosomaning o'zaro mutloq o'xshash tuzilmasi. Gomologik xromosomasida alleller bir-biridan farqlanadi Aa, A, a.

Xromomeralar - xromosomaning tez bo'yadigan qismi. Xromosoma ipida nuqta yoki donacha shaklda bo'лади.

Sentromera - xromosomalarning mexanikaviy markazi.

Sentrosoma - hujayra yadroning yonginasida joylashgan organoid bo'л, ikkita sentriola donachalaridan iborat. Bu organoid hayvonlar va ba'zi ir quyi o'simliklar hujayrasida bo'lib, hujayraning bo'linishida faol ishtirot etadi. Yuksak o'simliklar hujayrasida bo'imaydi.

Sistron - organizm ma'lum bir belgisining rivojlanishiga sabab bo'ladigan genning kichik qismi.

Sitogenetik xarita - xromosomaning tabaqalashgan bo'yoq oraliq genlar joylashish o'mni to'g'risida axborot beradi.

Sitogenetika - organizmlarning irlari va o'zgaruvchanligini hujayra, xromosomalar, genlar bilan bog'liq holda o'rganadigan fan.

Sitokinez (sitotamiya) - hujayraning bo'linishi.

Ekzon - DNA ning irlari axborotni saqlovchi nukleotidlar izchilligi.

Ekspressivnost - belgining fenotip namoyon bo'lish darajasi.

Elektroforez - elektr maydonida molekulalarni har xil harakatlanishi binoan ajratish texnikasi.

Elangatsiya - polinukleotid zanjirini uzayishi.

Episoma - hujayra DNA sidan mustaqil holda DNA replikatsiyasini amalga oshiradigan genetik birlik (plazmid).

Epistaz - allel bo'limgan genlarning biri ikkinchi allel genning fenotipda namoyon bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi.

Eukariot - yadroshi shakllangan hujayra - yuksak tuzilishga ega barcha organizmlarga xos.

Endomitoz - bo'lingan xromosomalarning qutblarga tarqalmasligi natijasida yadroda ular sonining ortib ketishi.

Euxromatin - xromosomalarning kuchsiz bo'yadigan qismi bo'л, unda faol genlar joylashgan bo'лади.

Univalentlar - reduksion bo'linishida konyugatsiyalashuniga toq xromosomalar.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алиханьян С.И., Акифьев А.П., Чернин Л.С. Общая генетика. М., «Высшая школа». 1958 й.
2. Айала Ф., Кайтер Дж. Современная генетика. В. 3 томах. М., «Мир». 1989—1990 й.
3. Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики. М., «Наука». 1988 й.
4. Гершензон К.М. Основы современной генетики. Киев., «Нauка думка». 1983 й.
5. Дубинин Н.П. Генетика — страницы истории. Кишенев., «Штиница». 1988 й.
6. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика поведения и ответственности. М., 1989 й.
7. Жимулов И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск., «Сибирское университетское издательство». 2003 й.
8. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М., «Высшая школа». 1989 й.
9. Льюин Б.Гены. М., «Мир». 1987 й.
10. Нищенкоев К.Н. ва бошқалар. Тиббиёт генетикаси. Т., «Абу Али ибн Сино». 2000 й.
11. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Л., Издательство Ленинградского университета. 1990 й.
12. Файзуллаев С.С., Фофуров А.Т., Матчонов Б.Э. Одам генетикаси. Т., «Ижод дунёси» нашриёти уйи. 2003 й.
13. Фогель Ф., Мотульский. Генетика человека. В. в 3 томах. М., «Мир». 1989-1990 й.
14. Фофуров А.Т., Файзуллаев С.С., Сайдов Ж. Генетика осмонидаги зулматли тунлар. Т.. // «Таълим муаммолари». 2005 й 1-4 сон 80-84 бетлар.
15. Фофуров А.Т., Файзуллаев С.С., Холматов Х. Генетикадан масала ва машқлар. Т., «Ўқитувчи». 1991 й.
16. Иванов В.И. и др. Генетика. Учебник для мед. институтов. М. «Акад. книга», 2006.

Mundarija

Kirish.....	3
1§. Genetika fanining mazmuni, vazifalari, metodlari, nazariy va amaliy ahamiyati.....	4
1. Genetikaning mazmuni.....	4
2. Genetikaning rivojlanish bosqichlari.....	5
3. Genetikaning shohobchaları.....	7
4. Genetikaning asosiy metodlari.....	8
5. Tabiiy fanlar tizimida genetikaning o'rni.....	9
6. Genetikaning nazariy va amaliy ahamiyati.....	10
Savollar va topshiriqlar.....	11
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	11
 I-BOB. Organizmlar ko'payishining sitologik va biokimyoiy asoslari.....	13
2§. Jinssiz ko'payishning sitologik va biokimyoiy asoslari.....	13
1. Hujayraning mitoz bo'linishi.....	13
2. Xromosomalarning tashqi, ichki tuzilishi va kimyoviy tarkibi.....	15
3. DNK replikatsiyasi.....	19
3. DNK replikatsiyasi.....	20
5. Kariotip haqida tushuncha.....	21
6. Hujayra bo'linishining norasmiy tiplari.....	23
7. Mitozning biologik ahamiyati.....	23
Savol va topshiriqlar.....	24
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	24
3§. Jinsiy ko'payishning sitologik asoslari.....	26
1. Hujayraning meyoz bo'linishi.....	26
2. Hayvonlarda gametogenezi.....	28
3. Spermatogenezi.....	28
4. Oogenesi.....	29
5. Gulli o'simliklarda sporogenezi va gametogenezi.....	30
6. O'simliklarda urug'lanishi.....	33
7. Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplari.....	34
8. O'simlik va hayvonlarda nasllarning gallanishi.....	35
9. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyati.....	36
Savol va topshiriqlar.....	36
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	37
 II-BOB. Irsiyat qonunlari.....	39
4§. Monoduragay chatish tirish.....	39
1. Mendelning birinchi va ikkinchi irsiyat qonunlari.....	39
2. Gametalarning soflik farazi.....	41

3.Takroriy va tahliliy chatishitirish.....	43	3.Krossingoverning sitologik isboti.....	91
4.Belgilarning oraliq holda irsiylanishi.....	43	4.Qo'sh krossingover va interferensiya.....	92
5.Ko'p tomonlarma allelizm.....	43	5.Genetik xaritalar.....	95
6. F ₂ dagi belgilarning ajralishini statistik usulda tekshirish – χ ²	45	6.Xromosomalarning genetik va sitologik xaritasini taqqoslash.....	98
Savol va topshiriqlar.....	47	7.Krossingoverga ta'sir etuvchi omillar.....	98
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	50	8.Irsiyatning xromosoma nazariyasi.....	99
5§. Diduragay va poliduragay chatishitirish.....	51	Savol va topshiriqlar.....	99
1.Diduragay chatishitirishda belgilarning to'liq va oraliq holda irsiylanishi.....	52	Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	100
2.Diduragay chatishitirishning sitologik asoslari.....	53	 V-BOB. Allel bo'limgan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanishi.....	102
3.Poliduragay chatishitirish.....	56	9§. Allel va allel bo'limgan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanishi.....	102
4.Diduragylardan olingen natijani statistik usulda o'rganish.....	58	1.Aallel genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning rivojanishi.....	102
5.Mendel qonunlarini amalga oshishi uchun zarur sharoitlar.....	60	2.Aallel bo'limgan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarni irsiyanishining komplementar tipi.....	103
Savol va topshiriqlar.....	61	3.Epitaz. Uning dominant va retsessiv tipi.....	109
Testlardan to'g'ri javobni toping.....	61	4.Kriptomeriya	113
 III-BOB. Jins genetikasi va jinsga birikkan holda belgilarning irsiylanishi.....	62	Savol va topshiriqlar.....	114
6§. Jins genetikasi.....	64	Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	115
1.Jins tushunchasi.....	64	10.§Polimeriya. Pleyotropiya va modifikator genlar.....	116
2.Jinsnii aniqlash.....	64	1.Polimeriya va uning xillari.....	116
3.Jinsnii belgilashda xromosomalar va genlarning roli.....	65	2.Pleyotropiya.....	118
4.Jinsnii aniqlashda balans nazariyasi.....	65	3.Modifikator genlar ta'siri.....	119
5.Odamlarda jinsnii shakilanishi.....	68	4. Ekspresivlik va penetrantlik.....	120
6.Jinsiy xromatin.....	69	Savol va topshiriqlar.....	120
7.Jinsnii tabaqalanishi.....	71	Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	121
8.Gormonlar orqali jinsnii belgilash.....	72	 VI-BOB. Sitoplazmatik irsiylanish.....	123
Savol va topshiriqlar.....	73	11§. Sitoplazmatik irsiylanish.....	123
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	74	1.Sitoplazmatik irsiylanish haqida umumiy tushuncha.....	123
7§. Jinsnii birikkar belgilari (genlar)ning irsiylanishi.....	74	2.Plastidalar bilan bog'liq irsiylanish.....	124
2.X xromosoma tarqalmagandagi belgilarning irsiylanishi.....	76	3.Mitokondriyalar bilan bog'liq irsiylanish.....	125
3.X xromosoma birikkan holatdagi irsiylanish.....	81	4.Sitoplazmatik predeterminatsiya.....	126
4.Jins bilan cheklangan belgilari.....	82	5.Sitoplazmatik erkak pushtsizligi.....	127
5.Jinsnii erta aniqlashning genetik usuli.....	83	6.Hujayradagi mayda zarrachaclar va simbiontlarining irsiylanishi.....	128
Savol va topshiriqlar.....	84	8. Sitoplazmatik irsiylanishning molekular asoslari.....	130
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	85	Savol va topshiriqlar.....	131
 IV-BOB. Belgilarning birikkan holda irsiylanishi.....	87	Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	131
8§. Genlarning birikkan holda irsiylanishi. Krossingover.....	87	 VII-BOB. O'zgaruvchanlik.....	133
1.Genlarning birikish guruhi.....	87	12§. O'zgaruvchanlik	133
2.Belgilarning birikkan holda irsiylanishi va krossingover.....	88		

1. O'zgaruvchanlik va uning xillari.....	133	X-BOB. Populyatsiya va evolyutsiyaning genetik asoslari.....	189
2.Mutatsion o'zgaruvchanlik.....	133	16\$. Populyatsiya dinamikasi va evolyutsiyaning genetik asoslari.....	189
3.Gen mutatsiyalari.....	133	1.Populyatsiya haqida umumiy tushuncha.....	189
4. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni.....	135	2. O'z o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalarni genetik strukturasi.....	189
5.Xromosoma mutatsiyalari.....	136	3.Chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarning genetik strukturasi.....	190
6.Genom mutatsiyalari.....	137	4.Populyatsiyalarda irsiylanish.....	191
7.Tabiyl va sun'iy mutatsiyalar.....	140	5.Populyatsiyaning genetik dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar.....	193
8.Retsessiv mutatsiyalarni aniqlash metodlari.....	142	6.Evolyutsiyaning genetik asoslari.....	196
Savollar va topshiriqlar.....	144	Savol va topshiriqlar.....	199
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	146	Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	199
13\$. Modifikatsion o'zgaruvchanlik.....	147		
1.Modifikatsion o'zgaruvchanlik haqida tushuncha.....	148	XI-BOB. Xulq-atvor genetikasi.....	201
2.Modifikatsion o'zgaruvchanlikni matematik-statistik usulda o'rganish.....	148	17\$. Xulq-atvor genetikasining vazifalari.....	201
Savol va topshiriqlar.....	150	1. Xulq-atvor ko'rinishlari.....	201
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	155	2. Hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish.....	202
VIII-BOB. Irsiyatning molekular asoslari.....	157	3. Yevgenika fani.....	204
14\$. Nuklein kislotalarning irsiyatdag'i roli.....	157	4.Odam xulq-atvorining genetik asoslari.....	206
1.Bakteriyalarning transformaesiysi.....	157	Savol va topshiriqlar.....	208
2.Transduksiya.....	157	Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	208
3.Genetik kod.....	158		
4.Hujayrada oqsil biosintezi.....	160	XII-BOB. Odam genetikasi.....	210
5. Genetik axborot ko'chirishning maxsus turlari.....	161	18\$. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganish.....	210
6.Molekular genetika.....	165	1.Antropogenetikaning asosiy maqsadi.....	211
Savollar va topshiriqlar.....	166	2.Odam irsiyatini o'rganish metodlari.....	212
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	169	3. Odam genom.....	217
IX-BOB. Ontogenez genetikasi.....	172	4.Tibbiyot genetikasi.....	220
15\$. Ontogeneznинг genetik asoslari.....	172	5. Tibbiy-genetik maslahat.....	221
1.Ontogenez haqida umumiy tushuncha.....	172	Savol va topshiriqlar.....	222
2.Ontogeneznинг genetik dasturi.....	172	Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	222
3.Ontogenezni o'rganishda qo'llaniladigan genetik metodlar.....	174		
4.Hujayrada oqsil biosintezini tartibga solish. Operon tizimi.....	180	XIII-BOB. Genetik injeneriya va biotexnologiya.....	224
5. Immunitetning genetik asosi.....	182	19\$. Genetik injeneriya haqida tushuncha.....	224
6. OITS yoki OITV genetikasi.....	183	1.Ko'chib yuruvchi genetik elementlar.....	224
7. Xavfli o'sma kasallik genetikasi.....	184	2.Plazmidalar.....	225
Savol va topshiriqlar.....	186	3.Restriksion endonukleazalar.....	225
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	187	4.Rekombinant DNK olish va genlarni klonlash.....	226
		5. O'simlik irsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish....	227
		6.Hayvonlar irsiyatini hujayra injeneriyasi yo'li bilan o'zgartirish.....	229

7.Hayvonlarni klonlash.....	230
Savol va topshiriqlar.....	231
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	231
 XIV-BOB. Genetika — seleksiyaning nazariy asosi.....	
20\$. Seleksiya va uning maqsadi, vazifalari.....	234
3.Sun'iy tandalash va uning xillari.....	234
4.Duragaylash sistemasi.....	236
5.Tur ichida va turlararo duragaylash.....	236
6.Geterozis.....	238
7. Eksperimental poliploidiya.....	239
8. Eksperimental mutagenez.....	240
9.Hayvonlar seleksiyasi.....	240
9.Hayvonlar seleksiyasi.....	241
10. Chorvachilikda duragaylash tiplari.....	242
Savollar va topshiriqlar.....	242
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	244
Asosiy genetik atamalar lug'ati.....	245
Foydalaniqsan adabiyotlar.....	246
	256

28.04

G 99

G'ofurov, A.T.

Cenetika [Text]: darslik A.T.G'ofurov, S.S.

Fayzullayev, J. Saidov. O'zberiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus
ta'lim vazirligi, Toshkent: Tafakkur, 2010.
264-bet.

I. Fayzullayev, S.S

ББК 28.04я73
575 (075)

A.T.G'OFUROV, S.S.FAYZULLAEV, J.SAIDOV

GENETIKA

*PEDAGOGIKA OLIY O'QUV YURTLARI 5140400 BIOLOGIYA IXTISOSLIGI
TALABALARI UCHUN DARSLIK*

Musahhib I.SAFARBOYEV
Badiiy muharrir O.MUXTOROV
Texnik muharrir H.SAFARALIYEV
Sahifalovchi D.AKROMOV

Bosishga ruxsat etildi 20.08.2010.
Hajmi 16.5. Bichimi 60x84 1/16.
Offset bosma usulida bosildi.
Adadi 1000. Buyurtma № 95.

Original maket
«TAFAKKUR» nashriyoti
media markazida tayyorlandi.

«TAFAKKUR» nashriyoti bosmaxonasi.
Toshkent shahri, Chilonzor tumani,
Chilonzor ko'chasi 1-uy.